

HERMANNI BOERHAAVE

PHIL. ET MED. D. INST. COLLEGII PRACT. BOT.
ET CHEM. PROF. IN ACAD. LUGD. BAT. PRAES.
COLL. CHIR. SOC. REG. SCIENT. LOND.
ET ACAD. REG. SCIENT. PARIS. SOD.

PRAELECTIONES
ACADEMICAЕ

IN PROPRIAS

INSTITUTIONES REI MEDICAE

EDIDIT, ET NOTAS ADDIDIT

ALBERTUS HALLER

*M. & Phil. D. Consiliarius Aulicus, & Archiater Regius
Med. Anat. Bot. Chir. P. P. O. Socc. Regg. Brit.
& Suec. Sod.*

TOM. IV. Pars II.

MENSTRUA, CONCEPTUS.



TAURINI, EX TYPOGRAPHIA REGIA. MDCCLV.



DE MENSTRUIS.

659.



Emina habet os sacrum latius, & magis extrorsum vergens, quam viri; tum & os coccygis illi est plus retrorsum cedens; ossa quoque innominata sunt latiora, plus remota a se invicem, atque inferius longe plus extrorsum versa; simul quoque eminentiae inferiores ossis pubis itidem magis extrorsum feruntur: hinc mulieri^a) latitudo maxima circa, & intra haec ossa, contra quam in viris; tum & capacitas pelvis ingens prae ea, quae in viris; interim tamen in muliere non gravida non sunt multa, quae eam valde repleant.

660. Habent & thoracis anteriorem faciem feminae longe planiorem, quam quidem viri.

661. Interim vasa sanguinea, lymphatica, adiposa, nervosa, membranae, fibrae, sunt in feminis longe laxiora; unde omnes cavitates, cellulae, vasa, facilius in his replentur, humoresque aggregantur; hinc cellulosa, & adiposa membrana his semper est crassissima.

662.

Tom. IV. II.

A

^a Spigel. L. VIII. T. XVII. ff. T. XII. II.

662. Iterum verumprehenditur, eas longe minus perspirare, quam quidem viri solent; atque etiam longe citius adipisci ~~deum~~ sui incrementi.

663. In hac pelvi [659.] (^b) situs est mollis, pulposus, totus vasis constans, facile extensilis; nec multum elasticus Uterus, fere liber, nec fixus; vix pressus, dum [^e] expansa peritonaei membrana defenditur.

664. Ille autem, [^d] figurae turbinatae; constat (^e) membranis, fibrisque; accipit (^f) arterias ex spermaticis, (^g) hypogastricis, Iliacisve internis, & haemorrhoidalibus [^b], anastomosibus inter se in plexus reticulares mirifice ubique unitis, incurvatis, intortis, totum uterum ambientibus, ejusque molem perreptantibus ubique, & undique, ultimo evanescentibus, & quasi uterini corporis partem maximam constituentibus; his dein arteriae ex ramo Iliacae externae, in arcum flexae sursum, per inguina ex altis femoribus in pelvim evectae, lateribus uteri applicatae, accedunt (ⁱ) simili apparatu, & origine (^k) venae pariter omnes inter se communicantes, valvulis carentes, ita ut humor ex una per omnes ire, redire queat; in cavitate sua interna peritunditur, non modo [^l] jemiisariis tubarum Falloppii, sed & (^m) plurimis hiatibus exiguis, humorem blandum, aquoso-mucosum sudantibus; quo interne lubricatur, defenditur, a concretionem impeditur ejus cavitas.

665. Simulac ergo virgo sana, adepta terminum sui incrementi, incipit conficere plus humoris boni, quam sustinendo corpori requiritur, quum augendo non amplius impendat, implebit plus sua vasa, maxime uterina, & mammaria, utpote minime pressa; haec dilatabit plus quam alia; hinc & lateralia vascula in cavum uteri evacuantia humorem [664. g.] valde imple-

^b Spigel. VIII. T. XVII. Z. T. XIX.
Q. Eustach. T. 14. F. 1. 2. 3. 4.

^c Bidloo T. 50. XXXI. K.

^d Ruyfch. Th. VI. T. IV. V. Graaf. de Org. Mul. T. VII. BD.

^e Id. Ib. T. VIII. GG. T. IX. II.

^f Id. Ib. T. I. L. K. Eustach. T. 13.

^g Id. Ib. P. T. Eustach. T. 13. 74. 62.

^h Vater. de Utero Gravido Prooem. & pag. 12.

ⁱ Eustach. T. 13. 73. 57. T. 14. F. 1. 2.

^k Ruyfch. Th. VI. T. I. RV. Confer Tab. XII. & T. XIII. Eustach. T. 13. & 14. F. 1.

^l Ruyfch. Ib. T. T. x. DC.

^m Id. Ib. T. IX. I. L. Eustach. T. 14.

F. 3. 4.

impleta extendet; inde dolor, calor, pondus sentiuntur in lumbis ad pubem, & inguina; excitatur febricula; dilatantur vascula uteri (664.), ita ut sanguinem ipsum in cavitatem uteri stillent (*); os ejus lubricatur, laxatur, sanguis exit; minuitur ejus copia; minus premuntur, plus se contrahunt, illa vascula; retinetur sanguis; dimittitur crassior pars feri; tandem sola illa lymphæ consueta; iterum conficitur plus humorum, facilius deponitur in vasa jam semel dilatata; hinc eunt, redeunt, vario in variis tempore, menstrua; quorum tamen excretionem aliquam fieri posse per vasa, descriptis similia, infra os uteri, in vagina posita, videntur docere menstrua, gravidis quibusdam satis frequentia, atque certo tempore fluentia, absque ullo abortu sequente; tum quoque ordine quodam, licet non perfecte naturali, profluentia his, quibus mulieribus, virginibusque, per annos uterus aqua fusca turgidus, nunquam apertus tamdiu fuerat [°].

666. Quum vero Arteriae Mammariae, & Epigastricae, mire (P) communicatis anastomosibus inter se communicent, liqueatque idem de venis, patet evacuatis uterinis minus distendi mammarias, ideoque instantibus menstruis turgere mammas, & contra.

667. Inde autem intelligitur, cur mulieres duriori fibrarum compage donatae, aut magis siccae; item valde musculosae, minusque pingues; tum & valido labore quotidie exercitatae; minus, tardius, per longiora intervalla, & aliquando omnino nihil, excernant cruorem menstruum: dum interim molliores; laxiores; succulentae magis; pinguiore quodammodo, minusque musculosae; otiosae denique; sanguinem hunc copiosorem, velociorem, pariori intervallo periodi, dimittant. Tum etiam, cur retentus hic humor, tam varias sibi, aliis dilatatis vasculis, vias faciat, usurpet, iisque periodice exeat. Ut & cur certo aetatis tempore demum incipiant, augeantur, desinant, Menstrua quibus citissime oriantur. Cur autem iisdem praemature iterum deficient.

A 2

DE

* *Vesal. v. 15. pag. 463. Morgagn. Adv. 1. pag. 39. T. 3. MM.*

o *Vesal. v. 15. pag. 464. NucK. Adenogr. de Mamm.*

§. DCLIX.

Latius) (a) Ut fetum melius & sustineat , & defendat : deinde extrorsum cedit os sacrum, atque auget pelvis capacitatem.

Coccygis) Ejus mucro vertitur antrorsum (b), ut fetum sustineat, atque simul ita articularur , ut facile retrorsum flecti possit, sic spatium auget.

Remoti) Quando in pelvim masculini sceleti ab inferioribus inspicio, major angustia manifesta fit perspicienti, qua a feminae pelvi differt. Hujus adeo capacior est apertura, cumque ossa (pubis, & coccygis) sese muruo longius distent, tota pelvis capacior, quam viris est, quos eadem cum femina statura esse posueris. Haec adeo evidentia sunt visu, ut notae sint quibus sceleta utriusque sexus distinguas.

Pubis) Ita augetur apertura pelvis, quae fetum transmittit.

Maxi-

(a) Pelvis muliebri a virili facis insigniter differt : nam ipsae lumborum vertebrae incipiunt magis retrorsum declinare GAL. *de uter. diff.* C. BAUHIN. *Theatr.* p. 170. Deinde pelvis ipsa latior est a dextris ad sinistras ob ossa illium magis ad latera reflexa, vel patula C. BAUHIN. *Theatr.* p. 49. RIOLAN. p. 404. MAURICEAU ad ic. p. 209. ALBIN. *osteol.* n. 339. MONROO *of the bones* p. 311. seqq. VESALIUS l. c. PALFYN. l. c. denique dimidio fere pollice latiora GREVV. *Muscl.* p. 5. Porro latior est ab anterioribus ad posteriora, ob os sacrum magis rectum, neque perinde antrorsum flexum BONACIOLUS p. 15. ALBIN. MONROO C. BAUHIN. PALFYN. *anat. de la femme* p. 52. 53 lumbisque retrorsum patulos C. B. etc. & coccygem rectiorem ALB. l. c. MONROO l. c. VESALIUS L. I. c. 29. C. BAUHIN. qui idem mobilior. & una quae adeo retro versus est MAURICEAU l. c. Sacrum os etiam longius facit GREVV. p. 5. sed hae mensurae ut pro constantibus admitti possint, multa egerit repetitione. Porro etiam ideo portio os-

sea minor est, quia ossa pubis longae majori, & crasso angulo ununtur, quae princeps nota est sceleti muliebri. CELSO olim dicta L. VIII. c. 1. & VESALIO, C. BAUHINO & aliis : confer CHESELDENII T. XXXIV. cunct. T. XXXV. ALB. l. c. MAURICEAU l. c. Eadem ossa breviori synchondrosi coeunt RIOL. p. 404.

Denique & ischii tubera magis distant ALB. l. c. PALFYN l. c. C. BAUHIN. hinc femorum cervices magis transversae cum truncis angulantur faciunt rectiorem. Adeoque ibi femina latior est ALB. l. c. MONROO p. 316. BEURLIN *diff. delux. fem.* n. 8. Quod quidem necesse est, ut latefcens in graviditate abdomen firmius sosteni possit. Aliae diversitates partium minoris momenti sunt, minusve certae, ut foramen pubis majus VERHEYEN p. 322. effundit Ischii tuber planius : MONROO l. c. aliae inferius dicuntur. Vide nos. c. PINAEUS e quidem videtur has diversitates fere partui tribuere de not. virgin. p. 178. Verum in virginibus etiam reperiuntur.

[b] Vide not. a.

Maxima) Statuam formosissimae feminae (c) adspice, qualis antiquissima illa Coae Veneris (d) statua est, quae Romae marmorea conservatur, & mensura distantiam inter extremitates infimae pelvis, reperies tres partes habere, uti duas habet distantia maxima oppositorum terminorum thoracis. Contra in Mercurio, aut Hercule, five alia pulcherrimi viri statua, reperies tres partes esse latitudinis thoracis, duas pelvis. Haec est feminae a mare diversitas, ut majus nempe spatium pareat pro fetu recipiendo, quod in mare angustius est, & quasi connivet.

Multa

(c) Hoc duobus modis verum est.

Nam I. maxima latitudo thoracis virilis superat maximam latitudinem inter duo ilia, in femina vero eidem cedit. In sceletis **CHESELDENIANIS XXXIV. XXXV.** rationes sunt hujus modi: Latitudo summa thoracis in femina $26\frac{1}{2}$

latitudo vero ilium $31\frac{1}{2}$ In viro

thoracis latitudo $31\frac{1}{2}$ ilium vero

$30\frac{1}{2}$ Adeoque comparatis nume-

ris, latitudinis inter ilium ossa ratio, ad latitudinem pectoris, in feminis, est ad eandem in viris

rationem $\therefore \frac{65}{53} \frac{92}{94}$ nempe uti \therefore

1055. 813. proxime. A scelecto vero rationes, quam a statuis sumere malui, nam toti majores viris pectoris rationem majorem faciunt, adeps elunium femoris rationem in feminis auget. Verum hic unice quaeritur spatium ossibus interceptum. **DURERUS** tamen de proprt. L. II. p. 29. dat feminae humerorum latitudinem 24. femorum paulo plus: viro humerorum distantiam 31. femorum latitudinem 26. Hunc locum **PRAECEPTOR** velle videtur. Dudum **RHASES** ad **MANSOREM** L. II. c. 56. feminis pectus, & scapulas angustas, costas minores, & coxas, et nates crassiores esse. In masculis autem fe-

minis **LIGONIUS** auctor est, femora non latiora humeris esse of. barbados p. 87.

1. Distantia ossium femorum, & ossium ilium, quae fere eadem est, majorem rationem habet ad distantiam scapularum in femina, quam in viro. In integro homine, Velsalii **Venus** habet femorum distantiam partium $41\frac{1}{2}$

scapularum autem $48\frac{1}{4}$ In Her-

cule eadem quantitates sunt 48. 57. In scelecto **CHESELDENII** in osteogr. magna T. XXXV. eadem quantitates in

femina sunt $29\frac{1}{2}$ $35\frac{1}{4}$ In viro

$32\frac{1}{2}$ $41\frac{1}{2}$ Nempe in feminis lati-

tudo femorum, ad latitudinem scapularum est uti 114. ad 141. in viris vero uti 65. ad 83 adeoque ratio, qua latitudo scapularum superat latitudinem imae pelvis in viris, ad eandem in

feminis rationem est \therefore uti $\frac{141}{114}$

ad $\frac{83}{65}$ \therefore 1055. 3154. vel uti 1018.

1055.

(d) Videtur Praeceptor Venerem Medicam velle, quae Romae esse desit, atque Florentiae inter thesauros gentis Medicae reperitur. **V. KEISLERI** elegantissima itinera I p. 499.

Multa \ Vesica [e], quae fere nullum spatium occupat, quando inanis est: Uterus, non major parvo piro: Intestinum denique rectum gracile in mulieribus. Ergo in toto corpore nullus locus est, ubi partes minus premantur, quam in pelvi feminae. Ideo fit, ut in femina omnis in humorum quantitate excessus deorsum determinetur.

1732. Vesicam quidem in femina majorem (f) esse, verum non ab ipsis primordiis, sed expandi sensim, cum in loco capaci posita sit; hinc feminas urinam diutius retinere, quam viros.

§. DCLX.

Planior (a) Ut paretur spatium pro mammis, quas lacte oportet distendi. Deinde, ut augeatur facilitas gestandi fetus. Nam centrum gravitatis corporis mutatur in gravidis, & declinat in anteriora, hinc facillimus effertur in anteriora prolapsus, si perinde thorax mutaretur; cum aliunde gravidae ad minimam offensam antrosum labantur. Ideo thorax aliquantum retrorsum vergit, ut huic incommodo utcumque subveniatur.

§. DCLXI

Laxior] Quando corpus feminae vestibulo testum praesto est, & juxta adjacet corpus virile, incidendo certe cutem femoris, & comparando in utroque corpore crassitiem pinguedinis cum gracilitate cutis, facile feminam distinguere.

Collu.

[e] In femina pelvis amplitudo tanta est, ut sufficiat utero recipiendo, & vaginae, quorum loco viri non habent, nisi parvas vesiculas prostatamque. Neque incrementum uteri maximum in pelvi est, sed cedit turgentis pinguedo circumposita recto intestino, mobilique coccyx.

(f) Nova observatio, sed vera, quantum video. Id etiam certum est, feminas urinam melius retinere, nisi gravidae sint, neque in viris tantas vesicas reperio, quales non raro inter causas partus difficiles sunt, & tunc ad octo libras urinae visae sunt continuisse, octoque pintas EDINB. SOC. IV. 449. & novem ebodunae, enor-

mem certe molem, la MOTTE obs. LX. quia nempe familiari vitio urina ante parium subprimitur, capite fetus in vesicam nitente la MOTTE des accouchem. obs. 49. 220. Id etiam verum esse reperio, feminis magis triangulares vesicas esse, cum deorsum lateat a pondere vesicae, neque resistentes sub se habeant vesiculas feminales, duramve prostatam, sed molliissimum rectum intestinum; vide consentientem D. PARSONS of the bladder p. 32. T. 3. & GARENGEOT splanch. II. p. 75. qui in gravidis intestina dilata ait.

(a) Vide DCXXIII.

Cellulae) Mulier macilenta toroso viro obefior est . Hinc in viro toros musculorum distinguimus, quos in feminis alta pinguedo ita sepelit, ut tota corporis superficies plana videatur.

Vasa) Arteriosa, & venosa maiora sunt quam viri (*a*) : venae enim in

[*a*] Haec observatio maxime necessaria est, per eam enim sequentia omnia demonstranda sunt. Nempe femina a natura facta est, ut certis vitae temporibus ejus uterus enormiter inefcercere, fetumque satis magnum, tamquam novam corporis accessionem, ex suo sanguine alere possit. Ideo natura feminas toto corpore molliori, & extensibili fecit: deinde uteri vasa dilatabilia; tandem ita disposita, ut eo sanguinis abundantia naturaliter vergat. Ergo puer, & puella vix differunt, feminae vero a viris ita insigniter, ut de infantuli indole diutissime, & in seipsum usque retineant universalem eam molliem, quam in ipsis ossibus anarome distinguit. Ea ipsa enim in femina leviora, rotundiora, planiora, minus cava, minus eminentia sunt. Sed neque otium hanc diversitatem facit, etsi eam augere non negaverim. Nam etiam rusticis exercitatis feminis haec in cute mollior, in adipe abundantia, in ossibus teneritas superest. Consentit mobilitas generis nervosi, dispositio ad convulsiones, ad animi motus, caro etiam tactu mollior, observata.

HIPPOCRATI *πρὸς γυναικ.* a. pulsus celerior, debiliior. Neque enim sanae manere possissent, si laxitatem partium abdominalium maiorem ipsis natura dedisset, reliquis vero partes aequae robustas reliquisset.

Sed hic solvantur nobis experientia **CLIFTONI VVINTRINGHAM**, per quae mathematice constet, in brutis perinde, uti in hominibus; vasa feminarum & debiliiora, & ad sanguinem ad

pelvem determinandum aptiora facta fuisse. 1. arteriae ovium feminae ubique laxiores sunt, quam cognomines arteriae arietis *Exp.* 19. p. 130. & capaciores p. 151. Robur enim aortae arietis ad 10. bur aortae in ove est prope cor :: 79. 78. p. 65. super emulgentes :: 1258. 1000. p. 77. & super ihacas :: 1272. 1000. p. 106. & 71. 70. p. 68. arteriae veto iliacae robur ad idem robur in vena socii in ove :: 1295. 1000. p. 110. Deinde ratio crassiusculi tunicarum in aorta ascendente ad sanguinem, est ad eandem in ove rationem :: 1033. 1000 p. 146. in descendente vero :: 1108. 1000. p. 146. & super emulgentes :: 1319. 1229. p. 122.

Haec adeo utraque ratio minuit vim, qua vasa maiora in femina cor di resistunt, & incrementum facit velocius; deinde demonstrat plethora femininam: nihil enim plethora est, nisi ratio major sanguinis ad tunicas continentes.

Sed vicissim venae feminis non in eadem ratione debiliores sunt. Aortae arietis rebur, ad aortam feminae prope cor est $\frac{79}{78}$ venae Ca-

vae ibidem $\frac{91}{90}$ p. 66. nempe minor. Super emulgentes arteriarum ratio est $\frac{1238}{1000}$ venarum $\frac{1166}{1000}$ p. 78. denuo minor. Ad divisionem iliacarum arteriarum ratio $\frac{1295}{1000}$

venarum $\frac{1155}{1154}$ p. 68. insignissime minor.

2. Si:

in feminis facile in varices extenduntur. Inde fit, ut mulier ad minimum superpondium in nutrimento, continuo plethora laboret, nisi per menstruam sanguinis jacturam se liberaverit.

• *Repletur*) Femina etiam satis gracilis per abortum, vel lochiorum fluxum, magnam copiam sanguinis amittere potest (b), ad unam, alteramve libram

2. Sicuti autem arteriarum contentum majus, ita venarum contentum in feminis minus est. Nam proportio capacitatis venarum cavarum ad arterias aortas est in ariete, ad eandem in ove proportionem " 1041. & 1076. 1000. p. 144. 145. super iliacas, & decuo " 1091. & 1121. ad 1000. p. 147. His modis efficitur, ut venae & parvitate sua, & robore suo sanguinem promoveant, ne nimis lentescat circulatio p. 153.

3. Haec laxitas arteriarum in genere feminino imprimis ad pelvim, & prope originem vasorum uterinorum, insignissima est, ut manifestum sit, ad hanc sedem adeo evidenter minus resistentem sanguinem abundius determinari. Non enim solum truncus aortae descendens in femina amplior est, quod etiam PITCARNIUS habet de fluxu menstr. p. 154. 155. & FREIND. c. IV. 16. FÉVRE physiol. p. 169. &c. Sed singulatim in feminis aorta versus iliacas, & magis, quam in maribus dilaturatur, & minus augetur robore, adeoque uterinae partes magis dilatantur a vi aequae robusti cordis, quam partes pelvis masculae. Id apparet per supracitata. Nam ratio roboris arteriae arietis ad ovis arteriam ad cor est 78 79. ad iliacas autem " 1171. 1000. nempe arteriae robur valde augetur descendendo in ariete, in femina parum, ut omnino in majori ratione, quam in aliis partibus arteriae ovis debiliores sunt, ubi vasa uteri prodeunt p. 114. 115.

Deinde ratio capacitatis descendens ad ascendentem in-

ove, est ad eandem in ariete rationem " 1081. 1000. p. 146. & ratio capacitatis aortae prope emulgentes, ad capacitatem arteriae in ariete est 1105 in ove 1120 p. 113 atque in universum capacitatis aortae sub emulgentibus, in ove multo major est, quam in ariete: si cum aorta superiori comparetur p. 114.

Tanta sanguinis hic major est determinatio ad partes uteri, cum & laxiores, & ampliores arteriae eo ducant.

Capacitates venarum vicissim minores, roboraque majores sunt. Nam iliacae venae capacitatis ratio ad arteriam est 191. 100. cum ad emulgentes ratio capacitatis venae caevae ad capacitatem aortae sit 4694. 1000 p. 100.

Denique arteriarum ex hypogastrio in feminis copia & major est, quam in maribus PITCARNE n. 6 & valde magna pro portione uteri, quem addeunt FITZGERALD de catamen. p. 49.

(b) Experimenta demonstrant, quam enormes haemorrhagias tolerant feminae, quibus fetus ante diem eliditur FREIND. c. 3. Vide PUZOS in T. I. P. 111. Acad. Chirurg. Paris. Sex venae sectiones in puerpera absque omni noxa fuerunt la MOTTE obs. 157. viginti quinque denum librarum sanguinis ARCULANUS apud SCHENKIIUM. Et in universum feminas plus sanguinis, quam mares habere, per experimenta demonstravit vir praestantissimus S. HALES de menses. p. 11. & inter omnia animalia feminam sanguinis copia excellere ARISTOTELIS bist. anim. L. 111. c. 19.

libram, neque inde valde debilitabitur: & dimidia certe iactura sanguinis, quam vir aut per vulnus, aut per venam sectam emisit, ejus vires ita franget, ut vel animo linquatur, vel extingatur subito.

§. DCLXII.

A^{quid}) Corpus humanum terminum suum habet, ultra quem nihil in longitudine excrecit, (*a*) in latitudinem vero parum. Hic terminus in juventute definitur ossibus, quod ad longitudinem attinet, quando ea ita rigida facta sunt, ut a cordis, & arteriarum viribus non patiantur se extendi. Verum, post terminum hujus incrementi, in corporibus, quae ad summum staturae decus pervenerunt, abdomen strictum, costae arctae, corpus habilissimum, & natura junarum est, non arte, quam carpebat CHAEREA Terentianus in *Eunucho*. Post hoc tempus aliquantum adhuc crassescimus: aucto enim adipe distenduntur costae a mutuis contactibus, ut extrorsum protuberent: abdomen prominet, quod totum molle est, & facile cedit, crassities augetur, absque augmento proceritatis. Ita seminae thoracem ante gestationem arctiorem, post partum autem latiore habent, quia perpetua pressio ascendentis uteri costas extrorsum vertit, & cartilagine ad exteriora pellit, non reductas ad priorem arctitatem, nisi continuo a partu fasciis thorax cogatur, uti solet fieri apud aulicas mulieres. Nunc ad istum verum terminum proceritatis seminae fere tertia parte annorum citius, quam viri, perveniunt (*b*), inque eadem ratione citius ad generationem aptae sunt. Viri enim longitudine incrementum ad annum aetatis vigesimum quintum, & ultra: femina vero annos nata sedecim, aut octodecim, jam attingit eam proceritatem, quam nunquam excedit, nisi in raro aliquo exemplo. His observatis, legislatores apud omnes gentes facultatem testamenti condendi teneriori mulierum aetati concedunt; viris tardius largiuntur, quod existiment, etiam animas feminarum prius perfectas esse, uti corpora celerius videntur perfici. Sed cor solum facit, ut seminae crescant, quod in vasa laxa sanguinem impellit. Nunc in femina sedecim annorum ossa dura sunt, neque conced-

Tom. IV.

B

duat

(*a*) CCCCLXXV.

(*b*) Per superiora. Cor enim aequale forte est in puero, & puella, neque enim ulla in recens natis diversitas reperitur. Sed puellae arteriae laxiores sunt, facilius adeo extenduntur, quantum possunt extendi, a definita ratione virium cordis: puero vero, cum duriores sint, lentius expandi necesse est, quae cordi magis resistent. Prius autem pubescunt seminae,

quia haec arteriarum laxitas ad uterum etiam major est, adeoque nixu majore vasa collapsa uteri, & vaginae citius ita evolvuntur, ut rubrum sanguinem recipiant. Eadem porro laxitas arteriarum facit, ut seminae minus procerae sint, cum arteriarum minor impulsio fibras solidas minus in longum extendere valeat.

dant incrementum uterius, vasa autem ex natura muliebri laxa. Superest, ut ista dilatentur, atque plethora nascatur. Causa autem, quare citius in feminis ossa proceritate limitent, est in ipsa valorum laxitate, quae non sufficit extendendis ossibus. Ossia feminis non duriora sunt, quam viris, sed majorem laxioribus vasibus opponunt resistentiam.

§. DCLXIII.

Mollis [a] Vulgo dicunt, cavum musculum esse, atque lacertos car-
neos.

(a) *Situs est, in textu*) Uterus in pelvi ponitur, in altitudine, quae vesicae est, aut paulo brevior **VESALIUS** p. 651. & *de china* p. 121. multo infra marginem pelvis. Directio deorsum, & paulum anteriorum inclinatur **VVINSLOVV** p. 591. Anterior vesicam habet oppositam, posterior rectum intestinum **ARI STOTELES** *hist. anim.* l. 1. c. 18. **CASSER.** l. VIII. T. 18. Et peritoneum quidem finiens abdomen, postquam superiori vesicae vertici modica latitudine incubuit, ascendit iterum **VESAL.** l. V. f. 24. & in medio utero applicatur. paulo supra oriuntur vaginae, **BIDLOO** T. LIII. f. 1. hinc ascendit adhaerens utero, & consensu vertice descendit retro uterum, multo profundius, quam ascenderat, ante intestinum rectum, ad vaginae usque transversam partem, duasve tertias (**HENSING** in *eximia*, diff. *de periton.* n. 46.) cellulosa vero circumposita reliquae vaginae, tum anteriori ejus faciei circumfunditur. Lateraliter autem peritoneum modo in pelvi, uti certe saepe ovaria in pelvi reperio, fere in media altitudine, modo ante valorum iliacorum fere mediam partem a Ploa recedens, etiam alius, quam uterus **VESAL.** p. 658. ovaria continet, uti dicam. Pars vero peritonei, quae cavitatem anonymam in

utero, rectoque interceptam lateralis terminat, ea ab utero posteriora petens, duabus plicis transversalibus, tamquam ligamentis ex altitudine ea, quae vesicam delerebat, sineque uteri inferiori, uterum cum recto intestino conjungit **BIDLOO** T. 50. utcumque, conf. **LXXXVI. SANTORINVS** eam pro *cervicis ligamento* descripsit p. 219. Vertici uteri omentum non rarissime adligatur. Exempla habent **BARTHOLINUS** p. 262. **FABRICIUS de omento** p. 53. & **BLASIIUS** in **VESLINGIUM** : cisi non dixerim ideo sterilisecere, ut **HIPPOCRATES** *apbor. V.* & **PANAROLUS** *Pentec.* lib. obs. 4. & **FABRICIUS.** Dandum monuit **J. VV. PAULI** diff. *de nutrit.* p. 25. & quotidie obfistinae feminae parvum.

Sed vagina, quam cum utero describere necesse videtur, canalis carnosus est, ex terete, uti canales solent, compressus, multo utero latior, situ primo declivi, qualem omnes unice pingunt, deinde pene transversali, ut tamen modice anteriorum descendat **DE-VENTER** *nov. leon. obs.* p. 21. 22. qui inter anteriorem, & imprimis superiorem vesicam, quam enormiter parvam **EUSTACHIUS** pingit T. XIII. & XIV. f. 3. & inter inferius, & posterius rectum intestinum, a fine uteri, cui consuecitur, ad interfemineum descen-

descendit. Utero, paulo supra os internum, invariabili nexu con-
nascitur. Recto intestino etiam
GALEN. *de diff. vulv.* c. 4.]
& cellulosis, & carnis fibris
cohaeret, ut tamen integra figura
separari queat. Vesicae cellulositae
mera, longe ante accretionem peri-
tonaei, uterinae denique ipsa carne
conjungitur, neque potest abique
laceratione separari GAL. *de vulv.*
diff. c. 4. C. BAUHIN p. 120.
Et anterior vaginae finis arctior
est VESALIUS p. 655. media
larefuit GRAAF. p. 169. 147. Nu-
per tamen exitum latiore in vi-
li.

Ligamenta autem uteri utrius-
que duo dicuntur. *Lata*, quae
velorum similia ARETAEUS di-
xit *de morb. diutur.* L. II. c. XI.
sunt ipsum peritonaeum, quod a
margine pelvis anteriori descen-
dit, & ad uterum quidem di-
ctum est; cum vero latius sit,
ad utrumque ejus latus retrorsum
fertur, hinc utero, inde pelvis
lateralibus continuatum ad poste-
riorem pelvis parietem contra
se ipsum rehit, adeoque duplex
est. HENSING *de part.* n. 47.
VESALIUS 656. & quasi per-
pendicularare septum inter antero-
rem, & posteriorem pelvis in-
dietatem facit VVINSLOVV. n.
601. VESALIUS L. V. f. 24. o.
o. Idem utrinque & uteri lateri
adhaeret, & vaginae, uti recte
SANTORINUS p. 219. maxime
in virgunculis junioribus, ibique
continuat parti peritonaei tegan-
ti uterum, prius dictae BID-
LOO. T. 50. EUST. T. XIV. f. 1.
GRAAF. T. XII. M. M. & XIII.
(sed relictum.)

Adem peritonaeum, quod liga-
menta lateralia facit, ovarium
amplectitur, eique pro mem-
brana communi est, iterumque
ab ovario recedit antroscum, la-
tusculum, propria productione
libere in abdomine natante, &
longius ovario attingit tubas, &
continet GRAAF T. VII. G. G.

T. VIII. O. O. T. XI. I. T. T.
XII. V. SVVAMMERD. T. 1.
D. D. T. III. tuncque porro ad
musculos, & vasa iliaca redit.
Haec ultima plica laepe, & MOR-
GAGNO imprimis *adv.* IV. p.
49. alae vespertilionis nomine
venit. Aliis vero, & Gallis ma-
xime, ligamentum ovarii tu duas
partes dividitur, posteriorem ova-
rio, anteriorem vero tubae desti-
natam GARENG. II. p. 64. VVIN-
SLOVVUS hanc alas parvas vo-
cat n. 602. Fibras carneas vero
alarum VESALII p. 660. f. 24.
P. a COLLINSIO p. 571. & a
BAYLIO repetitas *de catamen.*
a quibus uterum in penis occur-
sum deprimi VESALIUS dixit.
& DIONIS *cours d'anat.* p. 291.
recte refutat GRAAF. p. 106.
& VVEITERECHT *syndesmol.* p.
230. & HENSING. I. c.

Aterum ligamentum uteri *terre*,
sub tubarum origine EUSTACH.
T. XIII. XIV. f. 1. & anterior,
latius ibi, quam in progressu, GRA-
AF. p. 209. COVPER. ad T.
50. ex uteri lateralibus exit, inter
redeunt in se ipsum ligamenti
lati lamina HENSING. n. 47.
taeniae modice convexae simile,
& retro peritonaeum, quod elevat,
GRAAF. T. XI. D. P. F. & re-
tro arteriam umbilicalem, deinde
flexatur deorsum, atque super va-
sa iliaca extorsum obit, ad anu-
lum abdominali tendit, perque
eum ad initia femoris verius po-
stem convergens, & aliquibus
fibris ibi intertum BARTHOL-
BIST. 92. Cent. 2. LIEUTAUD p.
360. SANTORIN. p. 220. in-
fimbrias radiatim, & difformiter
solvitur, MORG. *Adv.* I. T. III.
GRAAF. T. VII. VIII. XI. VID.
T. LXVIII. quae in adipem evane-
sunt, extra pudendum VVIN-
SLOVV n. 622. GRAAF. p. 208.
MURALT. *vadem.* p. 419. FAL-
LOP. *obs.* p. 195. Cellulosum hoc
ligamentum est, vasis mifum
VVINSLOVV n. 619. SVVAM-
MERD.

MERD. T. III. V. GOVPER. l. c. ut in praegnantibus quadruplo crassiora sint, **RIOLAN.** p. 365. & in puerperis mire lingue distendantur **MORG. Adv.** IV. p. 49. atque stris fibrosis longitudinem sequentibus, **ARCHANGELO** dictis p. 194. & **NUGRIO** *adenogr.* l. 32 & **BAYLIO** l. c. & nuper **CL. TREVVIO** *Comm. Noric.* 1711. n. 26. & **MOEBIO** *diff. inuz.* obs. 2. aemulis musculorum: **LEUTAUD** l. c. ut recte cum carne tonient comparaverit **FALLOPIUS** *obs.* p. 195. **SANTORINUS** vero ornatus ex praegnantibus, & puerperis descripsit, & per cornua uteri in summum fundum ire, arcum facere, atque uterum de trahere dixit p. 221. quae forte causa fuit, cur multi anatomici Cremauerem foeminae tribuerint **DCXL** recentiores autem aliqui nuncios omnino vocant, ut **PINAEUS** p. 41. **NICHOLLS** p. 46. quos olim refutavit **FALLOPIUS**, deinde **GRAAF** p. 208. Longius vero descendere, & ad clitoridem venire, ut **COLUMBUS** p. 342. (qui pro novis describit) **NYMMAN.** *de vit. fetus* p. 43. 44. **BARTHOLIN.** p. 139. **RIOLANUS** *enchir.* p. 172. **VESLINGIUS**, & ante revocationem suam **DIEMERBROECK** p. 155. & nuper **CRAMERUS** *Comm. Nor.* 1734. *bbd.* 19. vel ad media femora pervenire, ut **C. STEPHANUS** p. 292., aut ima, ut **C. BARTHOLINUS**, ut etiam lapsis in genua muliebribus uterum detraherent, le **CLERIC** *Cbirurg.* p. 96. id experimento repugnat. Longe minus verum est, haec ligamenta cava esse, ut **C. BARTHOLINUS**, & **RIOLANUS** p. 184. qui eam viam

veneni venerei facit, per quam bubones nascuntur, & **BAYLE** l. c. & **NYMMAN**, qui ea via puerum respirare docuit, *de vita fetus* p. 43. 44. aut semen continere, quod **SPIGELIUS** ait p. 259. & **D. de MARCHETTIS** p. 47. & **VESLINGIUS**. Horum errorum illum jam **ARCHANGELUS** l. c. deinde van **HORNE** *prodr.* p. 27. istum **MOLINETTUS** refutavit p. 314. **FALLOPIUS** autem, qui extremitatem cavi fuisse dicit p. 195. b vaia vidisse potuit, in quae discedit.

Librum ideo uterum esse nemo negaverit expertus, & vera hic est **DREINCOURTII** *de utero* n. 1. & **KERKINGII** *obervatio* (*obs.* 20.) quam **GRAAFIUS** repetit p. 209. nam pondus uteri lata ligamenta facile inclinat, rectia vero vix ulsibi, quam in utero, firmitus punctum habent. A ligamentis autem latis, & a vagina adnexa hinc recto intestino, inde urethrae, & vesicae, retinetur uterus, ne nimis licentiose vagetur, aut per abdomen, gutturve obambulet, quae vetularum phrasia est perantiqua, nam apud **ARETAUM** reperitur *acutor.* L. II. c. XI. neque a recentioribus ejurata, ut apparet ex historiola **E. N. C. Dec. I. ann.** III. *obs.* 349. quam fabulam **RIOLANUS** castigavit p. 184. Idem recte addit, ovaria utique oberrare posse, quae etiam ab intestinorum pressione huc illucve cedere necesse est. Tenui intestino ovarium inhaesisse vidit **SANTORINUS** *obs.* p. 217. & in inguina etiam prolabi, testiumque specie imponere observat **CL. PARSONS** *of. the bladder* p. 141. neque quidquam repugnat.

neos habere, sed ego quidem nescio, ubi eos lacertos viderint [b]. Uterus virginis sedecim annorum extra mensium periodum tantillus est, fescuncem longus, sesquidigito nihilo latior, ubi latissimus, & intus exiguam cavitatem (e) continet fibrosam, transversis ductibus. Pulpa ipsa uteri in ea aetate tota homogenea adparet, praeter cervicem, neque arteriae, venaevae adsunt conspicuae, nisi in exteriori superficie: nullae denique glandulae adsunt, sed singularis substantia, quam cum videret, mereri existimavit GALENUS, ut hymnos Jovi caneret, quod tam mirabilia sibi contigisset videre. Contextus est vasorum arteriosorum, & venosorum, qualia nulla in virgine adparent, neque enim dissectus uterus sanguinem fundit, qui totus albicet. In gravidae vero feminae utero nihil fere vides, praeter sanguinem, & in eadem parte [d] in qua vix unum aliquod vasculum inveneras, praeter superficiem, in ea nunc tanta adsunt, ut digitum inferere posses. Ab ea vero magnitudine uterus ad priorem parvitatem redit (e). Vidi enim uterum feminae, quae decies & quater pepererat, similem certe virginei uteri.

Extensilis Haec tota diversitas, qua gravidus uterus a virgineo distat, debetur humori ab interioribus distendenti, neque ulli augmento solido, quod vasis appositum fuerit: & tamen uterus gravidus ita dilatur, ut 24 (e) libras capiat, si gemellis impraegnatus fuerit. Haec admirabilis fabrica, quae in femella humana vix extricari potest, aedit MALPIGHIUM [e*], ut in vaccarum uterum inquireret. Uterus arteriarum, & venarum tela est, & complicatio. Quod inter vasa medium, id cellulosum est, cavum, muco totum plenum in praegnantibus: utero (f) vero inani & vasa, & cryptae omnes evanescent, sive in virgine extra tempus mensium inquisiveris, sive in muliere, postquam peperit: neque ulla pinguedo circa uterum est, nisi in femellis castratis, & id ipsum de marium scroto obtinet: neque glandulae in utero ullae, sed cryptae ingentes, liquore turgidae, in quas humanae placentae inaequalitates radicantur, brutorumve cotyledones.

Hic totus uterus ex tantilla mole, exigua vi, ad insignem magnitudinem extenditur. Quo modo vero uterus, cinctus vasis adeo magnis, poterit

(b) Vide DCLXIV. DCLXXXVI. ubi etiam hanc sententiam videtur defendere PRAECEPTOR.

(c) DCLXIV. ubi reliqua, ad fabri- cam utero spectantia, habentur.

(d) DCLXXXV. Uterus in recente-

puerpera non maior pugno la- MOTTE obs. 357. &c.

(e) DCLXXXVI.

(e*) Epist. ad Spon. p. 29.

(f) DCLXIV.

ruerit a centro ad circumferentiam expandi [g], a tam modico influxu partis expandentis, neque potius ab ambeunte abdomine compressus fuerit, & quare ovum facilius potuerit distendere, quam uterus ovum comprimere, ad has quaestiones vix quidem datur respondere: Quod enim in ovo est, id omne ab utero venit. Neque statu distendi potest; sed distendi videtur a conjuncta distensione valorem omnium.

Elasheus] HARVEIUS, cujus nunquam sine reverentia oportet meminisse, scripsit, in ipso utero inesse vim, quae fetum expellat, tantam, ut inter mortuae matris femora puer repertus fuerit (b), quem post

sa-

(g) Uti semen visci in cortice arboris, & inter rupes platiae satpe, arboreque, bursi demum inter dura saxa augetur. SANTORIN. *obs.* p. 112. Vis enim viva omni vi intricatae major est. Neque vas cavitate uteri comprimitur, ea enim exterosum distantur, cum in externa superficie truncos suos habeant; eaque liberior fit.

(b) *de gener. anim.* p. 167. edit. Londin. Sed fetus a morte matris in lucem eruptentis numerosas historias invenio, quae eundem demonstrare videntur, aut magis in partu fetus partes esse, aut musculosam vim uteri ab ipsa morte superesse. In foetibus debilitate, & deliquis partus la MOTTE *obs.* 154. in convulsionibus BRESL. 1722. M. Dec. MAURICEAU *obs.* 131. cum pataliysi la MOTTE *obs.* 219. In media apoplexia partus BRESL. 1719. m. Nov. in agone moris BARTHOLINUS *bist.* 99. *Cent.* II. in comate matris HARVEIUS p. 266. in epilepsia ejusdem. HELMONT. *vir. multipl.* FONTANUS p. 115. E. N. C. Dec. II. ann. 2. *obs.* 32. Dec. III. ann. 7. 8. *obs.* 124. & cum perfecta mentis alienatione conjuncta SACOURVEE *parad.* p. 244. SCHURIG. *Embryol.* p. 474. PECHLIN. L. I. n. 30. Partus a morte HORSTIUS ex CORNARIO *bist.* med.

mir. p. 705. ubi plura exempla habentur. Duo exempla, sed de auditu habet HILDANUS p. 568. aliud suspectum SALMUTH *Cent.* II. *obs.* 1. Unum abique idoneo teste est in E. N. C. Dec. I. ann. III. *obs.* 318. aliud Dec. II. ann. 4. *obs.* 42. & Dec. III. ann. 4. *obs.* 131. & vivit, ut videtur, fetus ibidem *obs.* 81. tum apud VESLING. *ep. postb.* 7. & nichil Dec. I. ann. 3. l. c. Duo in *Alis Hafsiensis* ann. II. *obs.* 35. p. 92. & in Historiis BARTHOLINII. c. Aliud ROLFINKIUS *diff.* anat. p. 1195. aliud BRESLAVIENSIS 1722. m. Mart. m. Sept. quae historia satis fida videtur, & 1718. v. 1722. 1723. & fidus auditor la MOTTE l. c. p. 540. aliena quidem, sed satis probabili fide. Sed & NYMANNUS talia compilavit, & SCHURIG. *syntes.* p. 100. Verum aliud, quod maxime huc facit, in quo fetus & ipse mortuus, & pene purridus ex mortua matre egestus est, exstat E. N. C. Dec. II. ann. 4. *obs.* 107. & aliud ex languente, & pene mortua matre; mortui fetus egestus exemplum VERDRIES E. N. C. *Cent.* II. *obs.* 177. aliaque pariter habet mortui fetus SALMUTH *Cent.* II. *obs.* 36. & aliud MOECHSTETTER. Non tamen oportet dissimulare, lochia etiam, & sanguinem, a morte per uterum, & os, per expansionem

fatum uterus expulisset. Certe post partum uterus mollis est, uti charta pergamenata lota. Vivus autem coit quidem in se ipsum, ut cavum omne deleat [i], perinde ut vesica, sed sensim, & absque elateris indicio. In vivo enim animale aperto abdomine vesicam acu pupugi [k], cum tota urina plena esset, effluxit urina, & vesica in se ipsam coivit, contraxitque se pro ea ratione, qua urina exibat.

Liber) Tamquam *ζωον ζωον*, uti DEMOCRITUS, facile moveri potest sursum, deorsum, antrosum, retrorsum, dextrorsum, sinistrorsum: & pariter situm, uti figuram, facile, & frequenter mutat. Haec DEVENTRII (i) est observatio, os nempe uteri non semper recta

ref.

nem aeris elastici concitata erumpere, & hoc modo setum, cum effervescentibus lochiis, explosum fuisse E. N. C. Dec. III. ann. 3. obs. 44. & menies per os, nareque a morie apoplectica HILDAN. Cent. III. obs. 12. ut omnino circumstantias accurate perspicere oporteat prius, quam ex his observationibus pro musculo uteri aliquid concludatur.

(i) DCLXIV.

(K) CCCLXVI.

(i) Nemo fere anatomicorum ante DEVENTRIUM ignoravit hanc in situ varietatem, quae in utero, in vagina, & in uteri ore observatur, & ipse & in utero vacuo vidi dextrorsum tracho, & in praegnanter. In graviditate enim etiam frequentius contingere necesse est, cum funiculus rasilissime mediae placentiae, neque haec medio fundo uteri insigatur, ad eam vero partem uterum vertere, necesse sit, ad quam fetus pondus eum trahit MULLER de situ obliquo uteri Argent. 1731. Ergo Hippocrates fusissime diversos in situ uteri errores prosequitur *απὸ τοῦ ποταμοῦ*. β. & ab ea causa derivat sterilitatem ibi α. & β. & *απὸ τοῦ ἀπορροῦ* deinde PLATO in TIMAEO, ARISTOTELES *bisp.* L. X. c. 1. 2. GALENUS *diff. vulv.* c. 7. utrum ejusque colulum sursum, deorsum, antrosum, & retrorsum inclinari ait.

PAULUS propriam curationem, tanquā malo vulgo noto, uteri declinationi obponit L. III. c. 64. RHAEZES declinantem uterum cucurbitula admoda jubet corrigere de *sestionibus*. Sed & AVICENNA habet Canon. L. III. *ten.* XXI. Tr. I. c. 1. 8. qui hac ratione a semine aliquando vult averti, & RIOLANUS p. 184. & ROLFINKHAUS, & MAURICEAU p. 61. 57. & c. & BLASIVS obs. 2. L. IV. & GRAAF. p. 478. & CHARLETON de *catam.* p. 16. & RUYSCH. *Cent. obs.* 88. & in E. N. C. Dec. III. ann. 7. 8. obs. 9. (dextrorsum) & JUSTINA SIGMUNDIN, quae profundum situm oris uteri inter causas difficultatis partus retulit p. 188. 189. atque, si retrorsum declinaverit, periculum praefagit p. 12. & MORGAGNUS *Adv.* IV. p. 46. Ab eo tempore PARISINI *bisp. de l'Acad.* 1709. n. 5. hepar viderunt ab utero declinato in pectus impelli, & COUEY suum oris uteri ineertum facit in edit. *Camer.* p. 67 & MANNINGAM *comp. art. obstetric.* p. 3. 12. 14. qui ad omnes quatuor plagas declinare vidit, & CHAPMAN *improv. of midwifery*, qui oris obliquitatem solum ad posteriora, & ad anteriora admittit p. 9. & recentiores fere omnes. Hoc autem peculiare habet H. a DEVENTER, quod has uteri aberrationes

respondere lineae mediae, sive axi vaginae (*m*), declinare autem, ut reirorsum, vel ad latera aberret. Incommodum est, sed necessarium. Inde HELMONTII (*m*^{*}) voces, Deum ponere maximas potestates in membranis, cum ventriculus vim cibi mutandi nactus sit, uterus vim transformandi.

Pressus) nulla certe causa adest, quae comprimat uterum, quem molia undique ligamenta sustinent. Haec enim laxae tantum membranae sunt.

Defenditur) Supra uterum enim peritoneum proximum expanditur, uterumque cingit. Praeter eam membranam nullam aliam habet.

§. DCLXIV.

Membranis) Uterus omnino tegitur a peritoneo, tanquam externa membrana, & undique clauditur, ut nihil apertum sit, praeter tubarum aper-

rationes inter frequentes causas partuum difficultatum numeret novum lumen obstr. c. 9. 11. 45. seqq. quem sequitur MANNINGHAM p. 20. & 1. von HORNE *Vvbmutter* S. II. c. 2. iulc. Sed recentiores video non plurimum tribuere huic difficultati, & vix aliam agnoscere, nisi quae sit ab ossium pubis a sacro nimis exigua distantia. Certe etiam in heranis uteri enormiter devij partus felices reperio, & vis uteri, qua ferum propellit, etsi aliquam esse non repugnaverim, pene nulla est, si cum enormi nixu respirationis comparaveris, quo urgenie, fetus, qua data via, cedere cogitur, vitiumque mollis uteri facile ipse emendat, repulsus a sacro osse ad natus resistens ossis pubis intervallum; denique

(*m*) Lineam rectam per uteri axin cum vaginae axi continuam, alioquin elucere impossibile est, cum uterus etiam cum optima vagina angulum interceptat.

(*m*^{*}) Vide *saxtupl. digest.* n. 18. *ideam morb.* n. 2. &c.

(*a*) *Turbinatae, in Textu* Uteri pro-

prie sic dicti figura est, quae a SORANO primum demonstrata est, ut modice convexa superficie superius terminetur VESAL. p. 652. *de rad. Chin.* p. 122. inde duabus lineis sensim convergentibus, modice curvis, tanquam lateribus finiatur. Tales bonas icones RVYSCHIUS dedit in *Theor.* VI. & *Adv.* 1. Facies anterior, & posterior planiores sunt VESALIUS p. 652. RIoLANUS p. 125. latera pene acuta, magis eminent. Gracilior finis, in quo lineae convergentes coeunt, habet circumnatam sibi paulo super oculos vaginam GRAAF. T. VII. VVINSLOVV. n. 646. quae apicem relecti con similem uteri occultat. Confer EUSTACHIUS T. XIV. f. 3. cum T. XIII. & DCLXXV. Inde factum est, ut uterus vulgo nimis brevis & pinguis, & describatur. Tres nempe digitos transversos longum facit VESALIUS p. 656. GRAAF. p. 183. VVINSLOVV. n. 590. & alii: ego coram habeo, cuius dupla longitudo est, ex semina sanissima excisum. In puellis autem tenerioribus eadem exi-

aperturam. Interior autem tunica nulla [b] adest, ne minus facile uterus in molem majorem distenderetur; loco vero membranae sunt vasorum ultimorum exhalantium, & imbibentium fines, & in praegnantibus lacunae muci plenae.

Fibris (c) Uteri fibrae in integro, & sanguine distento utero nullae apparent, tunc enim mera vasa videntur. Quando vero a partu sanguine Tom. IV. C ipso-

existimus est RUYSCH *Mus.* p. 184. fabae mole HARVEI p. 272. in virgine piro, in muliere ovo inferno comparat IDEM p. 273. In gravidis insigniter increvit, ut totus uterus pene spaciatus in imitur, ROLANUS p. 186. MIDLOO T. 54. bene, DEVENEER c. c. VII. Crassities in matura femina circiter unciae [de gravida vero dicitur]. Duos digitos transversos facit GRAAF p. 183.

(b) Membrana exterior uteri peritonaeum est, quo undique obducitur, uti recte monuit ARANTIUS *de fetu* p. 3. Neque autem praeterea membranam habet, etiam ipsam membranam pro peculiari GALENVS nunciat *de vulv. diff.* Post hanc membranam cellulosa sequitur NOORTVYCK T. I. C. superius na adest, & brevis, ut vix possit a carne uteri separari. Interna, quam dixerunt GALENVS, qui venosiores facit externa l. c. & VESALIVS p. 656. & GRAAFIVS p. 186. & alii fere omnes, nihil est, nisi ipsam substantiam uteri velis. Viden qualem membranam hanc reperere VINSLOVVM n. 595. 596. VIEVSSENIVM *in vef. fyt.* p. 2. & SANTORINIVM, & GLIEVTAVD. p. 360. porolique ipsi tribuere, & lacunas, villosque. Verum non video, quibus notis haec membrana a reliqua uteri carne separari possit: Dudum nunciat MERY *bist. de l'Acid.* 1777. obs. 2. neque distentur MORGAGNIUS *Adv.* IV. p. 47. & veteres

video, ipsam carnem uteri pro ea membrana habuisse, cum crassissimam, maxime ad ostium, VESALIVS vocet p. 657. 88c. Membrana vero, quam bis in utero reperi, & facile separavi, mollis, porosa, ea chorion fuit, ut videtur, a conceptu infelici superfluo, & nihil cum naturali fabrica commune habet. Caro vero uteri, in nulla strata separabilis ARANTIUS l. c. BARTHO-LINVS p. 262. VERHEYEN. p. 127. NOORTVYCK *anat. uter.* p. 12. ipso modo; mollis, fungosa, PLAZZON. p. 127. compressilis, succo plena nihil fere cum ullo alio viscere commune habet, glandulosa tamen carni propior est, quod morbi utero familiares confirmant, scirrhii, canceri, lacomatata.

(c) Has fibras omni tempore in utero videntur Anatomi. GALENVS omne genus fibrarum in utero esse dixit *de util. part.* L. XIV. c. 14. BONACIOLVS, eum paucissima habeat, villos tamen uteri habet & longitudinales, & transversos p. 17. edit. Batav. FERNELIVS eadem docet *physiol. descr.* part. c. VII. VESALIVS suse, externas fibras in feminis, quae pepererunt, transversas, non plurimas, medias copiosiores reliquas, internas paucas, & rectas esse p. 657. & denuo has carnosas fibras reperiit *examen Fall.* p. 145. PLAZZONVS habet similia, p. 127. & BERGER p. 455. & GRAAFIVS p. 185. magis tamen in fundo, & C. BAVHIL- NVS

spoliatus pallet, tunc innumerabiles adparent. Inde sequitur, aut totum uterum nihil esse nisi fibras, aut omnino nullas adesse [*]. Quid ergo?
non

NVS p. 123. ARCHANGELVS fibras carneas inter duas tunicas evidentissime vidisse testatur p. 150. LVD. BARLES inter membranas, ad orificium internum telam carneam nasci ait *nouvell. decouv.* n. 3. S. COLLINS in praegnantium utero fibras musculares ait apparere p. 368. MALPIGHIVS non in vacca solum p. 26, sed in mulieribus praegnantibus fibras reticulatas vidit, ut totus uterus ex lacertis componi videretur p. 29. & observationem MALPIGHII MORGAGNVS in puerpera confirmavit *adv.* IV. p. 47. Carneas reticulares uteri fibras etiam CONNORVS habet *diff. de sarc. uter.* p. 49. MEYUS in puerpera uterum musculosum reperit *bist. de l'Acad.* 1707. n. 2. & LITTRIVS 1701. p. 385. qui reticularem musculum vocat p. 386. FANTONVS fibras uteri copiosissimas vidit p. 198. & musculum notabilem, quo corpus uteri componatur, ex transversibus longis, & decussatis fibris HEUCHERVS *art. magn. anat.* n. 63. VATERVS in sarcomate uteri carnem musculosam vidit propria diss. HEISTERVS denique, qui musculo uteri nihil tribuit, fibras tamen musculares uteri admittit *comp. anat.* n. 31. & in diss. MOEBII; SANTORINVS autem uterum absque dubio signo musculum vocat, cuius lacertuli in puerperis distincte adparent, & alii in orbem ducuntur, alii superne ab utero dimittuntur p. 216. GL. NOORTVYCK strias in utero pene in orbiculum dispositas reperit graciles, passim sparsas, neque ad placenta sedem limitatas, in gravida femina l. c. p. 12. 106. Ego denique,

sed omnino semel in utero tertio mense gravido, fibras in universum circulares vidi, deinde alias ex vertice uteri, per utramque superficiem secundum longitudinem descendentes.

(c*) Fibras musculares omnino adesse, & polle vi elastica, multis modis confirmatur. Uterus enim humanus, praeier experimenta, not. i. ad DCLXIII. ita valide in partu constringitur, ut etiam manum debilitet *Hist. de l'Acad.* 1715. p. 7. GL. ARTRANST de secund. cont. extrab. p. 23. MURALT coll. anat. p. 642. GL. BOEHMER in progr. de sit. uter. p. 13. & perforatus a fetu, intra breve tempus vulnus, quod fetum transierat, pene clausit la MOTTE *obs.* 316. E. N. C. Dec. II. ann. 9. obs. 115. Ilatumque ab exclusa placenta circa manum manifeste se contrahit DEVENTER p. 44. alias autem os uteri cramped constringatur incommode, partumque moretur SIEGMUNDIN p. 10. aut a partu ita cito se claudat, ut retineat lochia. HARVEIUS p. 295.

Deinde, matre immobili, fetu jam putrido uteris ita se constringit, ut puerum pellat, & juve eximentem SIEGMUNDIN. p. 31. notissimo denique experimento ex summa illa dilatatione in partu se intra paucas horas restituit, prioremque recuperat exultantem la MOTTE *obs.* 385. MANNINGHAM p. 4. &c. DCLXXXV.

Evidentius autem vidit HARVEIUS in prolapsu uteri, cum omnis septi transversus abesset actio, uterum se fetu mortuo liberasse p. 269. conspiciente BIERLINGIO. L. BOURGEOIS II. v. 39. RUY-

nonne RUYSCHIIUS [d] musculum vidit, quem descripsit? nonne illius auctione publica venditus est, boni senis manu praeparatus, uterus, in quo manifestas in fundo videres membranas circulares? Adiunt utique, sed fibrae non sunt. Quid ergo? Merae lacunae fungosae, sanguine plenes, quandiu uterus distenditur: tortuosum autem vas, aut accumulatio vasorum similiū, fibrā refert muscularem. Recte adeo MALPIGHIIUS, ignorare se, quid uterus humanus sit, & nihil musculosum reperire. Deinde alia ratio est, quare has fibras non credam esse de musculorum natura:

C 2

hi

RUYSCHIO *adv.* II. p. 24. & BIANCHO *de gener.* p. 114. & rescisso abdomine in cane solum uterum fetum exclusisse HARV. I. c. p. 133. alibi in *ex.* 67. motum uteri undosum se vidisse memorat, in recens enectae damae utero. Porro in caellis VERNETTE p. 247. 225. & GRAEFIIUS in cuniculo, motu undoso peristaltico fetum expelli vidit p. 313. & in cornubus uteri muris agitari motum peristalticum suis conspexit oculis MURALTUS *vadem. anat.* p. 544. nuperque VALISNERI *de gener. vivip.* c. 5 n. 22. RUDBEKIIUS uteri contractionem, quae post partum fit, discrete cum vesicae constrictione comparat *obs. post tr. de duct. aquos.* p. 129. Denique in partu muliebri ipse tetigit RUYSCH. uterum moveri, emicare, & manum propellere *obs. med.* n. 53.

- (d) DIEMERBROEKIIUS in puerperis viderat inter utranque uteri membranam contextus musculares, quos ad expellendos fetus aptos esse crederet p. 137. cito autem a partu evanescere addiderat. De Meryo dixi not. 5. & Littré. Unde RUYSCHIIUS in *Adv.* 10. Dec. II. fibras musculosas fundi uteri in circulos concentricos fere dispositas descripsit. Postea vero silius exposuit circulares subtiles fibras, (*Dec.* III. iconem vide T. 3. f. 1. & in *tr. de uteri musculo*) placentiam sepa-

rantes, ut minime necesse sit manibus eximere nimis adhaerentem. Iovenium ei gratulatus est A. Vaterus & Hecquetus, deinde recepit MORRIS Edimb. soc. II. p. 128. & SIMPSON Edimb. soc. IV. p. 117. alique, ut praeter vulgo notas fibras novum musculum admittant. Sed etiam solertissimus HUMMEIUS, quem nuper praematura mors exstinxit, altero a partu die RUYSCHII musculum se vidisse scribit *Comm. Lit.* 1738. *ibid.* 22. deinde ex reperiitis experimentis descriptionem dedit *ib.* 1739. *ibid.* 16. conf. diss. HOLLINGII *de offic. chist.* n. 12. GRAVEL *de supers.* p. 12. & RECK diss. *de dolor. a partu causis* n. 41. & iconem COMM. 1739. T. IV. f. 1. fibras nempe in fundo uteri tenues, in varios arcus absque ordine flexas, & decussatas, plerasque orbiculares, rectas alias.

Verum contra hunc musculum HESLERUS dixit *comp.* n. 31. & in diss. *Morbis* I. c. qui negat aliquid a dudum notis fibris diversum vere adesse. Tum Cl. HARTSTR., cum uterum musculosum admitteret, peculiarem tamen, & a fibris dudum notis diversum apparatus adesse negavit *de stund. extr. non diss.* n. 13. & testis omnium maximus RUYSCHIIUS in ultimo senio manifesto fassus est, parum se suo musculo tribuere, teste Cl. SCHREIBERO *de vit. Ruysch.* p. 54. ex ore communis

hi enim ea ratione distendi non possunt, nisi tanta vis ipsis inferatur, ut postea nequeant se in priorem brevitatatem restituere. Consideravi cadaver feminae, quae plurimos, & vergeros fetus ediderat: postquam fere decem annis desisset parere, vidi uterum nihilo majorem, quam virgini fuerat. Ergo fibrae uteri, quae in tantam amplitatem se pariuntur distendi, & tamen vim contractilem ita illaelam retinent, ut ad priorem parvitatem se contrahere valeant; non musculari potentia, sed communi aliqua vi elastica videntur agere.

Exter.

munis nostri amici *Ill. Bobli*, qui diu cum *Ruysschio* vixit, ul-
timus, & castissimus discipulorum.
Vtrum an ergo nullae omnino fi-
brae musculosae uteri adsunt? an
omnino musculosae fibrae uteri
sunt dilatatae, aut lacunae, aut
arteriae, venaeve, sanguine prae-
ter naturam turgidae, ut hic
PRAECEPTOR opinatur, & vi-
deo CL. GORTERUM sentire.
de mot. vit. n. 41. & LIEU-
TAUD. p. 359. & pridem fuisse
VIEUSSENS *nov. vof. system.* p.
15. BOERHAAVIUS quidem te-
nacitate elateris adlegat, quae,
in utero est, & desiccat in
musculis. Sed nocissimum est, in
testina ad enormem molem di-
stenta, facile, & pulso aere, in
angustiam summam redire CL.
LIEUTAUD. obijcit, uterum
ferum crassescere, cum ventricu-
lus, & intestina expansa exten-
duntur. Sed ea extensio uteri in-
vasis est, & dicitur alibi. Ve-
rum contractiles elasticas fibras
inesse utero, pallidas ante gravi-
ditatem, tunc vero vasis turgenti-
bus, uti omnes musculi minores,
rubicundiores evidentius conspici,
opinor certum esse, atque & au-
tome demonstrat, & experimen-
ta, & ipse denique ordo ramo-
rum expert, & recti tractus a-
vascularum figura alieni. Peculiarem
vero RUYSSCHII musculum, di-
versum a fibris illis uteri dudum
notis, neque cogit anatomico ne-

que ulla suadet admittere neces-
sitas. HUMMELII autem icon,
utia RUYSSCHIANA tota d. Hiert,
ita nostram sententiam confirmat,
cum fibras & circulares varias,
& varie longitudinales admittat.
[e] Intorris, in textu Vasa uteri in-
femini non inpraegnatis in uni-
versum proprios habent serpenti-
nos flexus; ut toto linere qui-
dem pene rectam lineam sequan-
tur, sed eam alternis undis inter-
ceptam describant. Habent HOR-
NE, SVVAMMERDAM *prodr.*
T. I. II. GRAAF. p. 187. T. 1.
utrumque & p. 187. & BOHN
p. 114. & iconem dat NUCK.
adenogr. T. XXXII. Confer etiam
FREIND. *emmenol. c. IV.* &
VATERUM *uter. grav. prooemi-
um* & p. 11. In praegnantie vero
utero has plicas evanescere, &
vasa in rectum exportrigi mani-
festo vidi: ubique enormiter in-
erescunt, ut credam BARTHO-
LINO, qui emulgenti comparavit
& GRAAFIO p. 215. qui digi-
tum recipere dixit p. 180. quod
de spermaticis C. BAUHINUS
dixerat p. 124. & RIOLANUS
p. 366. & SALZMAN in *obs. anat.*
& pridem CARPUS in MUND.
p. CCIV. Addit MAMPIGHIUS,
quas fere ad unam arteriam ve-
nas esse p. 16. & CAR. STE-
PHANUS, arterias magis quam
venas, flexuosas esse, quod ve-
rissimum est, L. III. c. 5.

Caecetum in non praegnan- te utero

Externæ) In viris muscoli abdominis propriis perforationibus instructi sunt, per quas vasa spermatica descendunt. Ita in femina pariter duo foramina sub peritonæi membrana reperiuntur, quæ duas vasculosas vaginas emittunt. Veteres vocabant inferiora ligamenta uteri, sed eos DRE-LINCOURTIUS [g] deridet, solebatque per jocum dicere, eos viros in came-

ro superficiem inprimis trunci percurrunt, sub peritonæo, ut in iconibus GRAAFII, & SVVAMMERDAMII adparer. In pulpa autem uteri dissecta adparent foraminum speciei, quod dissectæ arteriæ se sustineant RUYSCH: in iconibus plerique GRAAF. T. VIII. F. SVVAMMERDAM. T. III. S. MAURICEAU. p. 13. f. 3. DOUGLAS *Phil. trans. abr.* IV. T. VI. f. 2. Video MORGAGNUM, GRAAFIVM corrigere *adv.* IV. p. 47. quod pto vasis habeat, quæ sinus fiat. Verum ipsa teres figura, & repletio aliud suadent. Derique in ipso utero vasa perinde, uti in aliis glandulis, in rete intricata evanescent MALPIGH. *epist. ad Spon.* p. 26.

- [f] Lymphatica in utero vaccino facilia sunt visu, & calamo non innotata vidi; conf. NUCKIUM *ad. nogr.* p. 75. f. 33. RUDBECK *fig. nov.* IX. MALPIGH. *epist. ad Spon.* p. 26. GRAAF. T. XI. VVHARTON p. 244. Ita etiam ovium uterus lymphatica habet VIEUSSENS p. 14. Haec ipsa vasa ea lactea sunt, quæ EVERHARDUS, & DEUSINGIUS aiebant per lata ligamenta ad uterum, & cornua ferri apud TILINGIVM *de placenta* p. 261. 360. & defendit DIEMERBROECKIUS p. 286. 213. &c. Sed & ovaria brutorum lymphatica habent RUDBECKIUS l. c. NUCK p. 70. In homine obscuriora sunt. MORGAGNUS tamen in puerpera turgida, sub externa membrana repentia, vidit *adv.* IV. p.

76. & VVINSLOVV n. 623. & eadem sunt lactiferi ductus uterui involucri uteri a CHIRAGO demonstrati apud SCHURIG. *em. bryolog.* p. 4. Sed & MERYUS vidit, in omnibus partibus generationis apud la MOTTE *des accouchem.* p. 201. & STAEHELINUS meus *specim. anat. bot.* 2 24. n. 6. NUCKIUS de utero humano desperavit p. 75., ovarii autem lymphatica quatuor, aut quinque trunculis versus vasa magna, & cisternam chyli euntia pingit f. 32. Haec eadem vasa ovarii in femina enormiter amplius vasa fuisse PARISINI habent *Histoir. de l'academ.* 1707. n. 4. Nervos denique diximus ad DCLVI. Ab octavo pare deducit VESALIUS p. 660. sed intelligit intercostalem, a cujus plexu mesenterico infimo majusculos ramos video in uterum adire, & ex fine ultimo ramulos habent VVINSLOVV. p. 623. VIEUSSENS T. XXIII. n. 81. deinde a trunculo jam fini suo proximo n. 94. Addit GRAAFIUS ab osse sacro alios p. 182. qui mihi principes videntur, licum nervis clitoridis conjunguntur. Nervorum autem in alis vesperilionum plexum primus uberius descripsit SANTORINUS p. 229. T. 2. f. 3. Sensum hujus visceris acutissimum esse vulgum notum est.

- [g] DCLXIII. Eandem sententiam sequitur GARENGEOT *splanchnol.* II. p. 74. nempe ligamenta tertia communicationem inter externas, & internas partes genitales perficere.

camera obscura feminas vidisse, qui has taenias pro ligamentis haberent; neque enim ligamentorum loco esse posse, & uteram retinere, nisi quando feminae inversae incedunt. Vasa sunt innumerabilia, quae ex femore ad uterum veniunt (*b*), & quae post EUSTACHIUM depinxit SVVAMMERDAMIUS. Hinc intelligitur ratio herniatam, quae feminis accidit. Herniam (*b**) dicimus, quoties peritoneum extrorsum pellitur; id in viris sequitur vasorum seminalium iter: in feminis autem, quibus peritoneum simplex vasis illis femoralibus, pro ligamentis habitis incumbit, poterunt intestina secundum eorum ductum elabi, & primo inguinalem herniam facere, inter angulum femorum, & pudendi labium; deinde femoralem, quales ad medium femur prolapsas fuisse visum est; ut omnino MERYUS viderit faeces alvinas ex medio femore exeuntes per ruptum in dilatata vagina peritonei intestinum.

Communicantes) Ut arteriae femorales cum feminalibus, & cum iliatis internis, & reliquae pariter inter se conjungantur mutuo. Ita fit; ut in omni statu corporis, quidcunque feminae contigerit, uterus semper abunde sanguine. Si enim quinque fontes obstructi fuerint, sextus, quem solum apertum mansisse pono, omnem eum sanguinem solus ad uterum feret, quem quinque fontes ferebant. Omnia enim vasa uteri liberrime communicant invicem, & valvulis destituuntur, ut unica arteria repleta, continuo replantur omnes. Primus EUSTACHIUS in tabulis, VVRENIUS autem ex conjectura, docuit nullas valvulas in utero reperiri. Nisi hanc fabricam NATURA selegisset, in uteri distentionibus facile vasa comprimi potuissent, nunc difficillime hic obstructio oritur. Eodem artificio natura in cerebro utitur, ubi vertebrales arterias cum carotidibus conjungit CXXXIII. Ad uterum ergo descendit sanguis per spermaticas, parallelus subit per iliacas, & haemorrhoidales, ascendit ex femoralibus.

Valvulis) Uterum ergo possumus dicere texturam inextricabilem articularum,

[*b*] Omnes venae uteri miris anastomosis communicant GRAAF. p. 214. etiam cum haemorrhoidibus, de quibus negat IDEM p. 222. Res ipsa vera est, & perpetua, ut sola vasa genitalium externarum partium valvulas habeant. In ligamenti tamen terebibus venam vulvulifam depngit SVVAMMERDAM, ita dispositam, ut sanguinem ad uterum non sinat venire *prodr.* p. 27. T. 21. sed refutat GRAAFIUS p. 355.

[*b**) Hernias ibi fieri dudum FALLOPIUS vidit, qui hunc ligamentorum terebium exitum per anulum bene describit p. 195. 195. *b*. Sed NUCKIUS fuisse adfirmat productum feminis peritoneum in modum diverticuli, sique ligamenti terebii aliquousque comitari p. 130. seq. & L. 40. Verum nihil vidi unquam, nisi dubias aliquas rubellas strias, cremasteris imaginem, peritonaeum autem ab anulo, perinde uti in vitis, etiam aliquo spatio distat.

riarum, & venarum a pluribus originibus ortarum, & inter se communicantium, quibus hoc fingulare datum est, ut omnia incrementa arteriarum, & venarum exprimere possint (i). Nullum enim sanguinem continent in utero virgineo non menstrua, non autem mense nihil, nisi sanguinem, ut totus uterus videatur rubris vasis constare, inde iterum contrahuntur in latitudinem pene nullam. Maxima arteria uteri non distincti invisibilis est, si cum arteria rubra comparatur, & haec tamen invisibilis arteria adeo magna fit in utero praegnanter, ut initium calami scriptorii admittat.

Emisf.

(i) Ita RUYSCHIUS ea vasa vermicularia uteri ovilli prius limpida videbat manere, cum vasa rubra cetera repleta essent *Thes. II. off. 5. n. 19.* Sed idem alibi continua vidit arterialis *Thes. VII. n. 16.* Et vulgo notum est, in gravidis incredibilem vim magnorum vasorum carnem uteri pertere DOUGLAS l. c. quae in utero inani vix apparent: atque denique sanguinem naturaliter per ea vasa exire, quae liquidum pellucidum exhalabant. Ita MORGAGNUS sinus illos laxatos fluorem album, magis laxos sanguinem fundere credit *Adv. IV. p. 49.* LITTRIUS 1720. *bist. p. 20.* per eosdem poros in menstruat sanguinem, in gravidis mucus album exire, tenuem vero, & limpidum liquorem in non praegnantibus, neque menstruat. Hinc rete illud uteri cinereum, friabile, secretibus ductibus factum, ramosum, de quo dubitabat MALPIGHIUS, an arteriae, an fibrae carnae, an nervi essent p. 30.

[K] *Cavitate, in tactu*) Haec exigua est in utero non praegnanter, ut enormiter nimiam pinxerit VESALIUS l. 27. & etiam GRAAF. nimiam T. VIII. A. T. IX. Compressa nempe ubique inter crassas carnes uteri, semper plana est. & minimae capacitatis, cum anterior uteri medietas a

posteriori proxime abest. Conf. VVINSLOVV n. 592. & N. STENONIS iconem ACT. HAFN. 11. *obs. 89.* Porro inter duas tubas, & super cervicem lata est, in cervice pene nulla, dum femina virgo est. Sed septo quodam dicebant uterum uterumque in duos sinus dividi veteres, ut ARISTOTELES *bist. anim. III. c. 1.* & AVCTOR *Isag. anat. c. 30.* & PHILOTIMUS, atque PRAXAGORAS apud GALENUM *de diff. vulv. c. 3.* & GALENUS *de util. part. L. XIV. c. 4.* & AVICENNA CAN. L. III. *sen. XXI. Tr. 1. c. 1.* & RHazes *ad Mansur. l. c. 26.* Inter vero recentiores etiam divisum uterum describunt, futura, vel septulo, CARPUS in MUNDINUM CCXVII. CCXVIII. & *Isag. p. 226.* & Fernelius l. c. c. VII. *Parvus p. 106.* *Platerus p. 161.* *Laurentius p. 273.* *Pinac. p. 132.* *C. Baubinus p. 127.* *Mauriceau p. 41.* *Linden. physiol. p. 298.* *C. Bartholinus p. 154.* *Spizelius p. 259.* *Riolanus p. 196.* 197. *S. Hilaire p. 720.* *Diemerbroeck p. 137.* Ego vtro neque futuram, neque septum ullum video, uti recte Columbus monet p. 241. & Graaf. p. 179. Veteres autem forte unice bifidos uteres ad humanum genus transfulerunt, quod omnino probabile est, nam Golenus caprinum, & vaccinum uterum cum

Emissariis) Haec nunquam defunt, & quo magis uterus distenditur; eo majora sunt; minima in non gravidis, in praegnanate utero tam vasta aliquando octavo mense visa sunt, ut apicem digiti insertum reciperent. Mucoso humore plena sunt, & in haec ipsa loca placenta inseritur.

§. DCLXV.

cum muliebri convenire ait *de diff. vulv.* c. 3. unde manifestum est, quod datum *V. salus* monuit, p. 669. & de *rad. Chin.* p. 120. *Galenum* uterum muliebrem nunquam secuisse, *Praxagoram* autem, & *Philisimum*, oh hoc ipsum vitium, pridem *Galenus* accuavit. *Hippocrates* denique, vel certe auctor *testis* *cruciatos* manifestum uterum bicornem describit n. 1. Vel raram aliquem sulcum viderunt, uterum septo bipartientem, qualem *Riolanus* habet, & E. N. C. Dec. II. ann. 5. obs. 67. & *Morgagni* *An.* IV. p. 46. & Cl. *Grauel* de *superfet.* obs. 5. l. 2. aut medium lacertum cervicis, aut uteros demum rariori casu semiduplices, qualem *Matus* descripsit *Comm. Nor.* 1733 h. 25. olimque *Sylvius* append. *Isag.* & I. *Baubines* apud *Rousselum* *hystero.* p. 227. & *Littré* *hist. de l'Acad.* 1705. p. 59. In hydropica bifidum majorem, & minorem uterum lego in E. N. C. Dec. II. ann. 5. obs. 68. & apud *Grauel* obs. l. l. i. fere similis est. Uterus perf. &c. divisus *Paulin.* post E. N. C. Dec. II. ann. V. obs. 108. *Memoir. de l'Acad.* 1705. p. 504. Uteri duo, dexter major, ex *Margarita du Tertre*; alius ex la *Marche* apud *Heisterum* de nov. *invenit*, alius in *Alt. Sil. vol. VIII. mant.* n. 1. Vagina duplex, & altera pars laevior *Bartholinus* *Cent.* III. ep. 2. Vagina duplex *Comm. Nor.* 1733. *boet.* 25.

(1) *Tubarum* vide DCLXVIII.

[m] *Exiguus, in Textu.* Pars ista anatomico uteri difficilissima est. Id quidem facile est, superficiem cavitatis uteri superioris super

cervicem fere rubellam apparere *Graf.* p. 185. *Santorin.* p. 216. & naturaliter villosam, & flocculentam esse *Santorin.* p. 216. *Vinslov.* n. 556. Papillosam video *Ruysschium* vocasse apud *ERNDL.* it. p. 89. Vascula vero lymphaticodermica vocat *Viesseus* p. 17. atque minimas propagines in cavum uteri descendere, inque poris ibi aperti p. 20. 21. In testitudine interna uteri facies adeo evidenter villosa est, ut intestinorum tunicae intimae comparat *Taur.* de la *gener.* p. 17. Hos villos esse omnino arterias exhalantes recte *Kaauwen* n. 1037. 1038. partim vero reforescentes venas, *Noortwyck* p. 9. in eos ipsos villos productas, & utrumque certum est. Experimenta enim demonstrant, & *venis*, & ab arteriis, patulam viam esse in utero caveam. Nam status *Graafio* teste p. 184. *Fantono* p. 199. [ex *venis*] *Heistero* comp. anat. p. 109. *Pajcoli* de *homina* III. p. 61. *Ducerny* *Phil. trans.* abr. III. p. 21. & aqua observante *Graafio* p. 184. (sed in puerpera) & C. *Bartholino* de *siboni* usu, & *Listro* de *humoribus* p. 292. (qui tamen per glandulas uterinas ajunt exire liquorum impulsu vasu hyogastricis), & *mercuzius* *Cassibom* ap. Cl. *Bohemum* de *ist. uter.* p. 21. & in *meib.* *sec. vife.* p. 14. per arterias, & per venas, & cetera demum impulsu in vasa hypogastrica viam sibi in uterum aperit [*Bidloo*] & per eos poros exiit *Vinslov.* n. 617. Vicissim autem per eos poros aer ab utero in venas redit, *Bartholin.* de *laetis*

laffis dubia c. 1. p. m. 117. & *bist. anat.* 92. *Cent.* 12. *Heister* l. c. ipsamque placentiam per solertissimi *Noortwyckii* experimenta. Habet etiam exiguos istos uteri poros C. *Bartholinus* avus *inft.* p. 154. C. *Baebius* p. 127. *Collins* p. 568. *Graaf* p. 182. *Fitzgerald* p. 19. *Santorinus* p. 218. *VVepfer* de cic. p. 125. *Peyer* exerc. p. 76. (in puerpera) *VVelsch* Tabb. 52. *VVinslov* n. 596. *Noortwyck* p. 112. *Littera Mem. de l' Acad.* 1712. p. 281. Per hos poros uteri nullas ferofus blandus tenuis liquor *Kaauw* l. c. *Graaf* l. c. *Collins*, *Peyer* l. c. *Littere* l. c. *Pinacius* p. 119. subtilius *Fitzgerald* l. c. & in puerperis ipse sanguis *Littera Mem. de l' Acad.* 1701. p. 281. *Ruyfch* obs. 10. *VValdschmid* de abortu p. 11. & in menftruat *Littere* l. c. ut tamen apud plerosque aegre distinguas, an istos subtiliores fontes, an cavernularum velut ostia, deque *Peyero*, & C. *Bartholino* omnino probabile fit, eos ista potius vidisse. Porro in cervice uteri lacunae sunt, inter transversas lamineas interpositae, in substantiam uteri demerfae, a *TREVVIO* optime depictae *Comm. Lit.* 1712. p. 284. T. 2. f. g. quae brevem setam, statumve admittunt. Ex iis mucus exprimi potest. Videtur has lacunas dixisse C. *Stephanus* p. 108. habet etiam *Arantius* p. 5. *Riolanus* p. 197. 201. & *I. van Horne* prodr. p. 15. ubi meatus glandulosos vocat, & *Graaf* p. 181. 186. & *Verheyen* p. 127. & *Cl. Berger* p. 455. & *Santorinus* p. 216. & *Fantonus* p. 192. & *Lieutaud* p. 359. & *Pastolus* Ill. p. 60. & *Trevv.* l. c. aique *Petropolitani* Ann. Ill. & *Cl. Noortwyck* p. 105. In utero aliquae etiam, sed pauciores lacunae id sunt. Has *Arantius* p. 5. & *Malpighius* p. 29. & *posth.* p. 46. & *Graafius* habet p. 214. Duos *Fantonus* dixit prope tubos ortos, *Tom. IV.*

D

& per uterum ramosos, p. 193. iura *Santorinus* p. 216. In iplo denum externo limbo inferiori oris uteri folliculos describit *Cl. Noortwyck* muciferosque poros p. 7. & pinxit T. I. & olim dixit *Hardeus apiar.* p. 10. Corpuscula vero ovorum fornicarum forma in utero puerperae T. *Bartholinus* viderat p. 298. & *Collins* glandulis uterum, aique spongiosa substantia constare scribit p. 569. Recentiores autem bene multi glandulas uteri receperunt, a *Litterio* toties nominatas *bist. de l' Acad.* 1720. p. 22. & c. ut a *VValschio* Tab. anat. 52. & *Pastolo* l. c. & prope tubas, sed dubius, aliquas posuit *Santorinus* p. 216. ex brutis vero infecti *Tauvryus* anat. rais. p. 185. ex rupicapris *Hardeus*, *Exerc.* p. 3. & ex vaccis *Id. apiar.* p. 18. *Pechlin*, obs. 21. *Cent.* 1. ex equis *Collins* p. 639. Has glandulas se vidisse credebatur in muliere *Douglan* *abridg.* l. c. mucumque secretum docet *Kail. comp. anat.* p. 102. succum vero album chylosum *Preffon. Phil. transf. abr.* Ill. p. 210. Eas autem glandulas fateor me vidisse numquam, neque facile admittere, etsi tuberculosam faciem uteri viderim [*Vatero* pictam fig. cit. 2] quam scriptores videntur pro glandulosa habuisse. Negavit etiam *Maryn*, & omittunt recentissimi.

Deinde primus *Car. Stephanus* anfractuolos, & spongiosos canales in substantia femininarum praegnantum vidit L. Ill. c. 4. p. 295. *Riolanus* inventorem, & inventum laudavit p. 185. ut non bene meatus in spongiosa substantia uteri *Johanni van Horne* prodr. p. 15. tribuat *Svammertdani* p. 54. Uterum pluribus tubulis, & cuniculis percursi *Limdenius* dixit *ghys.* p. 300 & fere similia *Diondroeck* p. 140. & *Salzmannus* ex puerpera (*obs. anat.* p. 44.) *Baylius*, & *Charlestonus* propriam etiam

etiam experimenta adducant, & quarto mense praegnantis uterus cavernulis stylum ad nitentibus plenus describitur in E. N. G. Dec. I. ann. 4. obs. 191. 195. Caecos tubulos ex spongiosa uteri carne BOHNIIUS dixit p. 15. *Vieussensius* vocat vasa vesiculoso-lymphatica de nov. invent. p. 12. Sed uberius docuit MALPIGHIUM, spongiosam illam uteri carnem plenam esse cavernosis sinubus *epist. ad Sponsum* p. 30. nulla membrana coarctatis, spongiarum ductus referentibus *Vieussensius* p. 9. Contraria sententia membranosis vocant *L. Bartholinus* ad *Casp.* p. 149. & *Bayle de caus. catamen.* p. 23. &c. & *Berger* p. 256. & CHARLETON de uteri rheumat. p. 25. & *Monroo Edimb.* sec. II. p. 127. & robustos *Byles* p. 7. Hi sinus in sectione uteri adparent dissecati *Vater* fig. cit. C. C. C. inaequabili cavitare *Vieussensius* p. 4. *Verheyen* p. 153. Varie ramoli sunt *Malp.* ib. *Vater* p. 13-18. E. N. G. Dec. I. ann. 4. obs. 192. In cavitatem uteri passim aperitur *Malp.* ib. obliquis otholius *Vater* p. 13. *Santorinus* p. 218. (qui vero nihil praeter eos sphunculos habet) uberius tamen in fundi parte, cui placenta adheret *Vater* p. 16. Haec ostia, exilissima vocat *Bayle* I. c. sed in puerpera apicem digiti minimi receperunt *Morgagn.* & majora sunt, quam pro arteriarum portione HORNE de duct. saliv. II. Migna etiam oscula pingit *Noortvuyk* T. 1. P. Addunt viri egregii *Vater* fig. b. b. *Vieussensius* p. 5. communicare sinus istos cum vasis uteri *Vater* p. 13. *Morgagn.* IV. p. 48. arteriis nempe E. N. G. Dec. I. ann. 4. obs. 192. *Monroo* I. c. *Vieussensius* p. 58. *Simson* p. 39. a quibus sanguinem accipiant, & venulis *Monroo*, *Vieussensius* p. 6. 10. *Simson* I. c. *Bayle* p. 23. & per eas cavetulas liquidum in uterum depodi, quod

truncis vasorum injectum fuerit *Vater* I. c. & forte *Duvernoy* I. c. vicissim vero vasa per ostia cavernularum sufflari posse *Vater* I. c. E. N. G. Dec. I. ann. 4. obs. 192. 195. ut haec ipsae sint illae foveolae, ex quibus sanguis mensstruus exillare vius sit *Diemerbroeck* p. 143. *Barthol.* p. 155. *Vater* p. 17. *Vieussensius* p. 12. & *Lysterius* forte, quando menses ex glandulosis ductibus provenire ait, & ex istis locis solvantur *Vater* p. 18. Apparere vero maxime in praegnantibus, cum ibi augeantur *VATER* p. 14. MONROO I. c. SIMSON p. 75. ad unum, & duarum haec sunt diametrum usque LITRE I. c. SIMSON p. 75. MONROO I. c. & digni crassitiem ED. SOC. IV. p. 450. & una n. o. l. l. u. n. e. s. h. i. c. l. *VIEUSSENS* p. 4. in praegnantibus, & in menstruantibus MONROO, & digitum capite minimi in puerpera MORGAGN. I. c. calamumve scriptorium MONROO p. 128. in praegnan- te, digitumve NOORTVUYK p. 11. alio tempore arctos esse, Mucum naturaliter secernere dixit BOHNIIUS, & in iis repetitus est E. N. G. Dec. I. ann. 4. obs. 192. *VIEUSSENS* succum lymphatico-lacteum fundere p. 3. & liquidum albile ferre, quod reclusae venae umbilici ib. p. 10. Sed VATERUS in eas ipsas cavernulas vasa ait degenerare p. 15. LITTRIUS loco venarum esse, CL. MONROO utero pro arteriis esse ideo datas, ne impari perpetua fieret funella haemorrhagiae *Edimb.* Sec. II. p. 240. *VIEUSSENSIUS* autem in eos ipsos sinus vasa sua lymphatico- netvea ex superficie uteri inferi dicit p. 7. 8. Haec uterque peculiaria habet. Ipse etiam in praegnan- te muliere vidi sinus illos & replevi cera, ut ex oculis ultima fragmenta eminent, quae cera non, ut in vasis, teres, sed angu-

§. DCLXV.

Virgo) Ita voco feminam, quae incrementi sui terminum adigit, neque nunc impraegnata est, neque recenter peperit. Vulgo annus decimus sextus pro termino incrementi habetur.

Plus) Ab eo die, quo virgo nata est, cor ejus continuo expandit vasa, & distendit humoribus, sicque fecit, ut totum corpus increverit. Verum nunc pergit agere vis ea, quae distendit vasa, sed corpus non increvit, quia ossa nunc solida sunt; superest, ut vasa in latitudinem magis plena sint, quam ad eum gradum, qui requiritur, ut aperta lustineantur. Sed nunc omni mense pone corpus increvisse una uncia, neque nunc increfcere; superest, ut ea uncia superflua in vasis adsit, & nata est plethora (a) unciae unius sanguinis, nisi natura eam unciam alicubi excreverit.

D 2

Plus

angulosa, & multiformis, & frustulata uterum pereurit. Non ergo repugno, cellulosa spatiola in utero esse, interposita vasis, in quae aliquando serosus liquor, aut mucus, aliquando sanguis deponatur, & per poros majores uteri, illos ipsos forte, quos superius citavi, in uterum exeat, diversus tamen a liquore exhalante villorum arterioforum. Has nunc cavernas utriusque in bubulo utero vidit MALPIGHIUS in *epistola ad Sponium*, variis in stratis dispositas *possib.* p. 46. terminatas denique in duos magnos ductus, unum utrinque p. 16. qui cum utero gravido extensi, cubiti longitudine, fiant p. 28. & circa cornua orii, multis ramulis p. 27. in uterum, datis *possib.* p. 86. T. XI. f. 5. deinde ad cervicem uteri aegre conspicui, minores, iterumque in vagina majores, fig. cii. ibique frequenter ramosi, quasi globulis intercepti p. 27. & appendiculis caecis ib. tandem uno alterove ductu prope urethram aperiantur. Addebatur, ea vasa in vagina mucum, in utero magis terebinthinae similem liquorem continere

re p. 28. quem habeant a glandulis, propriis ostioliis se in eos ductus exonerantibus p. 27. l. cit. Hos ductus pene certum est, a veteribus pro ductu excretorio, si ve vase glanduloso a testibus ad exitum urethrae habitos, & descriptos esse, ut a GALENO *de diff. vulv.* c. XI. & ab HEROPHILO, cum sermone cum tuis nescio quomodo confuso *de femine* II. c. 1. quos renovavit FLAZZONUS p. 142. cujus ductus a LAURENTIANO differt, & C. BAUHINUS p. 116. negat autem VESALIUS p. 668. & de radice Cbin. p. 124. & CARPUS p. CXCv. & ad arterias refert van HORNE p. 14. 15. Sed in homine sinus omnes in universum dilate negat RUYSCHIUS, & VATERUM an vidisse diffectorum vasorum sectiones, & subdubitat NOORTVYCK p. 114. cum quibus neque sentire possum, neque pugnare, sufficientibus descriptionibus observationibus.

(a) PRAECEPTOR venisiam GALENI theoriatus defendit, qui passim plethorani pro causa mensum adducit adversus ERASISTRATUM & de

Plus quam) Uterus haeret in pelvi, ut nullam omnino pressionem patiatur unquam, sed liber haereat in amplo spatio. Omnes autem aliae in corpore partes premuntur. Huc ergo vergit plethora. Verum etiam mammae supra pectoris musculos locantur, sola pinguedine tectae, & fa-

xa

& de mil. part. L. XIV. c. 2. Eandem hypoth-^{sin} int-^{et} recentiores accuratius excoluit FREIND in *emmenol.* & PITCARNE de fluxu menstruo, & tueretur BOHNIUS p. 219. & KEIL comp. anat. p. 103. & FITZGERALD diss. de catam. Monspelii habita, & discipulus Boverhaavi GORTERUS comp. med. Tr. XXXV. & KAUVV de perspir. n. 1059. & le FEVRE physiol. p. 170 & author Comm. in H.ij. & CYPRIANUS epist. ad MILLINGTON p. 41. & DUVERNEY mem. de l'Acad. des s. 1706. p. 406. tum STAHLIUS cum adfectis p. 389. &c.

Ante pubertatem vasa genitalia minima sunt, & cordis impetus inpenditur, ut arterias totius corporis, cedentes, in longitudinem producat. Sed desinant arteriae elongari posse, supererit aliquid de eo sanguine, quem cor expellit, & id ipsum, quod abiimebatur in incrementum, nunc alia via oportebit consumi PITCARNE p. 154. sive omnino incrementum nullum nunc sit, sive minus, quam pro portione generati sanguinis, posterius autem verius videtur, recte observante D. SIMSON. p. 53.

Deinde convenit ferri hunc sanguinem inprimis ad uterum, quia arteriae eo ducentes debiliores sunt, magisque cedunt communi cordis impetui, & pro ratione venarum ampliffimae sunt DCLXI. not. a. FREIND c. 4. tum pro aliarum partium ratione maximae SIMSON p. 33. & pondus denique sanguinis per perpendiculares artetias, PITCARNE n. 5. in omni fere corporis situ congestionem in uterum determinat FREIND c. 4. f. KEIL

l. c. SIMSON p. 73. Venae vero reducentes uteri, & minus distensibiles sunt, & ad perpendiculum sanguinem reducant, & valvulis destituuntur, quae alibi sanguinis circulationem faciliorem reddunt FREIND c. V. & minores, pro ratione arteriarum DCLXI. not. a adeoque sanguis & majori copia, per arterias advehitur, & minori copia per venas rediti superest, ut in uterum facile congeratur, ibique flagnet. Nulli b. certe omnes, & majores, & minimas arterias ita coactis, & gelatinolo sanguine stagnantes reperi, quam in utero, ubi totum valorum systema sub inertia foetui plenum albis polytis vidis sed & GRAAFIUS vasa uteri infarta vidit coactu sanguine p. 200. Porro arteriae uteri serpentino modo flexae sunt DCLXIV. not. 7. Has nunc plicas ad retardationem sanguinis valere viderunt BOHNIUS, FREIND, BERGERUS p. 255. 256. HOFMANNUS: alias vero conditiones neglexerunt. Verum ob eas ipsas plicas sanguis dum has arterias excedit, congestus, producit sinus earum flexuosos, & angulos auget, atque totas arterias reddit longiores, sive quod idem est, profundius in uteri substantiam penetrat. Atqui extremitates haturum arteriarum aliae in venas terminantur, fortiores, & angustiores quam albi. & rectiores arteriis, & perpendiculares, & destitutas valvulis, ut omnino sanguinem difficiliter revehant. Ergo sanguis in arterias congestus non poterit majori copia per venas redire, uti majori per arterias advenit.

Sed altera extremitas harum arter-

xa cute, ut nihil sit, quod premar. Cum ergo hae tres corporis humani partes minus resistent, quam reliquum corpus, eo omnis humorum excessus determinatur. Praeterea uterus, & mammae (b) recipere contentiunt: quod enim per gestationem ad uterum confluit, id a partu ad mammas vergit; & lac sequitur secundo, tertiove die. Quae feminae menses nunc patiuntur, iis mammae tument: quamprimum menses fluunt, flaccescunt mammae, & collabuntur.

Latera.

arteriarum pater in cavitatem, uteri p. r. villos exhalantes cutis DCLXIV. per sinus piliuolos ut cinque minus evidenter ib. not. m. Ergo sanguis harum arteriarum in bivo constitutus, superum suum majorem, quem venae magis resistentes avertunt, inpendit in arterias exhalantes, easque distendit, uti alibi oculi arteriolas exsanguis, aut tubulos Bellini in haemorrhagis renalibus tolerare distendere, donec succedat alius primum mucosus liquor, ARISTOTELE in n. observante de gener. anim. L. II. c. 4. *bist. anim.* VII. c. 1. etiam tenerioribus non insequens PINAEUS p. 118. ut ipse sexto, & octavo anno videtur PECHLINUS *Cent. I. obs.* 34 & E. N. C. Dec. I. ann. 9. 10. *obs.* 28. & ann. 8. *obs.* 25. & nuper D. FITZGERALD p. 9. qui aliquid etiam debilitati tribuit villorum exhalantium. Post eum serosum liquorem liquor stillat lymphaticus, rubellus, qualis in utero feminae menses patentes vidit Cl. FITZGERALD p. 17. alias omnino flavus, neque ipsum sanguinis serum E. N. C. Dec. I. ann. III. *obs.* 115. Denique ipse sensim ruber sanguis per uterum exit. Contentiunt omnino ea, quae menses, aut augere observantur, aut minuere. Augent, & praecipitant menses calor regionis DCLXVII. vita laeta otiosa ib. not. a. e. maxime spirituosus potus FITZGERALD p. 59 laetitia, & ira, nova venus la MOT.

TE *obs.* 18. PECHLIN *obs.* 36. *Cent. I. BRESLAV. suppl. III. p.* 111. febris (TERENZONI l. c. p. 302.) pediluvia, vapores utero suppositi, sternutatio E. N. C. Dec. II. ann. 5. *obs.* 69. Dec. III. ann. 3. *obs.* 32. aliquando ipsa purgantia SANTOIRIN. n. 25. Haec autem omnia sanguinis ad uterum fluentis velocitatem augent, aut via uterina laxant. Minuunt mentes contraria, frigoris aeris, vita laboriosa DCLXVII. a. terror, diaeta acida, frigida pedibus admota, quae omnia nempe impetum sanguinis, aut minuant, aut avertunt ab utero. Reliqua facilia sunt, cum arteriae minimae ubique magnam habeant rationem ad imperium cordis GCLXI. hinc uti alibi arteriae runidae, vel diffectae, ita & in utero, facile, subleata plethora, arteriae in priores redeunt diametros, atque, ut prius, liquorem serosum excernunt.

Hic omnino a FREINDIO recedo, qui rumpi arterias, & cicatricibus claudi admiscet, ignarus legitimae anastomoseos, quem merito corripit HERELIUS.

- (b) Mammae eo semper tempore elevantur, quo uterus iurgit. Menses prodeunt puellis, quando uberibus dignis elevantur ARISTOTELES *bist. anim.* L. VII. c. 1. Causa dictu non est facillima, sed oportet, siquidem adest effectus, causam eam, quam PRAECEPTOR proposuit, aut solam, aut cum alia conjunctam, veram esse.

Lateralis) Sunt abscissi arteriarum fines, qui per extrema aperta hu-
res suos deponunt, haec in utero contracto aqua replentur, sanguine vero
copiosius adfluente majora fiunt, & latiora, & humidiora.

Pubem, inguina, femora) Inde enim vasa ad uterum veniunt (c).

Febricula) (d) vaginalis vera. Inter mille feminas vix una reperit-
tur, quae ante primos menses non febricitet, & haec tamen, quae non fe-
bricitat, lassitudinem in toto corpore percipiet.

Dilatantur) Plethora vasa dilatat, humores rarefacit, inde color ruber
intenditur, accedunt pulsus fortiores, calores, vera febricula. Sed id ute-
rus peculiare habet, ut arteriae uteri ex minimis possint maximae fieri,
& ex maximis minimae. Nempe arteria in utero continuatur equidem
venae

esse, neque quisquam fere repu-
gnat, vide SIMSON p. 45. &c.
Dudum GALENUS non simul
posse seminam & lactare, & he-
ne menstruari deutil, part. LXIV.
c. 8. Suppressis mensibus mam-
mae lac fuderunt, BERGER ex-
klar. merkvv. dinge n. 7. & vi-
cissima lac in puerpera per uterum,
& vesicam fluxit, LAURENTIUS
L. VII. c. XI. p. 258.

Aliquando tamen menstruantur
laetantes FREIND c. I. CON-
RING. de laite SIMSON p. 48.
SCHENK. E. N. C. Dec. I. ann.
9. 10. obs. 9. Sed id ad extremam
plethoram refero.

- (c) Dolor &c. signa sunt sanguinis ad
uterum vehementius determinati,
& vasorum ita distentorum, ut
distrahant vicinos nervos, quos
notum est plerumque vasa sequi.
Deinde tumere mensium tempore
uterum cum vasis, testes sunt GA-
LENUS olim de vulv. diff. c. 8.
& VESALIUS exam. obs. Fallop.
p. 150. & COLUMBUS p. 174.
& HERELIUS contra FREIN-
DIUM p. 9. & VERHEYEN p.
94. & LITRE bist. de l'Acad.
1720. p. 20. Hinc vulgo nota
eo tempore ad venem proclivi-
tas, etiam anatomico experimen-
to confirmata, cum RIEDLI-
NUS turgentem in menstrua
clitordem viderit. Pubertatis ve-
ro tempore vehementer sangui-

nem versus genitales partes in
utroque sexu determinari, & va-
sa dilatare supra priorem diamet-
rum, facile demonstratur, tum
a pube in utroque sexu en denum
tempore erumpente, tum a semi-
ne in maribus primum secreto,
denique anatomico experimento.
Constat enim arterias ubique in
corpore humano facillime in seut
repleri, in organis vero genita-
libus solis ante pubertatem, vasa
& minima esse, & ceram aeger-
rime admittere, neque unquam
vel ad tolerabilem elegantiam re-
pleri, nisi ubi prius ipsa per ae-
tatem natura collapsa, & solis te-
nuissimis liquidis pervia vasa dila-
tavit. Si vero tumorem uteri men-
ses fundentis non vidit VALVER-
DUS p. 199. & D-EMER-
BROECK p. 142. & GRAAFIUS
p. 199. raritati occasionem, &
subjectorum forte vitio tribui po-
test; nimis enim analogus est tu-
mor in vasis gravidarum, quam
ut recedere velimus a GALENI,
& VESALII experimentis.

- [d] Febriculam demonstrant capitis do-
lor, pulsulae virginibus molestae
FREIND c. IIX. E. N. C. Dec.
I. ann. 6. 7. obs. 233. SCHU-
RIG. part. p. 214. ex variis, &
frequentes tonsillarum inflamma-
tiones VVIEDEMAN. de. son-
fist. p. 20.

Erro-

venae sibi respondentis; antequam vero in venam (e) abeat, effundit humorem sanguine tenuiorem in vas laterale, quod ante venam ex arteria oritur. Pone nunc arteriam intumescere, eadem certe causa etiam vas laterale distendit, dilatabit sensim ejus ostium, donec ultimo adeo ampliter hiet, ut ipsum sanguinem recipiat. Tunc nascitur in utero levior inflammatio; & pergente semper agere causa urgente sanguinem in vasa lateralia, ita tandem expandetur etiam extremum vas laterale, ut totum in arteriam sanguineam mutetur. Sed finis hujus vasculi lateralis patet in uteri caveam; eo ergo sanguis extillabit, & simillima in utero haemorrhagia fiet, qualis in puero fit, cui narium arteria dilatata fuit.

Exit) Quando vero vasa lateralia sanguine se depleverunt in uterum, tunc convinct, & prior utero figura redit. Hac simplicissima ratione totum

(e) *Erroris loci perfecte ex PRAECEPTORE* repetit p. 26. tum ALLEN. *synops. med. c. 14. n. 7.* &c. pridem, sed non ita luculenter, PITCARNE p. 152. atque CYPRIANUS p. 41.

(f) *Mensum, in Textu.* Prisci fere lunam pro causa periodi adveniant, ut nodum DEA solveret. ARISTOTELEM vide de *gener. anim. L. IV. c. 2.* & GALENUM de *diebus decretorius c. 11.* Inter recentiores menses lunae etiam tribuit CRAANEN *Oecoonom. p. 716.* Sed facile adparuit confidentibus nullam esse phasim lunae, in qua feminae menses non patiantur LISTER. de *humor. p. 424. 425.* BERGER. p. 250. neque plenam, aut novam lunam hic aliquid a plebeis diebus habere praecipui, sed unice revolutos 28. dies sanguinem sequi. Confer BOHN. p. 222. la MOTTE, L. I. c. 12. JUNKER tak. *phys. p. 338.* STAHL. p. 356. qui aliquid tamen, ut erat in aetate benignior, novilunius, & plenilunius tribuebat p. 386. decrefcenti vero lunae favebat ARISTOTELES *hist. anim. L. VII. c. 2.* Mihi vero absque luna res non videtur ita difficultis. Post primum fluxum mensum, determinata diuturnitas nixus sanguinis requiritur, donec vasa uteri

inflexa extendantur, finesque resolvantur, & haec videtur esse rationem continuæ periodi. Quare vero hic nixus intra 27. potius, quam quadraginta, dies vasa uteri resolvat, ratio reddi non debet, &c. hic quidem pecti, nisi quis velit etiam rationem petere, quare nono mense homo, alio mense alia animalia pariant; &c. quare cerasa sex septimanis post horem, poma quatuor mensibus, castaneae etiam pluribus maturentur. Ipsa ratio periodi est in proportione virium expandentium ad vires resistentes: uti horologii definita periodos rationem suam habet, in ponderis ad volvendas rotas resistentes ratione. Ipsos numeros proportionis effectus docet, ratio vero in tota fabrica latet. Quando vero nunc prima vice post mensum regenerata est plethora, debet, si mulier sana fuerit, omni mense redire, cum eadem causa intra idem tempus debeat eundem reducere effectum FREIND c. VII. Caeterum, neque id dissimulandum est, hanc periodum non adeo regularem esse, & longe plurimas feminarum periodos vicinas menstruis experti, dies autem, certaneve regulam non sequi SANTORINUS n. 9.

totum negotium peragitur, absque imaginario [g] fermento, ex sola plethora. Hac nunc plethora liberatur corpus muliebre, non majori, quando primi menses illant, quam paucarum guttularum stillicidio, ut maculae aliquae in vestibus adpareant. Sed intra mensem par priori ple-

(g) Recentiores passim viderunt sistema plethorae quibusdam obnoxium esse difficultatibus. Nam etiam inedia confectae, tabidae, debiles, & exangues virgines menses saepe patiuntur. *Diamerbae* p. 141. *Charleton* p. 37. *Verbeyan* II. p. 95. *Schurig* *Parthenol.* p. 39. *Stahl* p. 188. & *Acutissimi ingenii Vir. P. G. VVerbosf. de febr.* p. 130. Porro feminae etiam robustissimae, durisque exercitae laboribus, menses saepe copiosos patiuntur *Bayle* p. 6. Sed obijciunt etiam venae sectionem neque retardare menses, neque necessitatem evacuationis tollere. Iterum perspiratio absque ullo majori malo augeri observatur, & minui per *Keilii* observationes; hinc neque sanguinis abundantiae noxae evidentes esse deducit *Simson* p. 9. *Ilustris* denique *VVerbosius* ingeniosissimo argumento usus est, feminas nempe, a quibus menses diu absint, tamen menstrui periodi tempore varios nexos, & molimina experiri, quae periodo illa elapsa evanescent, cui tamen nihil de plethora decesserit *de febr.* p. 100. *HERELIUS* praeterea menses in gravida abesse observat: neque tamen fetum libram illam menstruum, aut duas, nam ita citat, l. bras *FRÉINDII* absorbere, IDEMQUE vasa potius ex plethora intumescere, & sanguinem retinere turgida aequum credit, uti in gravidis fieri solet p. 22. quam dimittere libera.

Hac difficultates fecerunt, ut praerito chemico illo seculo passim fermenta, & effervescentiae advocatae sint, ut ratio redderetur effusionis menstruae: colligi nempe acre aliquid, ex aliqua parte

genitalium muliebrum residere, & paulatim auctum, tandem quocunque modo irritare uterum & distendere. Hoc fermentum alii atibi quaesiverunt. In universum *GRAAFIUS* p. 200. seque fermentis faver, & *BAYLE* toto l. bello, *COLLINS* p. 577. & parum diversus a *BAYLIO* *CHARIE* *TONUS*, est fermenti nomen longe refutet p. 68. seque plethoram enim succi alibilis pro fervoris uterini causa adlegat p. 119. qui retentus aescit p. 120. & ipse adeo huc recensendus. Porro & *TERENZONUS* *igniculos* huc advocat *GIORN. de LETT. XXIX. art. 19.* ex quibus in feminis fervorem ad venerem deducit p. 119. Sed & *VIEUSSENIUS* similia sentit *nov. syst.* p. 11. & *VERHEYENIUS*, cujus fermentum circa extrema vasa in substantia uteri residet L. II. pag. 56. Hi fere omnes causam mensium quaesiverunt in sinibus uteri cavernosis, ubi aliquis liquor excrementitius stagnaret *CHARLETON.* 117. eosque distenderet *BAYLE* p. 20. *TAUVRY* semen muliebre acre solum adducit *anat. raisf.* p. 189. & *VVENCK* in B. N. C. Dec. III. ann. 4. app. non valde a *GALENO* remoti, qui dudum humorem uteri serosum mordacem fieri, ac tumque facere dixerat *de util. part. L. XIV. c. 9.* *SANTORINUS*, non repudiata plethora, in proflatis femininis, & veneri simul, & mensum causam posuit *de catamen.* n. 61. liquorem nempe acrem, qui vaginam irruit n. 19. Sed etiam *GANDOLPHE* fermentum admittit. *bibl. de l'Acad.* 1707. n. 9. & *I. DRAKIUS* bilem singulis mensibus ex vesicula effluere.

plethorae renascitur plethora, vel etiam major, & vasa uteri, quae semel se dilatant sunt passa, facilius nunc dilatantur, atque cum renascente adeo plethora, etiam eadem, sed mitiora symptomata redeunt, & uberius

effluere, stimulumque in utero mirabilem efficere, e conjectura proposuit *ambros.* L. I. c. 23. **MORGANUS**, si diis placet, serum excrementitium glandularum omnium, maxime vero cellulosa, quae renes, uterum, & ovaria ambeat, hac via excerni credit *morb. pract. of. phys.* p. 246. cum nullibi certe, quam circa uterum, minus sit cellulosa fabricae. Sed anatomico tota abhorret ab his acrimoniis, & ova, & vesiculas Nabothi, & uteri succos omnes mucosos, & blandos in omni aetate, omni tempore reperit, semine virili manifesto blandiores, cum retenta nullum odorem carnis tribuant, neque urgeant barbam, & ipse sanguis menstruus mitis est **DCLXVII.** **SANTORINI** demum prostaticum liquorem multae seminae aut maritatae, aut levioris animi, abunde excernunt, nullam inde passae mensium diminutionem; totaque denique repugnat corporis oeconomia, cum inflammationes pleuriticae, ophthalmiae, haemorrhagiae narium, sanguinis per renes effusiones **CCCLXXXIII.** ab impactu, absque acrimonia fieri videamus; omnia vero, quae ab acri liquore sunt, sanguinis profluvia, vix sanabilia reperimus, argumento a scorbutico, a bile atra, a venenis deducto. Sed impedito etiam utero haec acrimonia non erodit uterum, ut necesse videtur, collecto, & exasperato fermento. Verum sanguinem menstruum retentum videmus, uti a plethora expectari potest, infartis jam arteriis uteri & ita resistentibus, ut sanguinem innitentem repellant, aliorum niti, ibique aut mechanice vasa

Tom. IV.

rompere, aut dilatare absque ulla erosione earum partium, per quas viam sibi apernit. **DCLXVII.** not. b. seqq. Sed in tabidis utique, si menses adfuerint, non difficilis, neque e longinquo petita excusatio est, quando sufficere dicimus, si in utero vasorum renixus debilius fuerit impetu immitentis sanguinis. Plethora adeo, multum imminuta, menses tamen faciet, si cum sanguinis copia vis contractilis uteri pariter debilitata fuerit. Verum certum est, frequenter menses abesse a tabidis, & post morbos diuturnos menses lente recurrere *Freind.* c. 1. plethorici autem, & macilentis, uberiore fluere. Lentiores etiam biimestresve periodi sunt ad annum quinquagesimum. **D.** c. VII. cum magis resistent vasa, & longiori cordis nixu superentur. Exercitatae vero rusticae menses pauciores experiuntur *Freind.* c. VII. ipso satente *Heretio* p. 18. 19. vix una die, vix unius unciae pondere sanguinem amittunt, non raro denique desistant mensibus *Freind.* c. III. uti neminem video, qui neget, lautis, & otiosis copiosiores esse, atque celerius, & bis aliquando intra mensem redire. Vidi etiam puellas, quibus duodecimo anno mensium indicia adparuerant, choreis, & frequentibus sudoribus excretionem sanguinis ita repulisse, ut post duos demum annos redierint. Venae sectionem autem menses non retardare, vix crediderim, si major, si propior periodo imminenti, si in minus plethorica fuerit. Certe *Tapuyae* seminae tempore pubertatis incisionibus filias suas per femora lacerant, ita a mensium periodulo

F.

uberius stillicidium menstruum renalcitur. Quam primum vero plethora abest, etiam menses sponte evanescunt, & una secunditas, anno aetatis 45. [b], vel quinquagesimo.

Tempore

riculo liberant, ut per totam vitam nullos pariantur LERY *in itin. Bras.* p. 302. & l. von STADEN. & notissimum est, abortus periculum averti, lochia, mensesque fluentes vena secta suppressi, ipsamque mensium necessitatem repetita venae sectione tolli FREIND. c. 7. §. 2. In feminis anno 45. venae sectionem largiorem saepe necessitatem mensium subito auferre, STAHLIUS ipse auctor est p. 387. Si vero levis sanguinis jactura, & longe ante proximam periodum, & in bene cibos digerente muliere fuerit, non mirum est, menses inde nihil retardari. Nam sanguinis copia, post aliquot a venae sectione dies, etiam major est QUESNAY *de la saignée* p. 366. & libram sanguinis intra 5. dies restitui observat DODARTUS *in bist. Acad. Reg.* p. 167. Perspirationis noxae avertit saepe succedanea diarrhoea, aut mistio uberior: sanguinem in uterum congestum, non alia via ex corpore, & imprimis ex uteri vasis, educi posse, facile est visu. Aliquando tamen salivationem, aut diarrhoeam (E. N. C. Dec. II. ann. 10. obs. 191.) mensium vice fuisse legimus FREIND c. IX. Neque uterus continuo, aut semper levabitur, si plethoram de reliquo corpore deleveris: poterit enim in partu semel manere sanguis, & densari in vasis uterinis, uti saepe inflammatorias obstructions nulla tollit venae sectio. Neque vasa, quod vult Cl. HERELIUS, supra certum gradum dilatare, mensesque retinere possunt, uti possunt in gravidis, quando oscula eorum excretoria oppositae radicales, pla-

centae obferciunt. Illae demum quas ILL. VVERLHOFIUS excitat, historiae, puto, rarsae sunt, & referri possunt partim ad vires consuetudinis, cum etiam ipse appetitus post horam prandii absque cibo evanescat; & sanguis praeterea per ea ipsa, quae citantur, molimina, in quibusdam feminis, ex uteri vasis in venosum systema perarum expediti poterit.

Cl. SIMSONUS omnino parum a nobis abest; Etsi enim plethoram repudiat, tamen ait incrementum uteri menses facere, quia sanguis sensim sibi viam in sinus facit p. 31. donec, sed post longos nixus, eos sinus ita dilatet, ut eo penetret p. 34. 64. tunc effusum sanguinem docet distendere sinus, sic vicinas arterias comprimere, circulationem sanguinis retardare, dolores facere etc. p. 40. donec per sinuum oscula effluat, inde vero laxari compressa vasa, & circulationis libertatem restitui &c. Sed vir Clar. errorem profundamento posuit hypotheseos, tunc nempe incrementum desinere, quando adeo lata sint vasa, ut facilissima sit circulatio p. 46. cum certum sit, solis exceptis genitalibus, in fetu plurima, & facillime distensibilia vasa esse, & maximam impetus fluidorum rationem ad solidorum resistentiam, cum aetate autem plurima perire, & ubique resistentiam vasorum contra impulsum liquidorum augeri VVINTRINGHAM *inquiri* p. 92. 106.

(b) Plerumque, nam exempla, quae nolo cumulare, existant feminarum, quae in aetate longe serius menses passae sunt, & compila-

Tempore) Feminae dantur, in quibus menses ad horologium redeunt, adeo accurate observant tempora. In aliis incertiora sunt tempora, uti variae circumstantiae exegerint, & diversa vitae ratio. Neque adeo mirabile videtur, si secundum certam regulam menses redierint. Nam etiam virili corpori per artem menstruam plethoram conciliare novi. Aliquando homines ex capite dolent, medicus jubet sanguinem mitti: levantur; sed post quatuor forte septimanas malum redit. Sanguis determinatur iterum ad capitis arterias, & dolorem facit, qui repetitae venae sectioni iterum cedit, quam EGO quidem non valde probo. Verum repullular vivax malum post duos menses, & repetita venae sectione denique plethora ita ad caput determinatur, ut stas redeat vicibus, nisi malum radicitus extirpatum fuerit. Hic Leidae mercator vivit, vir honestus [i], cui sanguis omni mense per arteriam haemorrhoidalem majori copia, quam ulli sanissimae feminae per uterum fluit, nempe ad integram libram, & observat periodos ad horam. Hac eadem ratione viros quoscumque liceret effeminare. Hibernus erat, cujus historia in actis Britannicis legitur, cui certissimus quovis mense morbus imminabat, nisi sanguis per apicem minimi digiti (K) efflueret: post mensem redibat idem fluxus, neque ullum in cute vestigium relinquebat viarum, per quas sanguis prodierat.

E 2

Cum

pilationem vide apud BRESLAVIENSES. Ita menses anno 55. adhuc fluentes vidit la MOTTE L. Ill. c. 9. Anno 60. BRESL. 1719. Oß. p. 494. 1722. m. Jan. 1724. m. Apr. Anno 63. BRESL. 1724. M. Jan. Anno septuagesimo FRANC. Ser. VI. p. 96. 98. Phil. tr. abridg. IV. p. 122. Anno 73. ID. Anno 77. T. BARTHOL. bist. 34. Cent. VI. Anno 78. HILDANUS Cent. II. obs. 60. 61. Anno 80. L. BOURGEOIS L. II. p. 24. HILD. obs. 63. Cent. IV. Anno 82. LANZONUS anim. 33. Anno 85. KERKRING. obs. 88. Anno 88. BRESL. 1719. l. c. Anno 89. FRANCUS l. c. Anno 90. BARTHOLINUS bist. 90. Cent. III. Anno 92. HAGEDORN. Anno 100. BLANCARD. Anno 102. SOLENAIDER apud SCHENKIU: & in variis decrepitis CARPUS p. CCKXX. Non tamen dissimulandum est, plerumque hos menses morbosos esse MANNINGHA-

MO monente p. 45. uti lethalia sunt exempla la MOTTIL, & BRESLAVIENSIIUM 1729. M. Oß. & 1724. M. Apr.

[i] Conf. CXIII. Menses viriles haemorrhoidarios MARCELLUS habet, ex AMATO, VESALIO p. m. 421. & RODER. a Castr. in praef. tum E. N. C. Dec. I. ann. 2. obs. 192. an. 3. obs. 108. ann. 4. obs. 44. 45. 69. Dec. II. ann. 1. obs. 70. & magnam compilationem dat SCHURIGIUS Parthenol. S. 11. c. 4. Menses juvenis per virgam fluentes STALPART van der VViel Cent. 1. obs. 80. E. N. C. Dec. III. ann. 9. obs. 136. SCHURIG. l. c. S. II. c. 4. & bis se vidisse testatur ALLEN, l. c. n. 9. Menses in juvene per vomitum exiisse BARTHOLINUS ictis est, obs. 33. Cent. V. Ex cute in viro BENIVEN. c. 4. Menses virorum ex digito, urina, alvo collegit SCHURIGIUS ib.

(K) Conf. DCLXVII.

Cum hunc fluxum tentarent siccare medicamentis, in morbum incidit gravissimum. Adparet adeo, corpus humanum, quando aliquoties per eandem viam sanguine se deplevit, consuetudinem indui, qua fiat, ut statis temporibus eadem pars sanguine obruatur. Quo plus sanguinis fuerit, quod effunditur, eo plus etiam in eandem partem redibit, si sanitas integra manserit, & bona chyli viscera. LISTERUS [1] narrat de lanionibus Londinensibus, eos vitulos reddere pinguißimos mittendo sanguinem, deinde corpora replendo lacte, sic plethora generatur sanguinis non rubri.

Eadem causa plethoram & ad uteri, & ad mammarum vasa determinat. Si alia autem pars fuerit, ad quam sanguis effluere consuevit, tunc quidem non ultra per uterum manabit. Triennium est (1724.) quod Amstelodami virgo in orphanotrophio vixit, cui omni mense ex cute capitis sanguis exludavit, spectaculo ita celebri, ut mille homines superlint, qui viderunt cominus,

[Vaginam] Non negaverim, & potest eo sanguis vergere, uti sunt, quibus per nares, aut aures, aut os denique effunditur. [m]

[5. DCLXVI. 3]

(1) De humor. p. 450.

[m] Ab omni tempore quaesitum est, num per uterum, num per vaginam potius menses effluant. Pro vagina pugnarunt rationibus variis, a magnitudine (sed imaginaria) vasorum cervicis, & uterinorum exilitate. PLAZZONUS p. 122. ab angustia uteri virginis SANTORINUS l. c. n. 3. a sanguinis mēstrui fluida natura, quem uterus coactum fundat VESALIUS p. 662. a mēstruis gravidarum sano fetu fluentibus, cum os in gravidis clausum sit ARANTIUS de fetu p. 8. STALPART van der VViel Cent. 1. obs. 76. PLAZZONUS p. 122. HILDANUS Cent. V. obs. 41. ZOD. GALL. ll. p. 141. BARTHOLIN. bist. 33. Cent. IV. SCHURIG. partenol. p. 148. 204. SIEGMUNDIN. p. 238. TREVV. Comm. lit. 1738. beobd. 9. la MOTTE obs. 25. quas observationes mire confirmare videtur la MOTTE experimentum

hæmorrhagiae, quae in grāvīda manifeste per vaginam fiebat obs. 209. Experimenta porro habent ZACUTUS [quem testem citat SCHURIG. partenol. f. ll. c. 3.] & COLUMBUS p. 174. PINAEUS p. 130. CAR. PISO de coll. fer. S. ll. P. ll. p. m. 159. BOHN. p. 217. BERGER p. 257. IANZONUS anim. 33. GOUEY ex ed. Camer. p. 75. qui omnes negant in utero menses patientium fuisse sanguinem; aliqui etiam, ut ZACUTUS, ex labiis vulvae menses viderunt stillare. Ita TERENZONUS de morb. uteri in scabiosa mēstruis suppressis etiam vaginā scabiōsam invenit GIORN. de LETT. XXIX. p. 355.

Alii ex utero pariter, & ex vagina fluere malunt, ut PLAZZONUS p. 122. HIGMOR. p. 100. FREIND c. V. HOFMANN. med. syst. p. 229. COLLINS p. 576. MAURICEAU obs. 49. p. 93. VERHEYEN. VATER. de atero grav. p. 5. STAHL. p. 195. ut tamen

tamen MAURICEAU, COLLINS, & VATER, & STAHL, plus tribuerent utero, PLAZZONUS, & HOFMANNUS vaginae.

Sed facile ipsa fabrica partium demonstrat, uterum naturale organum esse huius secretionis, neque adeo ab HIPPOCRATICA doctrina recedi debere, qui *πρωταυτον* u. mēies ubique utero tribuit. Uterus enim, & quidem fundus uteri, villulosus est, & arteriis exhalantibus scaturit. DCLXIV. vagina vero villis omnino destituta, quos non patitur adesse attritus necessitas, & membranam duram habet, & cartilagineam DIONIS *des accouch.* p. 166. sed arteriarum etiam majores trunci ad uterum veniunt, rami ad vaginam CHARLETON. p. 21. Glandulae vero vaginae a multis dictae, paucis vitae sunt. Lacunas enim nihil hic posse manifestum est, siue urethrae illas velis, satis incommode prostaticarum nomine appellatas, minime regulariter binas MORGAGN. *adv.* IV. p. 44. 45. quarum ostia pinxit MORGAGNUS *adv.* 1. T. III. ** & descripsit p. 36. & olim vidit RIOLANUS p. 198. siue de vicinis lacunis urethrae dicas, inferius utrinque inter nymphas, & papillares cuticulas ex urethra descendentes, positas, tres, quatuor, aut quinque, quales habet MORGAGNUS l. c. sed minores, & videtur DUVERNEYUS de textilis apud PEYERUM *exere.* p. 148. lacunas autem vocasse PLAZZONUM *de part. genit.* L. II. c. 6. & ex eo RHODIUM *manif.* n. 51. atque LINDENIUM *phys.* p. 332. siue demum intelligis minores illos, novissime sinuos, qui corpori clitoridis respondent, anteriores, inferiores, & a glande ejus ad urethram in recta fere modice cava linea descendentes, qualem unicum MORGAGNUS dixit l. c. & forte

GARENGEOTUS *Splanchn.* II. p. 57.

Glandulas autem vaginae alii pro fonte mēstrum habent BRESL 1721. p. 81. seqq. Verum ego maculas quidem vidi non raro, sed absque depressione, vel sinus. Glandulas autem vaginae a DUVERNEYO dictas PEYER *exere.* p. 97. & COLLINS p. 564. & E. N. C. Dec. II. ann. IX. *obs.* 124. & VERHEYENIO p. 146. T. 17. f. 2. a VERCELLONO adoptatas *de putredagr.* p. 16. & Cl. DIONIS *des accouch.* & ASTRUCIO *de las venereas* p. 153. & a RAVIO propositas apud VALENT. *not.* II. p. 65. & a CHESELDENIO p. 374. nunquam vidi, & refutavit MORGAGNUS *adv.* IV. p. 45. brutis nempe concessas, non homini, ut simiae E. N. C. Dec. II. an. I. *obs.* 61. sui RAI *synops. quadrup.* p. 95. alisque. Poros vero C. BARTHOLINI *de ovar.* p. 27. HARTMANNI, MALPIGHII *postb.* p. 46. GRAAFII p. 171. 214. VERHEYENI p. 133. aut sinus potius EUSTACHIUS. XIV. f. 3. 4. & FANTONI p. 192. 198. omnino aliquoties reperi, sed muciferos.

Verum experimenta praeterea pro utero, & a pluribus, & in universum a majoribus viris capta consentiunt.

Ut enim nihil tribuas capitibus illis venarum in uterum inferri DIACLIS, PRAXAGORAE, PHILOTIMI, GALENI *de diff. vulv.* sub finem, CARPI p. CCXV. *Isag.* p. 22. PLAZZONI p. 121. quae aiebant emulgentium aequalia fieri in praegnantibus, C. BAUHIN. p. 124. vasive in cervicem uteri apertis PINAEI p. 226. arteriis denique parentibus VESALII p. 657. poros certe uteri nemo negat, quos et Bartholinus, Graafius, VVessero, Pejero, VVelfebio, Fitzgeralde, Samterino, VVinslowo, Mauri-
ceau

§. DCLXVI.

Communicans] [a] Post RIOLANUM NUCKIUS repletis, vasis re-
perit, omnino has anastomoses vere adesse. Ob istam anastomosin, &
ob

seau p. 41. supra excitavi, & sanguinem videntur stillare in puerperis VVALDSCHMID. RUYSCH. LITRE &c. In menstruat autem, quod rem nostram demonstrat, omnino maculae in utero sanguinem stillantes visae sunt a LITRIO *Mem. de l'Acad.* 1720. p. 22. MORGAGNO *Adv.* 1. p. 39. T. III. *Adv.* IV. p. 48. SANTORINO apud MORGAGNUM *Adv.* IV. VERHEYENIO 11. p. 94. MAURICEAU *obs.* 49. & *prat. des accouch.* p. 48. SCHULZIO *Comm. Noric.* 1731. *spec. g.* VIEVSSE- NIO *nov. syst. obs.* p. 20. 21. FITZGERALDIO p. 17. HEISTERO *not.* 32. HERELIO l. c. p. 9. Ex ostio uteri stillantes mensui sanguinis guttas viderunt VESALIUS p. 664. la MOTTE *obs.* 21. PURMAN. *Cbr. cur.* 11. p. 486. LITRE *bist. de l'Acad.* 1720. p. 20. *memoir.* 1702. p. 182. MAURICEAU *obs.* 94. 312. E. N. C. *Cent. V.* *obs.* 24. In vagina vero nihil simile vidit LITRIUS, & MORGAGNUS, & iste quidem in solo fundo, neque ipsa cervix uteri, maculas istas vidit, consentiente la MOTTE *des accouch.* 1. c. 12. Porro uterum in mensium suppressione atro sanguine plenum vidit BLANCARD. *anat. prat.* p. 133. & COLLINS p. 579. & olim MARCELLUS DONATUS p. 455. mensesque per tubas erumpentes RUYSCH. *Thes.* III. p. 25. *conf. obs.* 85. atque stillantem ex cicatrice operationis caesareae me-

struum sanguinem la MOTTE l. c. *obs.* 339. Gravidarum vero menses vel ex oris uteri circumferentia externa fluere possunt la MOTTE p. 129. l. c. vel per ipsum os uteri, non adeo perpetuo clausum, vel per vaginam, sed praeter naturae legem GRAAF. p. 198.

Sacrossime enim ii menses nocent HIPPOCRATE teste, & ARISTOTELE *de gener. anim.* L. IV. c. 5. E. N. C. *Det.* II. *ann.* 1. *obs.* 110. BUCHNERO *in mistellan.* &c. ut tamen ideo non negem posse in plethoricis E. N. C. *Det.* I. *ann.* 6. *g.* *obs.* 63. ROUSSET. S. VI. p. 153. absque magno malo menses fluere. Has nunc uteri maculas, quas cum MORGAGNO vidi, analogia demonstrat esse stipata oscula arteriarum exhalantium, per venas enim excerni, ut G. Bauhinus p. 227. *Higmorius* p. 100. & Bobnius p. 225. & pariter ex venis, & arteriis *Pitcarne* p. 182. id quidem officio venarum manifesto repugnat. Recte haec Santorinus l. c. n. 4.

[a] Arteriae mammae aliae internae sunt, aliae externae.

Illae oriuntur utrinque ex subclavia, ubi sursum prodit thyroidea inferior, sursum, & posterius vertebralis, deorsum, & posterius intercostalis superior, supra terminatum ibi, caecumque pleurae saccum. Inde descendit inter pleuram, costasque cartilagineas, maxima parte musculus nuda, ferre ad perpendiculum, exit inter extremum sternum, & collarum
mar-

ob similem in mammis laxitatem fit celebris ille uteri cum mammis consensus. Quo enim semel natura viam sibi aperuit, eo perpetuo redit, ut quasi per consuetudinem omni mense sanguinem per loca genitalia excernere cogatur. Hinc fit, ut, in neutrum horum valorum, uterinorum, aut

marginem cartilagineum, descendit inter rectum abdominis musculum, atque peritonaeum, & paulo supra umbilicum flexitur introforum ad lineam albam, ibique ramosa evanescit.

Praeter alios ramos, minime hic eoumerandos, thymicam, mediastinam *VValther. de vasis vert.* pericardiacam lateralem, & inferiorem majorem, & pericardio diaphragmaticam, & bronchiale ipsam, quam aliquando edit, & majorem inferiorem diaphragmaticam, ramos minores per intervalla costarum exeuntes, ad intercostales, claviculam, sternum, costasque *Ruyfch. Ep. II. f. 2. 3.* ramos magnum cutaneum, quem edit, ubi iterum finitur, & alium, lateraliter divergentem secundum costarum marginem *EUST. forte T. XXVII. l. 12.* aliosque cuti, & obliquo externo datos; praeter inquam istos, principe loco hic memorandum exhibet ex intervallo secundae, tertiaeque costae, alias inferius (inter 4. & 5. *C. Baubinus p. 120. Cl. GUNZ. de mamm. p. 20.* trans pectoralem ad mammae pinguedinem, uti recte *Fallop. obs. p. 127.* & glandulam *Lientand* furculisque ad papillam exeuntem *Gunz l. c.* Ex ultimo vero inflexu trunculi, per ipsam recti musculi carnem duos ramos dat, qui cum totidem epigastricae ramis saepe communicant, *Enslach. T. XXVII. f. 12.* quem vide, *Casser. L. IV. T. XI. Fallop. p. 127. VVinslov. L. III. tr. de art. n. 90. tr. des Veines n. 60.*

Vena mammaria sola origine.

differt, quae in dextra ex trunco cavae est, ubi finis incipit *Enslach. T. XXV. XXVII. VVinslov. III. tr. des veins. n. 60.* in sinistra ex subclavia *VVinslov. l. c. Ensl.* l. c.

Mammaria autem arteria externa, quam recte distinguit *Vesalius p. 677.* & *D. de Marchettis p. 61.* & alii, una, vel plures, oritur ex subclavia, ubi sub clavicula est, retro Deloideum, datque alios ramos muscularis, uno vero ante pectoralem descendit ad mammam, maxime vero ad pinguedinem, cutemque *LEUTAUD l. c. GUNZ. l. c.* non absque aliquibus cum interna anastomosis *GUNZ. l. c.* Hic ramus mihi perinde, ut *CABROLIO obs. 7.* major videtur, quam internae rami. Per istas feminae, lae sibi super axillas ad mammam sentiunt attrahi *STAPHILIO* resse *p. 166.* Venam comitem *VESALIUS* pinxit *p. 453.* ic. *P. & dixit p. 677.* & ipsam longissimo trunculo sub cute cum epigastricae ramo exteriori communicantem. Haec ea est, quam *FALLOPIUS* a thyreoidea vena plerumque prodire vult *p. 122.* Epigastrica denique arteria ex Ihaca externa oritur, proxime prius, quam retro ligamentum pubis transeat *Casser. L. VIII. T. 3. VVinsl. Tr. des art. n. 133. conf. Ensl. T. XXVII. f. 12.* & alibi. Inde trunco suo ante peritonaeum, retro rectum abdominis n. usculum, adscendit *VVinslov. III. tr. des veins. n. 71.* & super umbilicum cum mammariae ultimis ramulis coit *Enslachius l. c. Casserius*

aut mammariorum, vis sanguinis venire possit, quin simul in alterum pariter ingruat. Inde omni leminae, quinque ante diebus, quam menses patiat, mammae turgent, maxime vero eo die, quo menses prodibunt [b]. Postquam autem menses desierunt fluere, concidunt eadem ad prius-

serius L. IV. T. XI. *PP*iml. l. c. *des vein.* n. 171. *des art.* n. 234. *Riolanus* (de vena) p. 176. Reliqui rami in musculos abdominis & cutem impenduntur, maxime vero notari meretur rarius exterior, qui longe saepe inter obliquum descendentem, & cutem adscendit, quemque vidi pariter, sed alio loco, cum mammaria communicasse.

Reade adeo egerunt, qui communicare dixerunt has arterias, ut *Galenus de diss. venar. & art.* c. 8. *Carpus in Sag.* p. 5. & 36. (sed ex aliis) *Fallopianus* l. c. *Eust.* l. c. *Pareus op.* p. 119. *Vidus* p. 290. *Pinaeus* p. 196. *C. Baubin.* p. 180. *C. Hofman.* de usu part. p. 315. *Casseri* l. c. *Higbom.* p. 120. *Vigier* l. c. 21. *Amstelodamenses* p. 8. in vitulo. *Nuck* in *adenogr.* p. 11. *Verbeyen.* p. 152. *Sebraier. obs.* 3. *Dec. I.* Raurapud *Valent* ll. p. 104. *Mangettus Theatr.* ll. p. 168. qui per pudendam redire vidit aquam injectam mammariae, *Gunz.* l. c. p. 24. Inde in vulnere epigastrici sanguis ad inguina eductus *Zod. Gall.* l. p. 51. Non optime vero has anastomoses raras esse dixit *Valverdius* p. 277. Minus bene alii, qui omnino aliquas adesse negaverunt, ut *Columbus* p. 173. *Carpus* p. CCVII. de homine locutus. *Jussenius a. Jessen. anat.* p. 28. *Major anat.* l. p. 17. *Murali. Vadem.* p. 6. T. *Bartholinus bist.* p. Cont. 1. & *bist.* 6. Cent. IV. *Barles nouv. decouv.* p. 148. *Hardev* in *prodr. phys.* c. 10. *Mauriceau* p. 412.

Porro recte plerique physiologi utri cum mammais aliquod com-

mercium esse dixerunt, ut *Galenus de util. part.* L. XIV. & recentiores fere omnes. Nam Epigastrica non raro obturatricem dat, a qua vasa varia pudendorum veniunt DCLXIV. & pudendas externas l. c. & c, si nihil dederit, uti negat dare *Vesalius* p. 660. proxima tamen est, & vicinissima arteriae Hypogastricae. Addit *D. de Marchettis*, arterias epigastricas in lactantibus duplo majores esse p. 62.

Verum an ideo lactis materia ab utero ad mammas determinari possit, in gravidis, & puerperis, & lactantibus, quibus plerumque menses desunt, aut a mammais ad uterum, uti sit, quando lochia mammas lacte exhauriunt, id quidem non dixerim. Nam angustiae sunt anastomoses, & vulgares ubique inter truncos vicinos, & denique in viris pariter, atque in feminis reperiuntur, uti etiam nunc in puerulo video. Sagaciter adeo *VERSA LIUS*, qui anastomosis non quidem repudiatis p. 476. parum tamen tribuit p. 477. (non ideo quidem, quod nullae ab internis arteriae mammae adeant, uti scribit p. 678. id enim alienum est a nostris experimentis) tum *Laurentius* L. VII. c. XI. & *Boyle de catam.* p. 64.

(b) Confer DCLXV. b. Inde illa effusa *HIPPOCRATIS*, Lac ex mammais fluere, signum debilis fetus *Apbor.* V. n. 52. *Epid.* ll. S. 6. Si mulier neque praegrans, neque puerpera lac habuerit, et desunt menses *Apbor.* V. n. 39. Ad menses nimios cucurbitulam maxi-

priorem gracilitatem, post tertiam septimanam, denuo in tumorem re-
dituræ. Sed gravidis etiam post retentos menses mammae tur-
gent, & post partum maxime. Quamprimum concepit femina, uterus
clauditur; tunc sanguis, repulsus ab utero, in mammas venit: in partu
depletur uterus, tunc mammae concidunt, sed brevi intervallo contrahi-
tur uterus; tunc autem mammae rigent.

Evacuatis &c.) Mammarum arteriae a proximo corde non recta via
adveniunt: sed ascendant ad finem pectoris, inde ad mammas retrogra-
dae descendunt.

§. DCLXVII.

Duriore) Dantur integrae (a) nationes, quarum mulieres mensibus
destituuntur: id de Scythicis [a"] narrant feminis, quae maritos in bel-
lo comitantur; vix eas mammas ajunt habere, vix menstrua pati. Ac-
cedunt nempe ad marium naturam.

Labore) Hae enim superpondium per labores [b] dissipant.

Succulentae) Novi feminas pulcherrimas, sed mollissimas, quae vix
integra septimana a mensibus liberae sunt (c). Hoc ab otio fit, & mol-
litiæ,

maximam mammis oportet admo-
vere HIPP. *Epid.* II. S. 6. In ea
parte, cujus mamma major est,
in ea secus de superfer. n. 9. Qui-
bus mammae gracilescunt, abor-
tiantur *Aphor.* V. p. 53. Cum hæ-
morrhagia uteri mammae colla-
psæ E. N. C. *Dec.* II. ann. 4.
obs. 154.

(a) De Brasiliæ indigenis dixi. Gro-
enlandiæ indigenas pube, & men-
sibus destitui OLEARIUS refert
in itin. *Mosc. Pers.* p. 170. &
PECHLINUS obs. 34. Cent. 1.
& menses in septentrione raro
res sunt FREIND. c. IX. HIPP.
viæ aspur &c. n. 7. His borea-
libus frigus solidas partes corpo-
ris striatiores reddit: illis Brasi-
liæ incolis plethora sub prima
mollissima mensium destruitur, ut
prius, quam nova generetur, so-
lidata vasa uteri pressioni san-
guinis resistere possint. *Re&c* Cl.

SIMSON, menses non necessa-
rios esse, quando uteri vasa ju-
sto minora sunt p. 79.

[a"] HIPP. *viæ aspur* &c. n.
48. Saltatrices excitat FREIND.
c. 3.

[b] DCLXV. not. a. g.

(c) *Minus, in Textu.*] HIPPOGRA-
TES, Graecus homo, quæ gens
feminas in gynæceo quietas, &
reconditam vitam jubebat agere,
mensium copiam integris duabus
heminis aestimat, *viæ aspur*
a. quam copiam credunt viginti
unciarum pondere esse; id ipsum
vero pondus FREINDIUS adsi-
gnat c. 1. Hispanis quatuordecim,
& sedecim unciarum menses esse
FITZGERALD I. c. p. 5. Occi-
tanis ab octo ad decem lb. Rata-
vis vix supra sex uncias GOR-
TERUS in *compendio* p. 141. &
rusticis germanis vix unius un-
ciae pondere DCLXV. not. g.

Uz

litie, deinde ab igne, quem pedibus feminae Batavae perpetim supponunt, deteritimum secutae morem. Ita enim inferiora laxantur, & eo sanguis adtrahitur, dum corpus quiescit, & perpetuo tamen cibis repletur opimis, & theae, coffeaeque potu. Nempe, uti in LISTERI experimento venae sectiones plethoram augent, ita his feminis accidit: & praeterea vasa laxantur, ut nullum sanguinem retineant. Non sanantur, nisi ad labores redeant; si noluerint, quadragesimo anno hydropicae pereunt: si autem conceperint utero, plerumque abortiunt.

Vias) Nulla pars est in corpore humano, ex quo aliquando menses non prodierint. HIPPOCRATES effatus est, quibus menses supprimuntur, & mammae tument, iis menstrua caput petunt, & furor accedit (f).

Qui.

Ut in copia, ita in tempore, quo menses sunt, aliqua diversitas est. Graecis biduo, vel triduo absolvitur periodus ARISTOTELES *hist. anim.* L. VII. c. 2. & HIPPOCRATES *med. prax.* de triduo, & ultra HIPPOCR. *de festu ultim.* n. 5. Occitanis intra quatuor, & sex dies menses desinunt fluere FITZGERALD. p. 9. In Anglia triduo FREIND. c. 2. In Belgio triduo, quatruiduo VERHEYEN. II. p. 93. GORTER. comp. p. 141. & in Gallia etiam triduo, quatruiduo MAURICEAU p. 49. Germanis integra septimana STAHL. p. 772. Sed ego, uti vidi hanc periodum, ita saepe etiam in feminis sanissimis breviorum vidi.

[d] *Tardius*) In calidis regionibus mire praecoces sunt, & fertilitas termini, & mensium adeo, cum ante menses feminae raro concipiunt. In provincia Indostanica *Assam* puellae anno aetatis decimo pariunt, in Balagatta octavo THEVENOT *Exp. T. III. L. I. c. 29.* & 48. Sed MANDELSLOH in indicis itineribus puellam vidit, quae secundo anno mammas extulit, tertio menses passā, quinto peperit. *Itin.* p. 118. Occitanis in adeo parva diversitate, menses integro anno

prius, quam Parisinis prodeunt FITZGERALD p. 3. In Belgio vero inter 14. & 26. annum, GORTERUS p. 140. In montanis menses serius proveniunt SAT. SIL. I. n. 5. & facillime supprimuntur, uti saepe in alpinis per querelas hospitum didici. Non ignoro, passim exempla exstare secunditatis valde praecocias, etiam in Europa. Ita nōpo anno puellae peperit exempla lego apud MARCELLUM DONATUM p. 184. 1. SYLVIVM de mens. mul. p. 165. JOURNAL des SAVANS a. 1681. BRESL. 1723. M. Nov. &c. & puellae, quatuor annorum adultae, & mammosae historiam habeat PARSINI in *Actis acad.* 1708. *biff.* 2. aliamque similem VALISNBERI *asser.* 9. magnamque vim praecocium puellarum, quibus a decimo anno ad primum menses eruperunt, videas apud FRANCIVM Sar. VI. p. 94. & SCHURIGIVM *Parib.* S. II. c. 5. Sed hic quaeritur de integris nationibus.

[e] *Rhetoricis menses* his intra revolutionem lunae sunt FREIND. c. I. etiam ex *Durero*, & ad integrum libram GORTER. I. c. p. 141. 142. pondere nempe pene triplo ponderis in ea regione, familiaris.

Quibus vero recentis menstuis per haemoptoen sanguis exit, sanantur, si catamenia redierint (g). Vidi huiusmodi haemoptoen, quae in consuetudinem abierat, ut sanguis floridus singulis mensibus, absque detrimento sanitatis, cum levi tussicula exferrearetur. [h] Vidi ubi evomebatur sanguis (i), vidi per alvum (K) deponi, & per sudorem (l)

F 2

Imo

- ris. Perficæ mulieres, ex luxuria, & otio celebres, in servida regione, bis etiam, & ter intra mensem sanguinem de utero fundunt *Fitzgerald* p. 3. Vide etiam exempla fluxus bis in uno mense redeuntis apud *Panarolum Cent.* II. obs. 41. *Mauriceau* p. 54. *Scrib. rig.* p. 148. & 14. diebus E. N. C. Dec. III. ann. 7. obs. 149. & 18. diebus in uno mense *Vernette* p. 142. Deinde otiosis ad sex, & octo dies periodi protrahuntur *Freind*, & *Gorter*. Sed & viris otiosis haemorrhoides frequenter LXIII. Sanguis enim multus generatur, dum valent viscera, quae chylum faciunt, & parum diffiatur, & in primis vasa non ita constringuntur, ut vel minimae plethorae resistere possint.
- [f] A suppressis muliebris epilepsiae *Coac.* L. III. & omne fere malorum genus, atque mors ipsa, intra sextum mentem *Weg. vossius* β.
- [g] Oculorum caligo discuntur, quando prorumpunt muliebria COAC. III. TR. III. n. 43. Cunctas pro mensibus menstrua *Pechlin.* obs. 42. Cent. 1. Recte haec *Freind*. c. VIII. & simillima *Præceptorum*.
- (b) Experimenta existant absque numero fere. Vide *Bennetum Theatr. tabidor.* p. 45. *Salmuth.* Cent. II. obs. 18. *Orrius. oscon. part.* p. 147. *Pechlin.* Cent. 1. obs. 43. E. N. C. Dec. 1. ann. 9. 10. obs. 27. & ib. Cent. X. obs. 33. In gravida] *Bresl.* 1721. M. Jul. *Harentorn.* *Harder apiar.* obs. 81. Phthisis ex mensibus suppressis *Bennet.* l. c. & *Hipp. vossius* & ex lochiis suppressis *Cattier.* obs. XI.
- &c.
- (i) Conspilationem habet *Marcellus Donatus bisf. med. mir.* L. IV. c. 16. & *Sennertus* L. IV. p. 186. tum *Stalpari VAN DER VVIEL* Cent. II. obs. 17. & aliam *Schurig. Partib.* S. II. c. 1. Sed etiam *Hipp.* vidit *Weg. vossius* a. & *Arætaeus* L. II. c. 2. & *Lang. Epist.* p. 54. & *Panarolus Pentec.* l. n. 6. & *Harder. apiar.* obs. 82. & *Lanzonus* obs. 182. & E. N. C. Cent. 1. obs. 41. Porro *Beniventus* exemplum narrat *marb. abd.* c. 41. & E. N. C. Dec. 1. ann. 1. obs. 95. ann. 6. 7. obs. 67. Dec. III. ann. 2. obs. 101. & *Ruyssb. adv.* III. n. 9. & *Molinettus* p. 326. In viro menstrua sanguinis per vomitus excretio *Bart.* Cent. V. obs. 33. In praegnanate ID. obs. 19. Cent. 1. *Pechlin.* obs. 37. C. 1. Lochia per vomitum COMM. Nor. 1735. heb. 40.
- [k] *Hildanus* Cent. VI. obs. 69. *Bresl.* 1721. M. Aug. *Paraeus* & *Schurig:* ex *Hollerio*, *Horstio*, *Dolaseo*, & *Bresl.* 1719. M. Oß. p. 493. Porro *Hippocrates* *Coac.* II. III. Tr. III. & *Duretus* ibid. C. *Baudin.* p. 124. & in E. N. C. Dec. I. ann. 3. obs. 24. 22. Dec. III. ann. 5. 6. obs. 196. Menfes cum haemorrhoidibus alternantes *Paulin.* post E. N. C. Dec. II. ann. 5. obs. 80. Haemorrhoides pro lochiis *Stalpart* obs. 78. Cent. 1. In gravida haemorrhoides *Sigsmundin.* p. 238. *Pechlin.* l. c.
- (l) Per poros verticis capitis *Körking.* obs. 85. *Pechlin.* Cent. 1. obs. 38. *Schenk Exerc. anat.* p. 175. *Verduc. de f. usag. des part.* *Ruyssb. adv.*

Imo ex interno oculi cantho (m) nonnullis menses fluxerunt. Ubique ca-

adv. III. n. 3. Rucker Comm. not. 1734. hebd. 8. Ex gena E. N. C. vol. VI. obs. 27. Ex nasi pinna E. N. C. vol. VI. obs. 27. Per poros manus, & genae sanguis cum saltu erupit Barthol. bist. 13. Cent. 1. Ex cute dorsii E. N. C. Cent. VII. obs. 86. Ex pollice E. N. C. vol. 3. obs. 161. Ex apicibus digitorum E. N. C. vol. VI. obs. 27. Mercatus apud Schurig. p. 206. & in eadem demum virgine ex his omnibus vis E. N. C. vol. VI. obs. 27. Per sudores Franc. Ser. XV. p. 269. 270. Ex cute nova ambustorum pedum E. N. C. Cent. IV. obs. 101. Maculae per cutem pro mensibus Barthol. ib. bist. 15. Fontanus consult. & respons. p. 150. E. N. C. Dec. II. ann. 6. app.

[m] Bartholinus bist. 16. Cent. 1. E. N. C. vol. VI. obs. 27. Sal. Alberti de sudore cruento. Zot. Gall. II. p. 43. Dodonaeus, Ruysch. adv. III. n. 3. Stalpart van der VViel E. n. 19. Harder. apiar. obs. 82. & ex Mercato, Delase, H. luvigto, Schurigius l. c. Schenk p. 631. Lochia ad integram libram ex ductu lacrumali VVoolhoufe in collectione a le Cers, edita p. 47. Habet etiam exemplum Monges. Theatr. II. p. 49. aliudque Cyprina m. p. 30.

Sed aliae viae mensium minus naturales superiunt. Per mammas menses Panarolus Pentec. IV. obs. 13. Stalpart van der VVIEL Cent. 1. obs. 79. in irata E. N. C. vol. VI. obs. 27. & ex Amato, & Brassavola, Marc. Donatus p. 410. Borstius bist. 48. Cent. 1. Ruysch. adv. III. n. 3. Paulinus E. N. C. Dec. II. ann. 5. obs. 70. & Schurig. ex VVolfio, Gaffero, Bauschio, & proprio experimento. Per nares Paeblin. Cent. 2. obs. 40. Schu-

rig. l. c. ex Bauschio, Bierlingio, Solenandro, Riellino, Brassavola, Tum Hildanus Cent. III. obs. 12. Freind. c. IX. Rucker l. c. E. N. C. Cent. X. obs. 38. Lochia per nares E. N. C. Dec. I. ann. 2. obs. 184. Salmuth. Cent. I. obs. 39. Per aures menstrua Franc. l. c. Schurig. ex Spindlero, Horstio Parth. l. II. Schenk l. c. & Harder apiar. obs. 83. Linder in A. Suec. 1723. p. 332. Rucker. l. c. E. N. C. vol. 3. obs. 161. Ruysch. adv. III. n. 3. Sub genu ex duobus fenticulis Bresl. 1721. m. Maj. Ex tibia Rhodius Cent. III. n. 50. Ex libris dextris Comm. Nor. 1735. hebd. 13. Hipp. 1709. yorax Per urinas Bresl. 1721. m. Jul. Brassavola & c. Salmuth Cent. III. obs. 36. Ex foramine inguinis Zacutus a Sennerto citatus. Ex poplite Comm. E. N. C. Dec. I. ann. 1. obs. 96. Ex pedibus Bartholinus Cent. 1. bist. 16. ulceratis Paeblin Cent. 1. obs. 30. Etimburg. Soc. Ess. III. p. 380. E. N. C. vol. VI. obs. 27. & Schurig. p. 208. ex Horstio, Zacuto, Riellino, Biancardo. & Comm. Nor. 1735. hebd. 40. Ex ulcere tibiae E. N. C. Dec. 2. ann. 5. obs. 81. & genu Dec. 1. ann. 4. obs. 57. Ex evulso dente Schurig. parthen. p. 94. ex Hollerio, & aliis, Rhod. cent. III. n. 51. Loescher de dent. sap. p. 22. Ex gingivis Zacutus, Dolacius, Horstius, le Grand, Biancardo apud Schurigium p. 95. Cyprianus p. 30. (de lechris) Ex ductibus salivalibus E. N. C. Dec. III. ann. 7. 8. obs. 87. Ex labio inferiori Cent. 1. obs. 48. Ex isthmo faucium Cent. V. obs. 48. Ex palato Brasl. 1723. M. Jan. Ex umbilico E. N. C. vol. V. obs. 161. vol. VI. obs. 27. RUYSCH. adv. III. n. 3. ZACUTUS, Rhodius

eadem materia est, floridus (n) nempe sanguis; qui per quamlibet corporis partem erumpit, si in ea parte ea consuetudo nata fuerit, cui vulgo uterus obnoxius est. Quam primum enim alia aliqua pars corporis magis, quam uterus, dilatabilis est, in eam sanguis erumpet, & per eam exibat, uti per uterum solebat. IDEM HIPPOCRATES in pulcher.

diut Cent. III. n. 49. Ex scarificatione E. N. C. Dec. III. ann. I. obs. 88. Ex vulnere digiti manus E. N. C. Dec. II. ann. 2. obs. 86. Ex irunco amputati pedis RANIE disp. Upp. habita n. 9. Lechia per vulnus cancrose marinae E. N. C. Cent. IX. obs. 54. Ex vena sponte rupta jugulari SCHURIG. l. c. p. 103. ex Frid. HOPMANNO, sapheua SCHENK. BRESL. 1724. p. 637. In gravida vena malleoli aliquoties aperta SELECT. FRANCOF. I. p. 186. & cruralis vena HARDER. apian. obs. 85. Conf. SCHURIG. parthen. p. 107. FRANCOF. I. p. 186. & integram collectionem apud FRANCUM in satyr. XV. p. 169. 270. & SCHENK. Denique FREINDIUS, non haemorrhagias unice, & venae sectiones, sed varias uberiores excretiones mensium loco fuisse fuisse demonstrat c. IX. salivationes, dyscrasiam, sudores, diarrhoeas DCLXV. not. g.

(n) HIPPOCRATES *de natura pueri* n. 12. *de generatione a. & ARISTOTELIS disp. anim. L. VII. c. 1. mendum sanguinem dixerunt talem esse, qualis a victima fluit, & cito congelascere. MARCELLUS DONATUS* exemplum habet menstrui sanguinis, qui in uterum effusus, omnino, uti saluberrimus sanguis, in scissilem duritiem coit p. 455. & menses ab aetate diu retenti omnis putredinis experies educti fuerunt a la MOTTE *obs. 341. & in E. N. C. Dec. II. ann. 3.*

*obs. 151. Hanc veram sententiam etiam ARANTIUS tenet de sensu p. 3. & MANNINGHAM p. 45. Recentiores autem, abusi forte Molais legibus, nescio quae vana mensibus tribuerunt, ut etiam vulgo pro philo habeantur. Vide ridiculas historias BOACCIOLO p. 39. atque STALPARTI van der VVIEL Cent. II. obs. 19. & E. N. C. Vol. I. non valde probabiles. Lentiores esse alio sanguine LISTERUS de humor. p. 401. & faciere ID. p. 400. ALLEN *synops. med. c. 14. S. HILAIRE anat. p. 756. Foetidissimos etiam SCHURIGIUS recenset p. 218. 219. & BRESLAVIENSES 1723. m. Apr. & haec acres, ut aliquando eum excoriaverint, spathulam atraverim GRAAF. p. 203. & esse feminas, quarum menses noceant la MOTTE l. c. p. 57. COLLINS p. 572. etiam arboribus E. N. C. Dec. II. ann. IX. obs. 37. ipsamque menstruarum seminarum halitum nocere VERHEYEN *suppl. p. 58. & haec menstruarum noxium esse la MOTTE obs. 87. Neque negaverim in calidissimis regionibus sanguinem menstruum facile putredinem concipere, uti lego Hortentoriarum calidissima menstrua dari TAVERNIER L. II. c. 27. & feminas esse, quibus acres manent, uti fluor albus saepe eum dequantat (CHARLETON *de catam. p. 182.) Perpetuum vero & in sanis, & mundis feminis, & in recenti emissio sanguine vitium****

cherrimo libro *de mulierum morbis* [a] dicit omne morborum genus nasci ex mensibus, & iidem mensibus eos ipsos morbos sanari. Si phrenitide femina laboraverit, & menses fluxerint, a phrenitide certe liberabitur. Ita diuturni capitis dolores mensibus restitutis solvuntur. Neque mirum, hi enim morbi fere a plethora fiunt, ea vero soluta morbos ipsos sanari convenit. Quando menses decimo quarto anno in puella apparent, deficient quadragesimo: si anno vigesimo primum prodierint, serius evanescunt: & ad quinquagesimum supererunt, si 25. to demum adparuerunt. In Italia, & Hispania femellae nubunt anno aetatis undecimo, decimo quarto, sed eadem cum trigesimo anno pariendi finem faciunt (q).

Denique SANCTORIUS (r) observavit, viros perinde, ac feminas menses pati, non tamen sanguineos. Sed in viris omni mense nasci ad pon-

vicium esse, nullo aut experimento certo confirmari video, aut ratione, quae demonstret, quo modo in uteri arteriis sanguis potius, quam in mesenterio v. g. corrumpatur.

[a] Mulleri sanguinem spuenti supervenientes menses morbum solvunt *HIPP. apbor. 32. Sect. V.* Et mulier, cui menses suppressi, sanguinis naribus fluxus bonus ib. n. 33.

(p) Non solum ex retentia aliquis sanguinis copia, ut in *CHEYNEI theoria* p. 166. sed imprimis a stagnatione ejusdem sanguinis in uterinis vasibus, hinc orta tensione partium, obstructione late per vicina vasa diffusa, & impedita circulatione per pelvim, cujus adeo ampla vasa sunt, ut dimidium sanguinem aortae descendentes accipiant. Deinde vitia, quae huc pertinent ex suppressis mensibus inflammationes, & suppurationes colli matricis *HILD. Cent. II. obs. 62. 63. 64.* Scirrhum uteri, ductibus dilatatis gipsosa materie plenis *FITZGERALD* p. 118. &c.

(q) Balagatenses feminae pariunt octavo anno, sed effusae sunt trigesimo *THEVENOT* l. c. Puella, cui menses anno tertio eruperant, quinto periit *PECHLIN.*

obs. 34. Cent. I. Menses a quarto anno ad octavum ordinati, sed puella non vitalis *E. N. C. Dec. III. ann. 7. 8. obs. 149.* Etiam *Gracis* mulieribus circa quadragesimum annum plerumque menses desinunt *ARISTOTELES de hist. anim. L. VII. c. 5.* Ita *PHLEGON* ex *CRATERO* historiam pueri excitat, qui septimo anno, ducta prius uxore, & genito filio obierit. *STAHLIUS* etiam parum vitales esse puellas, quae nimis cito pubescant, observat *de mens.* sub finem. Cum enim menses paulo ante finem incrementi erumpant, incrementum autem finiatur, quando vasorum resistentia cordis imperui aequalis est, & vasorum resistentia, quando vi cordis aequalis est facta, continuo augeatur; sequitur, citius in his, quam in aliis feminis, menses, ipsamque vitam destrui debere. Tunc autem menstrua desinunt, quando vasa uteri ita indurata sunt, ut a cordis impetu evolvi, & aperiri renuant *SIMSON* l. c. p. 70. Hanc duritatem in utero vetularum etiam digitus, & culter ipse percipit, & maxime siphon.

(r) Locus est *Sect. 1. apbor. 65. 66.* Sed negat

ponderis statim augmentum, & ad sensum, minui perspirationem, corpus languare per duos, & tres dies, & appetitum corpore, ut plethoram enatam inedia homo cogatur auferre. Tandem sudorem copiosum prodire, aut crassum, & multam urinam, atque ita morbum solvi, donec cum proximo mense novus redeat paroxysmus.

Hactenus dictum est, quo abeat superflua sanguinis copia, quae infanae feminae corpore generatur, postquam incrementi terminus advenit. Quando vero concepit, tunc ex hoc ipso menstruo sanguine retento, fetus

negat GORTERUS *de perspir.* p. 285. neque videtur res regulam admittere, nisi in universum subinde vitia perspirationis emendemur alia excretionibus aucta. Quare vero viri menses nullos patiuntur, non difficillimum dictum est. Nam istis circulations magis expedita, arteria aorta descendens minor est, DCLXII. & rami ejus multo duriores, & nulla in pelvi latitudo, vel laxitas, DCLIX. nulla denique vasa arteriosa exhalantia, quo decumbat plethora. Inde pueris, & juvenibus frequentes narum haemorrhagiae, adultis autem haemorrhoides,

Bruta vero menses non pati, pariter non difficile est. His enim duriora sunt vasa uteri, neque ita dilatabilia, ut arteriosum sanguinem recipiant. Id demonstrat comparatio spongiosi uteri feminae, cum muculoso, & fibroso musculo brutorum, (RUDBECK apud HEMSTERHUY, p. 339.) & carente sinibus, si fides CHARLETONO *de catam.* p. 125. tum cotyledonum indoles, quae laetico succo, absque sanguine turgenti, ut secunda etiam absque sanguine de utero decidat, cum feminis placenta sanguinea sit, & nunquam absque insigni cruoris jactura de utero avellatur. Nonnihil forte etiam perpendicularis situs potest, qui in muliere sanguinem in uterum determinat, a brutis autem abest. Ita FITCAR-

NE, & FREIND. c. 5. Ea causa etiam est, quare mulieres praebutis frequentius abortiant MONROO *Edimb. Soc.* II. p. 213. Id imprimis probabile fuerit, si verum est simias menses pati, quod in PEIRESCII vita narratur, ex aliena fide, & SANTORINUS n. 2. ex proprio experimento profert, & passim STAHLIUS p. 770. & biduo, triduoque quidem in E. N. C. *Dec.* III. ann. 9. 10. obs. 217. Omnia autem quadropeda vivipara, quae suffragines flectum, menses pati, uti ARISTOTELES *de gener. anim.* L. I. c. 20. *de bist. anim.* L. VI. c. 28. tantum pauciores, quod crassiora mingant, & in pilos plethoram absumant *bist. anim.* L. VII. c. 2. aut vacas etiam menstruari, uti ARIST. *de bist. L.* VI. c. 22. BOHN. p. 217. & canes, uti IDEM l. c. c. 20. & STAHL. l. c. & PLATER apud SCHURIGIUM citatus p. 126. & equos, ut ARISTOTELES l. c. c. 21. Id quidem nimium est: neque promensibus habere oportet venereum liquorem, qui ex brutis sub tempore pruriginis annuae stillat, uti hunc liquorem eo trahunt ARISTOTELES l. c. c. 20. CL. HERELIUS *Thes.* 2. Hic enim paucissimus, neque naturaliter sanguineus, neque ex utero, neque mensibus intervallis, neque plethoram solvere potens est. Deinde plethora brutis rarior est,

fetus aliquando ali debet (f), & crescere ad sex, aut decem librarum pondus, tum placenta generari bilibris, tum humor amnii parari. In has impensas consumitur copia superflui sanguinis.

est, uti **HALES** citatus **DCLXII.** not. b. & **ARISTOTELES** *hist.* III. c. 19. & demonstrat summa raritas haemorrhagiarum, aut haemorrhoidum, vix unquam in brutis observatarum.

(f) **Menses** primam materiam fetus esse *Aristoteles* *gener. anim.* L. I. c. 20. Gravidæ menses absumuntur in fetus nutrimentum *Hippocrates de nat. puer.* n. 6. Nempe laxitas uteri, & facilis sanguinis ad uterum decubitus, & praesentia villorum exhaliantium, quibus placenta inosculetur (*Simsen* p. 72.) conditiones sunt, abique quibus conceptus non potuit ali, & eae ipsae conditiones menses reddiderunt necessarios. Non ignoro, aliquando repertas esse feminas, quae menses non passae, tamen dicantur peperisse. Exempla numerosa exstant, & habent *Hippocrates Epidem.* II. f. 3. *Foetus* *ib.* *Rodericus de Castro de nat. mul.* p. 68. *Panarolus Pentec.* I. *obs.*

25. *Hild.* *Cent.* V. *obs.* 41. *E. N. C. Dec.* I. *ann.* 6. 7. *obs.* 159. *Dec.* II. *ann.* I. *obs.* 41. *ann.* 4. *obs.* 126. *ann.* 6. *obs.* 217. *Dec.* III. *ann.* I. *obs.* 24. *ann.* 7. 8. *obs.* 41. 19. *Cent.* VII. *obs.* 72. *Bohn.* p. 215 *Bidloo Exerc. anat.* *Dec.* II. n. 5. *Rhodius obs.* 54. *Cent.* III. la *Motte obs.* 23. 24. *Stalpart obs.* 31. *Cent.* II. & compilavit *Mosbuis Inst. Med.* p. 575. & *Marcellus Donatus*, addito proprio exemplo L. IV. c. 23. & *Sennertus* L. IV. P. 2. f. 2. c. 1. & *Franc. satur.* VI. p. 99. 100. & *Schurig. syll.* p. 176. Aliae vero post diuturnam mensium suppressionem conceperunt, ut *Bartschius* habet *hist.* 37. *Cent.* IV. aut cum paucissimis mensibus *E. N. C. Dec.* 3. *ann.* 2. *obs.* 214. Verum pauca exempla ad peculiarem fabricam pertinent, qualis in virginibus, aut Groenlandicis feminis dicta est.



668. **C**onstat dein, (*a*) ex binis superioribus foraminibus Uteri exire (*b*) duos membranofos canales, ex [*c*] angusta capacitate circa matricem sensim dilataros, in hemicyclos cellulofos flexos, tandem lato orificio, fimbriis carneis circumpositis ornato; constant membrana interiori glandulosa cum lacertis carneis; haec autem Tubae in omni fere animalium genere tempore orgasmi aphrodisiaci turgent, rigent, carunculis florent; in cadaveribus femininis dissectis tubae fimbriis complexa ovarium visa fuit; quinimo in cellulosis earum recessibus inventi fuere fetus quidem variis locis, varii quoad tempus a conceptu egressum, & quoad magnitudinem.

669. (*d*) Utero, ad distantiam binorum circiter pollicum lateraliter annectuntur per [*e*] ligamenta valida duo Ovaria, quae & ope membranarum aliarum a peritoneo ortarum obvoluta firmantur; haec sunt scabra, inaequalis superficier, satis magna, sphaeroidea, corpora, membrana firma inclusa; irrigantur [*f*] arteriis spermaticis, & hypogastricis, aliisque ante ingressum suum hic loci ita unitis, ut quasi unum vas, in reticulares plexus contextum, constituere videantur, quarum ratione corpusculi incredibilis multitudo; idem de venis hic fitis verum, ut & de numerosis vasis lymphaticis; omnia haec vasa cum nervis, ut faciant ovarii structuram, ita commiscantur, intrlicanturque, ut fabrica describi haud queat; in superficie vero ovariorum, sub membrana cingente, deprehenduntur sphaerulae inferne per calicem crassiusculum concretae ipsi substantiae ovarii, pellucidae, humore Lymphatico, ad ignem concrescente, repletae, binisque membranulis concentricis, sibi invicem arctissime nexis, constantes. Ovaria

Tom. IV.

G

ria

a Graef. de Org. Mul. T. I. C.

b Id. Ib. T. XI. I. MN.

c Id. Ib. T. XII. F. 2. ACCCBEE.

d Graef. de Org. Mul. T. VII. III. G.

T. XI. R. I. Q.

e Id. Ib. T. I. ff.

f Id. Ib. T. XII. L. E. Enstach. T. 23.

ff. 55.

ria porro haec in omni sano corpore feminino praesentia in juvenculis ante annos pubertatis parva, sensim majora tempore prolificationis maxima, in vietis iterum diminuta, observantur. Bullulae vero descriptae, calice suo haerent finibus minutissimis vasorum enumeratorum, post usum veneris fere tantum apparent, sensim tumescunt, pedetentim magis pellucunt, crassescunt in membranis suis, membranam ovarii elevant, extendunt, in formam papillae sic dilatant, ut emineant, a pedunculo suo pendeant, inde separentur, cicatricem cavam relinquant in substantia, & membrana effracta ovarii, sensim iterum coalescentem; tandem & in his bullulis hic loci adhuc haerentibus ovario, fetus inventi fuere.

670. Ex quibus omnibus satis certo confici videtur bullulas has Ova esse, quae ex vasculis ovarii suam fabricam, ex humoribus autem ejus mixtice praeparatis liquorem suum nanciscantur; ideoque huic muneri destinatam a natura esse totam hanc adeo mirabilem fabricam.

671. Unde & scitur, tubas veneris stimulo rigentes, simbris musculosis rigescentibus, ut digitis, amplecti ovaria, haec premere, suum autem os ipso hoc amplexu expandere, tum ovum maturum sensim separatum in cavitatem suam urgere, motu autem lacertorum suorum musculosorum sensim propellere, in cavum tandem uteri eadem causa dimittere, ibique vel sovere, si semen maris accedit, vel expellere, si absque hoc ibidem receptum fuerit.

672. Si enim animadvertimus in ea, quae omnibus oviparis accidunt manifestissime; tum in ea, quae viviparis diverso a coitu tempore inesse demonstrantur ipsis oculis; denique in illa, quae semellis humanis tam in naturali, quam in praeternaturali, statu gravidis, parturientibus, partu expulso liberatis, observata sunt contigisse; tum apparebit, quod hic modus nec impossibilis, nec alienus naturae sit, sed contra ubique hunc solum universalem esse: falsi conceptus, abortus, fetus in cavo abdominis, &c. idem firmant.

673. Itaque masculinum semen animalculis vivis scatens; maxima vi, summo calore, forte & ingenti copia spirituum ani-

animalium incitatum; impetu violento immiffum per os uteri tum apertius, valvulasque cervicis uterinae tum laxiores [g] in uterum muliebrem [b], tum pariter turgidum; motum; calefcentem, & quasi inflammatione levi validum; affluxu pariter suae lymphae, & spirituum irroratum; papillis nervosis in jugis rugosis vaginae (i) attritu titillatis; mox inde convulsiva uteri constrictione retentum, calefactum, agitatum, ovo occurrens, parte vivaci incredibiliter parva intrat per dilatatos tum poros glandulosae factae membranulae ovi, ibi retinetur, sustinetur, fovetur, nutritur, umbilico suo accrefcit, reliqua minus vivacia animalcula suffocat; sicque Conceptus factus est.

674. Qui ergo fieri potest in omni illo loco, ubi semen tale illud ovum alluit; hinc per tubam Falloppii ovario applicatam ovo affusum, aut in aliquo recessu ejus tubae illi occurrens, aut in ipso uteri cavo illud offendens, ubique idem efficere poterit: tamen est forte non improbabile perfectissime Conceptum fieri binis his in uterum eodem tempore simul delatis, commistisque.

675. Ovum impraegnatum clauso jam strictura suorum musculorum utero continetur; simul juga [K] membranosa, in cervice uteri posita, os ejus magis obturant, atque defendunt ab ingressu peregrinorum, quin & lentus, tenaxque succus vesicularis rotundis ibi positus [l] paratus, atque fere concretus in speciem pastae amylaceae; hinc ovum illud ejus uteri affluenti tum abundanti humorum copiae innatat; qui calore, & motu, semper liquidiores facti, per meatus inprimis spongiosos ovi parti uni adhaerentes impulsu intrant, ovulum distendunt, replent, augent; ibi iterum eisdem causis subtiliores redditi Embryonem nutriunt, amplectuntur, defendunt contra pressionem inaequalem; tum quoque membranas ovi

G 2

pari-

g Morg. Adv. 1. pag. 11. T. 3. Graaf.
de Org. Mul. T. 9. C.

h Ruyssb. Adv. An. 1. pag. 2. 3. 4. T.
a. F. 3.

i Morgagn. Adv. 1. pag. 20. T. 3. 11.

K Morgagn. Adv. 1. pag. 11. N. 14. T.

3. LL.

l Morgagn. Adv. 1. pag. 37. 18.

pariter crassiores reddunt, simul & explicant, inprimis ea parte, qua ovario adhaeserat, ita ut ibi forment rudimenta placentae, quae videtur modo esse ipsum calycem ovi prius formans substantia aucta omni quidem dimensione omni fere momento temporis; eo [*m*] major, quo fetus origini propior, ratione molis in fetu.

676. Dum vero eadem illae causae assiduo renovatae magis magisque pergunt augere molem ovi, & Embryonis, simulque meatus tam placentae, quam membranularum, ampliant, incipit ovum sua jam mole capacitatem uteri implere, ejus superficiei cavae suam convexam applicare, jungere, ubique unire emissis, receptisque tenerrimis vasculis, maxime autem in loco placentulae; (*n*) ubi in tubercula inaequaliter assurgens se insinuat in cavitates uteri extensi amplas, quo ipso opere & uterus extenditur quaquaversum, & pari proportionem omnia ejus vasa omni mentura ampliantur, plus humorum recipiunt; plethorae menstruae materiem consumunt; hinc pariter eadem plane proportionem, qua crescunt meatus ovi, etiam dilatantur emissaria uteri, ita ut capacitas horum unita sibi invicem jungat uterina, & ovi vascula; eaque ratione impediatur effluxum lymphae, vel sanguinis ex utero, & efficiatur ut depleantur vasa uterina in ovum distentum, ejusque vasa, & vicissim illa ovi in uterum [*o*].

677. Et quia fetus jam umbilicali funiculo jungitur ipsi placentae, atque constat hic binis vasis ducentibus humorem ex fetu in placentam, uno autem majori ferente ex placenta in fetum, evidens est renovari sic his viis perpetuo omnes humores hic collectos, nec stagnare, nec putrescere,

678. Ubi autem mutua haec osculorum ampliatio intra bimestre crevit eousque, ut uterina interna emissaria ipsum jam sanguinem possint emittere [*p*], & alia eum recipere, tum sanguis abundans vasis arteriolis amplis uterinis contentus, ad placentam uterinam appulsus, ejus vasis dilatatis impelli, in
ejus

m Robault. Off. An. Visc. 1.
n Vater. Fig. Uteri Gravid.

o Id. Ib. Morgagn. Adv. 42.
p Ruysch. Ob. An. Chir. X. Fig. 12.

ejus structura mutari, sic ad fetum mitti videtur: quia haec morrhagia in abortu, partu, vulnerata gravida, puerpera; separata placenta contingens; tum iactura sanguinis in fetu vulnerata matre tantum, id evincere videntur; licet obitare videantur in cadavere non apparentia vasa, & (q) membranula integra placentaе superficiem utero contiguam cingens, eamque politam reddens; (r) varia saepe mole, nec semper congruente corpori fetus.

679. Etenim totum (f) placentaе corpus (s) arteriis innumerabilibus, ubique dispersis, abique apparentibus glandulis (u), ut in cortice cerebri: venis simili artificio intertextis, folliculis lymphaticis, & vasis lymphaticis, inprimis constat, tum, (x) membranula tenui, facile lacerabili, (y) quae leni pressu placentaе recentis infinitis obliquis oculis fudas roridas sanguinis, aliorumque humorum, guttulas, ipsaeque haec obliqua vascula microscopiis offert cernenda, a Chorion producta supra corpus placentaе convexum, qua jungitur utero, ambitur; unde ergo placenta inter chorion membranas explicatas media sita, utraque sua superficie a chorion tegitur (z); recipit [aa] binas arterias a fine Aortae descendentes retrogradas ad umbilicum fetus pergentes, ibi emissas, in substantia subcartilaginosa (bb) funis umbilicalis sustentatas, defensas, nec impeditas, a fetu referentes sanguinem circulationi in fetu minus aptum, hinc eo pulsam; venarum autem origo adeo subtilis, ut omnino haud pateat, tamen omnes collectae in unum truncum, qui committitur etiam umbilicali funi; certe [cc] in corpore placentaе rami arteriae, & venae, eidem vaginae membranosae, tenui, inclusae semper, ob evidentes rationes; haec

q Ruyssb Th. x. p. 24. A. & Robault.

Off. An. Fil. 8.

r Robault. Off. An. Fil. 5.

f Ruyssb Th. v. T. 1. F. 1.

t Id. lb. D.

u Id. Th. 10. p. 24.

u Id. lb. A. Mauriceau de la Grosseffe.

p. 1. 9. L. II. Chap. xv.

y Robault. Off. An. Fil. 9. 10.

z Ruyssb. Th. 10. p. 25.

aa Sygel. de form. Fet. T. VII. H. F. F.

bb Id. lb. M. L. L. H.

cc Robault. Off. An. Fil. 14. 15.

haec vena [*dd*] per umbilicum ingressa, sursum tendens, per fissuram mediae parti inferiori hepatis anterioris insculptam ingreditur (*ee*) sinum majorem Venae Portarum, illique infundit omnem vestrum sanguinem, ita tamen, ut ostio hujus venae umbilicalis in sinu Portarum Venae opponatur e regione (*ff*) alius inde exiens tubulus in Cavam recta ducens ibi, ubi diaphragmati annectitur, unde hepatis, vel cavae, atque inde cordi sanguinem facile dare potest, inde distribuendum lege circuli per omnem corporis ambitum.

680. Porro sanguis a toto corpore fetus, & a vena umbilicali, (*gg*) sinum venosum infusus, ad auriculam fere ingressus, una parte descendit in cor, ut in adultis, altera vero parte impingit in [*bb*] claustrum medium hic inter duas auriculas, in quo claustro est (*ii*) foramen apertum, cui incumbit [*KK*] porta membranacea ita, ut mobilis ejus pars respiciat in cavum auriculae sinistrae, unde patet ex auricula dextra in auriculam sinistram agi hanc portionem sanguinis, quamdiu pulmo non operatur; aut saltem in proxima auriculis vicina ex sinu venoso Cavae, in sinum venosum Pulmonalis Venae.

681. Portio illa, quae cor dextrum ingressa, vi ejus agitur omnis in truncum arteriae pulmonalis, quae in pulmone collapsa tum, & gravi, magnam patitur resistantiam, hinc arteriae truncum liberum a pulmone valde dilatat, ut hinc saepe tunc aorta haec major sit; dein pauca parte transit per pulmones, lenteque transiens vasa arteriosa a concretionem impedit, pro ratione incrementi fetus auget, & extendit; dein ex pulmonibus in venam pulmonalem redit, sanguini foramine Ovali admissio miscetur, ut docet clare situs, cohaesio, vinculum, iter, valvulae illi foramini adnatae, introitum ex cava in pulmonalem venam admittentis, non contra, nec ejus ingressui obstat paucus, tenuissimeque motus hic sanguis; unde uter-
que

dd Spiegel, de form. Fet. T. vii. H. E. & T. viii. C. E.

ee Glisson, de Hep. G. 33. F. 1. & 2. H. H.

ff Id. lb. q. K.

gg Lovv. de Cord. T. 1. F. 1. & 2. e. g. d.

bb Id. lb. e.

ii Lovv. de Cord. T. 1. F. 2. & 2. c. c. c.

KK Id. lb. F. 3. 2. a. b.

que in auriculam laevam, inde in cor sinistrum pellitur; maxima autem pars sanguinis cordis dextri in latere canalis arteriosi pulmonici invenit (H) canalem apertum, ubique aequale, ex arteria pulmonali paulum oblique in arteriam aortam ingressum, per quem ergo transit ex arteria pulmonali in arteriam aortam omnis ille sanguis ex corde dextro pulsus, qui facilius superat sanguinis in Aorta resistantiam, quam illam, quam parit collapsus pulmo. Cor autem sinistrum suum sanguinem pellens, eum miscet ipsi illi sanguini mox descripto: ergo sanguis fetus caret omni effectu pulmonis in sanguinem; tamen eo eget quam maxime: ideo ergo subtilissima portio sanguinis arteriosi materni in uteri vasculis separati, in placenta elaborati, retardati, venulis immixti, diastole arteriarum umbilicalium in placenta, & in chorda umbilicali propulsi, per venam denique umbilicalem assidue miscetur sanguini venoso fetus mox fluxuro per vasa minima arteriosa corporis: crassior autem sanguinis in fetu pars arteriis umbilicalibus necessitate mechanica opposito cursu matri respiranti iterum subigenda datur: dum interim obstacula in placenta trajectu propiciunt vitae ipsius fetus, pro ratione molis in toto, & amplitudinis vasorum.

682. Interea tamen in vasculis uterinis aliis praeparatur lymphatica nutrititia materies, redditurque adeo subtilis, quae ex meatibus uteri in poros chorii agatur; in vasis ejus exactius mutetur; in amnii canaliculos abeat; ibi ulterius perficitur; in cavum amnii instillet; ibi a fetu ore hauriatur; deglutitur; stomacho haereat, digeratur, bile, succo pancreatis, saliva, humore intestinali, subigatur, transeat in chylum vasis chylofis hauriendum, & in faeces lentas motu intestinorum ad sphincterem Recti usque pellendas, in toto recto, colo, & caeco aggregandas, compingendas, nec eliminandas, quia vis sphincteris superari nequit, dum nulla respirandi adest actio: unde fetu jam perfecto totus hic tractus repletus est plerumque.

683. Quam vero salivam, mucum, deglutitionem, bilem & humores alios affluxione, etiam intestinis recipiat; omniaque talia faeces semper aliquas ponant, hae additae materiae priori [682.] concurrunt & ad ejus constitutionem semper.

684. Imo & [mm] Renes, hoc tempore magni, majoresque, pro ratione corporis, quam adultorum, & ex minoribus aggregati, assiduo stillicidio, vesicam urinariam irrigant, replent, copia quidem parva, sed assidua, blanda, non acris, urinae; hujus vero emissionem per urethram impedit absolute obstaculum sphincteris non superandum, nisi vi inspirationis; sed ubi abundat, intrat in (nn) canalem membranosum, ex fundo vesicae semper egredientem, sursum ascendentem, umbilico exeuntem, cum fune umbilicali deducente exporretum usque ad radicem placentae, ubi definit in (oo) vesicam singularem propria, ab amnio, & chorio distinctissima, membrana constantem subtiliori, quam reliquae duae, figura ovalem, sitam inter placentam amnio, & chorio obductam, & intra chorion supra eam reflexam, eique adnatam; haec enim lotii apotheca, cujus humor eo copiosior, coloratior, urinae propior, quo fetus magis excrecens nativitati propior.

685. Ubi itaque faex intestinalis, & lotium, aucta; nec expelli potentia; mole, pondere, acrimonia, gravia facta fetui; jam capitis vertice posito in locum, ubi est os internum uteri, & facie interim ossi coccygis materno obversa; incipiunt intestina, & vesica urinaria, impleta, stimulare fibras, excitare sensum molestiae, motum, nixumque, musculis abdominalibus, & toti fetui, producere; unde augetur molestia prior, sanguinique fetus velocior circuitus: hinc assiduo incipit omni conatu quaquaversum niti [pp], versus inferiora descendere, matri tenesum creare; inde & incipiunt hujus musculi abdominales violentissime convelli, deorsum pellere fetum
in

mm Eustach. de Ren. p. 27. 95. 106. Russch. Obs. 80.
en Spiegel. de form. Fetus T. VII. C. G.
H. M.

oo Hale in A& Phil. Anglican. pag. 815.
1700. 1701. Russch. Th. 10. P.
61. 62. licet aliter sentiat.
pp Vesal. VII. 29. pag. 569. 572.

in pelvim, augere sic proprium tenesim; unde summis matris, infantilque, nixibus dilatatur os uteri internum, lubricissimo linimento tum inunctum, & laxum, propellitur aqua allantoidis, & amnii, rumpuntur membranae, exeunt aquae, caput agitur in capacitatem oris uterini dilatati, tumque nixu aucto materno per lubricata vaginae, ope lacunarum mucilaginosarum, & sebacearum in alis latentium [qq], loca exit; subsequenter sine umbilicali, membranis, placenta, [rr] contractione orbicularis musculosae uteri machinae detrusa, titulo Secundinae; exit plerumque sanguis.

686. Tunc autem, omnibus his dimissis, fibrae uteri validae, maxime in loco placenta contiguo, peritonaei, musculorum abdominalium, vasorum, quae ultimo graviditatis tempore erant quam distentissimae, contrahere se incipiunt, suaeque vasa contrahere; maxime uterus, ([ff]) sensum & lente se contrahens, expellit sanguinem huc aggregatum, primo purum, & multum, deinde dilutum, & parciolem, tandem viscidum, pallidum, paucum, Lochiorum nomine; quae varia quoad copiam, durationem evacuationis, colorem, odorem, tenacitatem, prout diversa est puerperae, nutricis, ablactantis, aetate, temperies.

687. Postquam contractis his partibus (686.), vasa magis aëolata plus resistunt sanguini huc deponendo, tertio fere a partu die incipiunt hypogastricae, mammariis communicantes, his dilatatis infundere plus sanguinis, ad uterum ferri soliti, adeoque aquosi chylosi; unde plus implentur, distendunturque, vasa mammarum eadem materie; hinc immutatione morus humorum febricula, in mammis tumor, dolor, durities, lac.

688. (rr) Mammae enim in loco libero, sola pinguitudine, & facile dilatabili cute, testae, recipientes arterias externas ab axillaribus, internas a subclaviis deorsum dimissas in thoracem per intercostalia, & sterni, loca egressas, mammis commissas,

Tom. IV.

H

epiga-

qq Morgagn. Adv. 1. T. 1. c. c.

rr Ruysch. de Musculo Uteri. Fig. B. E.

ff Ruysch. Observ. Fig. 19.

rr Nuck Adenograph. a pag. 10. ad 17.

epigastricis communicantes, inde in miras contortionum spiras, nodulosque abeunt, tandem lactiferos tubos recta emittunt exiguos, qui uniti majores, tandem vasa lactifera majora, latiora, in angustum definentia, atque arctatissima fistula in papilla exeunt, ita tamen, ut ex arteriis per lactifera in papillam, ab hac per galactophora in arterias sit itus, & reditus; habent vero hae papillae nervae, spongiosae, emissaria plura, numero variantia, ante exitum anastomosibus communicantia; habent areolam lacunis sebaceis ornatam, aliquando lactiferis [uu]; habent papillas nervosas plurimas (xx); unde suctione applicataeductio, & assidua refectio, lactis, eo quidem magis, certis iisdem, quo plus suguntur ubera.

68y. Quod lac in serum, caseum, cremorem, butyrum, facile abit; cujus pars caseosa mirifice durefcit; ad ignem non concrefcit instar feri sanguinei, sed exhalat relicto crassamento; plerumque acefcit sponte, dulce, album, inodorum fere; est ex chylo, & humoribus blandis maternis oleosis, circulatione mistis, materies.

69o. Atque hinc patet, cur:

Mammarum dolor, durities, tensio, papillae elevatio, feri stillicidium vesperi, tempore graviditatis accidant?

Et quare haec augeantur in primis tribus a partu diebus?

Tum undenam fiat, ut, repulso lacte, largiora lochia, & contra?

Item cur color, odor, sapor, vires assumptorum notabiles in ipsa lactis materie?

Aut quamobrem lac sponte vix effluat; facta tamen prima suctione cum saltu saepe profiliat?

Unde viris [yy], virginibusque, aliquando, fetui utriusque sexus semper, lac in uberibus fuerit?

Vt & cur ex omnibus humoribus animalium solum lac naturaliter acefcit ut plurimum?

Sic quare hoc tam facile deponat cremorem, & caseum?

Item

in Morgagn. Adv. 1. pag. 9. T. 4. F. 2.
 in Rayf. lib. 4. Th. 10. p. 18. T. 1. F. 2.

yy Vesal. v. 18. pag. 475.

Item cur vario tempore a cibo, potuque, assumtis adeo sit varium, ut omnino differat? Hinc statim a cibo assumpto post jejunium vim bonam, malamve assumti contineat, communicet? Quatuor, aut quinque horis a pastu sit optimum? At viginti quatuor horis jejunanti nutrici, salsum, ingratum, flavesceus, brevi fetens, infanti abominabile?

Quin & hinc etiam habetur fundamentum praescribendo victui inf. bonum infantis.

691. Interim fetus in ipso partus opere assiduis conatibus nitens (22), simul ac aeri exponitur, aperit glottidem, thoracem dilatat, aerem admittit, pulmones in omnem mensuram explicat, vasa horum auget, resistantiam horum contra sanguinem arteriae pulmonalis minuit: unde hic impetu in vasa libera irruit, canalem arteriosum praeterlabitur, copiosus, veloxque, in venam pulmonalem ruit, valvam foraminis ovalis premit, foramen claudit, tota copia ventriculorum cordis sinistrum ingreditur, tota copia expellitur, Aortae latera plus premit, canalem arteriosum complicat, claudit; hinc sanguis auriculae dextrae, sinusque venosi, omnis ventriculo dextro impellitur, inde in pulmones agitur, fit respiratio, ut in adultis, concrevit membrana foraminis ovalis ad margines ejus, mutatur canalis arteriosus in ligamentum.

692. Sed & ligato fune umbilicali prope cutim nihil fluit per venam ejus in hepar; abit vena in ligamentum; tum sanguis venae cavae celerius jam morus comprimit obliquum canalem venosum, ut concrevat in ligamentum; simul & arteriae umbilicales clausae brevi consolidantur.

693. Quin respiratione jam facta, faex alvi nigra, tenax, splendens, opio similis, Meconium dicta, expurgatur; ut & vesica urinaria eadem opera, & contracto uracho, per urethram evacuatur, ut in adultis.

694. Ex quibus omnibus solvuntur omnia haec Problemata. [aaa]

1. Quid pater, quid mater, generandae proli facit?

H 2

2. Quae-

2. Quænam causa sterilitatis in mare, in femina; in utrisque?

3. An ex solo femine masculino, ulla arte, verus homo produci queat?

4. An ulla femina, ex ulla causa naturali, absque ulla viri consuetudine, foecundata fuerit?

5. An cruor menstruus malignus, venenatusque sit? An impurus, & recrementosus habendus?

6. An mulier verum genitale semen faciat, & suscitandæ proli conferat?

7. An seminis utriusque miscela, ebullitio, fermentatio; aut alia actio, faciat corpus hominis?

8. An bona fide locus certus conceptui proprius assignari queat?

9. An femina, præter fœtum, nutrimentumque, formam det fœtui? An id docet vis imaginantis gravidæ?

10. Quid fecundatio sit?

11. Unde tres membranæ fœtus originem ducant, quoad materiem, & quoad causam?

12. Unde placenta? funis umbilicalis? quomodo embryo, & fœtus, illi nectantur?

13. An alatur fœtus per os, an per umbilicum, an per utrumque, & qua diversitate pro vario a conceptu tempore?

14. (bbb) An fœtus omnia viscera, vasa, artus, simul habeat? an vero plane mutet formam primo pisciculus, dein amphibio, postea respiranti, proximam? an vero in utero respicit, & aere utitur?

15. An in utero deponat alvum, & cur non? An meconium in uteri vagina deprehensum, aut inde demissum, testatur mortem fœtus, aut aliud quid?

16. An superfœtatio fieri potest, & cur rarissime, si unquam?

17. Gemini, tergemini, quadrigemini, cur uni placentæ, ut incau-

incauto videtur, adhaerent, chordas umbilicales tamen, & membranas semper singulis proprias possident? An quia ovula totidem unico calyci adnata? An quidem id semper, ubique, verum apprehenditur? Gemelli saepe concreti.

18. Vndenam gravidis nauseae, vomituritiones, vomitus, animi deliquia, horrores, pica, mammarum durities, dolor, tumor, macies, menstrua retenta, anhelitus, tussis, varices pedum, crurum, femorum, abdominis, facilisque lapsus?

19. Quomodo fit, ut fetus [ccc], vivae nexus matri, intra amnion undique reclusus, placide quiescat? Simul commercium hoc liberum sublarum vulnere, separatione a matre, vel ejus morte, ingenti, perpetuo molimine conetur inspirare?

20. Vndenam [ddd], mortua matre, fetus ultra semihoram in utero defunctae vivat?

ccc Vesal. vii. 29. pag. 57a.

ddd Robault. pag. 55.



Coni

Conceptum] Antiquissimum vocabulum est, & significat eam actionem, qua id, quod femina ad generationem confert, jungitur cum eo, quod mas ad idem opus tribuit, ea ratione, ut adunatio horum diversissimorum principiorum ad determinatum finem contingat. Nempe principium, quod vir tribuit, recipitur ab utero, ut homo fiat.

§. DCLXVIII.

Uteri] Cujus fabrica in humana femina, a brutorum structura plurimum [a] differt. Tria autem foramina habet: uno semen masculinum recipit, duobus ad tubas (b) patet.

Exire]

(a) In quadrupedibus viviparis enim vagina finditur in duo longa, undulata cornua, quorum finis in tubas adnascitur *Graaf. T. XIV. XX. XXV. Duverney Mem. de l'acad. 1701. f. 1. a. totus etiam tenuior, magisque carneus est, confer Vesalium p. 665. In cornubus istis fetus in totidem cellulis distinctis sedent Fabricius de form. fet. f. 53. in cane) &c T. 28. f. 48. in scropha *Sharaglis sepf. p. 330. tum Mauriceau p. 35. f. 4. &c Graaf. c. 6. &c in his cornubus plerumque fetus, vel totus sedet, vel parte maxima Hartman de perit. vet. anat. p. 28. In mulieribus autem uterus & unicuique, &c sursum latefcit, &c ex angulis tubas edit abique cornubus, &c pulposus totus est, atque spongiosus, multoque crassior, &c fetus in utero naturaliter habitat *Galen. de diff. vulv. ubi vero idem de capra, &c vacca non bene affirmatur, recte enim feminae proprium esse docet Drelincourt de femin. ovis not. c. p. 590. Nisi forte similes fuerit, ut lego E. N. C. Dec. II. ann. I. obs. 61.***

(b) Tubae Falloppianae sunt canales conici *BIDLOO T. 53. f. 4. f. GRAAF. in omnibus iconibus, varie incurvi BIDLOO T. LIII. qui ex maximae diametri fundi uteri terminis EUSTACH. T. XIV. f. 2. 3. 4. GRAAF. T. IX.*

X. STENONIS in *off. Haf. ann. II. obs. 89. munimo ossio procedunt FALLOPIUS p. 197. GRAAF. T. 20. PEYER. ad MURALT. p. 408. feram adnascitur GRAAF. p. 276. KEIL. p. 106. VVINSLOVV. n. 608. LIEUTAUD. p. 161. &c. &c inter duas laminas peritonaei in seipsum redeuntis DCLXIII. HENSING. de perit. n. 48. VVINSLOVV. n. 607. extrorsum versus illa migrant, primo inferiores, deinde exteriores accumbunt ovarii FALL. *inf.* superioribus primum, deinde &c interioribus vide VVINSLOVV &c. Continuo eundo latefcunt *BIDLOO l. c. PLAZZON. L. II. c. 10. ita tamen, ut subinde angustiae aliquae interponantur GRAAF. T. XIX. f. 1. a. 3. donec ovarium aut proximè SANTORIN. p. 227. membranae intermedia FALLOP. p. 196. aut omnino adtingant ACT. BEROL. l. vol. VII. SANTORIN. *Moria d'un feto n. 39. GRAAF. p. 261. &c T. 19. f. 1. VVINSLOVV. n. 610. LIEUTAUD &c aliquando adnascantur, quod equidem credit per morbum fieri Fallop. p. 196. b. In vacca, vidit Duverney junior *Mém. de l'Acad. 1701. f. 2. in leacna vero, &c tigride perpetuum esse Parisiensi auctores sunt Diff. des anim. P. III. p. 12. &c elephanto p. 134. Ibi ampliori, quam ad uterum, oscu-****

Exire] Ut per eos materia quaecunque ex utero versus extrema sim-
briata canalium aequae facile ire possit, ac ab iis ipsis extremis versus
uterum fertur (c), Nullae enim intus adsunt valvulae [d]. Ultimus finis
in

osculo patent Fallop. p. 197. mi-
nus tamen lato, quam pars pro-
xima tubae *Lieutaud* l. c. *VVinslov.* n. 609. *Taury* p. 69. quam
cum varice non male compara-
vit in *institutionibus Fallopius*. Id
osculum undique ambitur sinibris
carposi Fallop. l. c. *Pastols* l. c.
p. 63. varie, & saepe eleganter
lacinatis Fallop. l. c. *Bidloo* l.
c. *Graaf* l. c. f. 2. *Verheyen*. T.
17. f. 6. *Scheibammer exerc.* 12.
quasi erosio *Riolan*. p. 179. valde
vasculosis vide iconem uteri no-
stri, & *Heister*. T. III. f. 11. fi-
brique longitudinalibus instructis
Sbaragli seps. f. 4. unde muscu-
los vocat *Dreincourtius* in *Man-
geti* T. theatr. II. p. 138. *Concept.*
de conceptu Periocho §. 6. tum
Harder opiar. p. 34. Infundibu-
lum tubae habent *Leaena*, felis
zibethina, vacca, & pleraque qua-
drupeda, sed minus pulchre,
quam in muliere, lacinatam.
Utraque forte causa est, quare
Svammordamius in iconibus suis
omiserit lacinias, & GRAAFIUM,
qui pinxerat, carpsit.

- (c) Flatum libenter transmittunt ex
utero in abdomen *Graaf* p. 160.
aut vicissim. Hinc in tubis fre-
quenter sanguis repertus est *Ruyfch.*
ibid. p. 127. aut mensium *Ruyfch.*
ibid. 85. aut lochiorum *ID.* *ibid.*
84. *Staebein. spec.* 2. 1724. n. 4.
aut puerperii *Blancard.* in *collect.*
ad duas libras *Blagny* *Zod.* l. m.
Jan. [ubi adeo apertae fuisse le-
guntur, ut grumos manu exime-

re liceret) & per eam viam in
abdomen sanguis exiit *Santorin.*
ibid. d. m. *seto* p. 16. ad duas in-
puerpera libras *Blagny bistore d.*
un fetus p. 24. Hunc sanguinem
ex utero habuerunt, & manife-
sto *Ruyfchius* vidit, sanguinem
continuo ductu in utero, & tub-
is, & ad ovarium fuisse *Musf. rer.*
p. 127. *Pill* etiam, & steatomata
per uterum a puerpera excreta,
iverunt procul dubio ex ovario
Siles. Satur. VII. n. 5. Spiracula
esse uteri, per quae abdomen halet,
Fallopius ex conjectura proposuit
in *inst.* & repetiit *VVBarton.* p.
230. ut manifestum sit, viam vi-
disse liberam.

- [d] Valvulas anatomici nonnulli pro-
posuerunt, cum stylum mediocrem,
& facile per ostium abdominale
subeuntem, ad unciam citra ute-
rinum ostium, repelli vident,
& aliquando flatum VVEFFER
de cicur. p. 124. tum videntur
forte cellulata brutorum cornua.
Ergo tres cellulas, quatuorve
Riolanus fecit l. c. & *Linden. pbisf.*
p. 182. & *T. Bartholinus* in *Casp.*
p. 122. valvulas vero multas
VVBarton. p. 230. & *G. Bartho-
linus*. Sed mera angustia est, ru-
gae vero internae tubae, non cir-
culariter, verum secundum lon-
gitudinem disponuntur *Graaf. T.*
XIX. f. 2. E. N. C. Dec. III. ann.
9. 10. *ibid.* 102. *Verheyen.* p. 132.
T. 17. f. 6. Buchner. Miscell.
1727. p. 62. *Santorin. ibid.* T. II.
f. 3. *VVinslov.* n. 613. suntque
plicae

in cavitatem abdominis aperitur (e), & dilatatur in fimbrias lacertosas, five membranofas. Nihil tamen ex cavo abdomine in tubas recipi potest: aut vicissim ex utero in tubas venire, praeter vaporem, aut aërem.

Dila-

pliae membranae internae *Blanchi de gener.* p. 73. Neque video valvulas illas duas ad ingressum in uterum *FANTONO* dictas p. 200. quarum similem unam in cuiculo vidit *GRAAFIUS* p. 166 etiam ab *ELSHOLZIO* receptam l. c. & *VENETTE* p. 254. Recte adeo *ILL. HEISTERUS* monet, tubas mulieri minime, ut in brutis cellulas esse comp. p. 106. valvulaeque refutavit *PÉYERUS* ad *MURALT* p. 409. & *Graaf.* p. 261. & *Vestib.* T. 52. & *TAUVRY* p. 64. & qui ne in earum quidem tubis reperit, *MORGAGNI* *Adv.* IV. p. 54.

(e) Caecam tubam plerique fecerunt veltutiorum, *Fallopio* excepto, qui ubique apertam descripsit: Nempe *CASSERIUS* L. VIII. Tab. 10. 21. & *Spigelius* p. 261. & *Placcionius* l. c. 10. & c. *Bartolinus* *instit. anat.* p. 142 & T. *Bartolinus* p. 258. & *Mauriceau* p. 13. & *Higbomorus* p. 100. caecam faciunt, *LEAL* autem non multo melius concidere ait intra aliquot a morte dies, ne stylium admittant p. 63. Caecam etiam tubam vidit *BARTHOLINUS* *hyst.* 92. Cent. I. & *GRAAF.* p. 259. T. 49. f. 3. & in E. N. C. Dec. II. ann. 5. obs. 63. & *DUVERNEY* *Mem. de l'Acad.* 1702, p. 403. fufe, & *MANGET* *Theatr. anat.* l. 108. & *MANNINGHAM* (pro frequente) p. 49. & *CHESELDENIUS* *Phil. trans.* n. 337. & in *anat.* p. 276. & *Cyprianus* p. 22. & *Vestib.* l. c. & *Parisi Acad.* 1704. n. 3. & *Blanchi* p. 75. & *Ruyfch.* *Obs.* cbr.

2. 3. & *Naboth.* *de sterilit.* n. 12. qui addit saepe se visisse. Alteram autem tñam caecam recenset *Ruyfch. Mus. rar.* p. 174. & *Valsalv.* *delle uova delle vivip.* c. 5. n. 21. & *Vogel anthropogem.* p. 227. Inde sterilitatem deducunt aliqui *Ruyfch. obs.* 83. *Cyprianus* expectus, & *Mangetus* l. c. Denique ovarium, tubamque lateris sinistri defuisse vidit *BLASIUS* IV. *obs.* 2. Ego vero perpetuo apertam repeto, etiam in teneris puellis, & in fetu [*Mar. Baltb. Aff.* 1659. p. 20. contra. *MURALT* experimentum p. 426.] etsi aliquando osculum non continuo reperiam, collapsum inter fimbrias, ut olim monuit *FALLOPIUS*, deinde *DRELINCOURTIUS* *advers.* ad dogma 12. & habeo consententem. *MORGAGNUM* *adv.* I. n. 30. errorem priscum refutavit, tubasque cavas esse demonstravit *VVHARTONUS* stylo inferio & I. van *HORNE* *prodr.* p. 18. [cui hoc inventum non bene tribuit *SVVAMMERDAM* p. 54.] & *GRAAF.* p. 259. 260 & *PARRISINI* in tigride, & *SCHRAEDER* *obs.* Dec. I. *obs.* 7. & *MOLINETTUS* p. 323. & *SCHLEHAMMER* *progr. valed.* n. 32. [qui stylium excludere, sed flatum transmittere novit], & in gravidis digitum recipere vidit *BAYLE* *de catam.* p. 23. Causa errandi aut in rariori calu, aut in illa difficultate a lacinis fuit. Coalitum autem ad praegressam aliquam inflammationem non impetire referunt *Cyprianus*, & *Duverneyus*.

Dilatatas) Tubae versus uterum strictissimae, ad partem averfam amplissimae sunt, quae ipsa figura fecit, ut *tubae* vocatae fuerint ab accurato illo descriptore FALLOPIO; qui non invenit quidem tubas [6], iter tamen

- (6) Satis certum est vetustos anatomicos tubas utcumque vidisse, neminem tamen veram historiam dedisse. HEROPHILUS ductum varicosum fere uti ductus feminalis maris, utrinque in uterum insertum descripsit, apud GALENUM *de semine* II. II. c. I. non absque nugnis erroribus admittis, quem non in omnibus mulieribus reperiri ait GALENUS *de diff. uteri*. Dilectius RUFUS in ove „vascula e testibus enata varicis ad modum revoluta in cavum uteri perforata vidit, quae pressa mucum funderebant L. I. p. 40. ed. CLINCH. Hi etiam cirrhi sunt uteri apud RUFUM, cornua DIOGLIS, GALENI *de util. part.* L. XIV. c. X. quae dixit *de vulv. diff.* c. 3. paulatim arcuata angusto sine testis adhaerere IB. Er apud EUNDEM *de vulv. diff.* c. 3. & ORIBASTIUM p. 123. processus laterales vulvae versus illa hemicyclis comparavit HEROPHILUS. Sed etiam GALENI meatus feminales a testibus in cornua novi, ignoti HEROPHILO & EUDEMIO *de vulv. diff.* c. 9. ad testem latiores, in medio angusti, pene solidi, laxiores ad uterum, semen effundentes *de semine* II. & transmittentes specilla ib. c. 1. analogi parastatarum varicosorum *de utilitate partium* L. IX. c. II. breves tamen & angusti c. 10. huc videntur pertinere. Eadem adeo sunt ductus a testibus in cornua a THEOPHILO repetiti p. 295. & FERNELIO *destr. part. corp. hum.* C. VII. & recentioribus ut VESLINGIO *Syntagm.* p. 71. aliisque. GALENUS enim tubas potius, quam ligamenta ova-

ria vidit in suis bestiis, cae enim tubas habent, ligamenti illis deservuntur TAUVRY *de la gener.* Nihil aliud etiam VESALIUS dixit p. 659. aut pinxit f. 25. V. f. 26. K. rum, quando dixit cornubus uteri interi *de ebina* p. 122. In examine vero *obs.* FALLOPII p. 135. 146. videtur quidem tubas describere totus tamen obscurus est. Sed & PAREUS p. 105. f. G. tubas pingit. COLUMBUS aeternam vasa feminalia tortuosa feminis pro uteri cornubus esse testis et p. 242. FALLOPIUS denique in *inst. anat.* p. 10. & *obs.* p. 197. meliorem descriptionem dedit cum *meatus feminarii* nomine, sinubriaque, & ampliorem finem addidit, EUSTACHIUS in tab. XIII. & XIV. f. 1. 2. 3. 4. satis demonstravit sibi notas fuisse. Ab eo tempore vulgo receptae sunt nomine *deferentis ductus* a C. BAUHINO c. 56. PINNAEO p. 38. CASSERIO L. VIII. T. XX. XI. aliisque.

Verum alias etiam vias veteres ab ovaris ad uterum proposuerunt, marginem nempe ligamenti lae teretem, turgidum, retro tubarum initium positum, qui fibris quibusdam semitenoinels praeditus, utcumque ovarium contra uterum firmat Graaf T. IX. f. 1. *Veitbrecht syndesm.* p. 231. *Lientaut.* p. 362. E. N. C. *Cent.* VII. *obs.* 98. bon. 10. *Morg. Adv.* I. T. III. o o. *Saraghi* in icon, Eum non pauci pro vase semen in uterum effundente habuerunt. Hunc videtur Galenus subinde velle, nam obscura res est. Clarius *Massa* & *Riotanus* p. 178. & *Spigelius* v. 262. & *Veslingius* p. 71. & *Casserius* f. c.

tamen ad uterum & cavitatem primus detexit. Ex hac diversa amplitudine sequitur, iter potius ex tuba in uterum esse, quam ex utero in tubas.

Flexas) [7] Ratio est, 1. ut cum compendio longitudinis quam maxima tamen itineris esset diuturnitas: 2. ut remoram obponerent corpusculis, quae vel ab utero per eas tubas versus fimbrias moverentur, vel a fimbriis versus uterum migrarent.

Glan-

l. c. & C. Bartholinus p. 143. & *VVhartonus*, qui caecum videri fatetur p. 127. omnesque qui ad eam actatem vixerunt; qui tamen varie cum eo ligamento tubae descriptionem confuderunt, ductum autem dixerunt *ejaculantem*. Eum adhuc habet *Elsholz* l. c. & *Mauriceau* p. 90. lit. G. cavumque se reperisse confirmat *Meryus* apud *Fantoum* p. 104. tum *Fantonus*, ut etiam valvulam in cavitate videret p. 108. Caecum autem esse, & verum ligamentum *Plazzonus* monuit p. m. 138. & D. de *Marchettis* p. 44. neque multum e conturbavit *Harvejus exerc.* 64. Deinde ita refutavit *Graafius* p. 256. & *Taury de la gener.* p. 28. seqq. ut nostris temporibus obsoleverit.

Deinde *A. Laurentius* alium meatum voluit saepe invenisse, qui in principium cervicis ducebat L. VII. c. 9. quale quid etiam *Fernelius* habet *part. corp. hum. desc.* c. VII. & repetit ex *A. Laurentio Vigier Encir.* p. 58. & *Riolanus* p. 178. 201. 366. fibrillas nempe duas in cervice uteri, & poros, ejaculantium vasorum oscula, & *Elsholz* l. c. Recte vero negat reperiri *Spigelius* p. 180. & omnino *A. Laurentius* vel idem, quod *Fernelius*, ligamentum vidit, vel arteriam aliquam ex uterinis. Ita *Dresincourt. parer. de tubis* n. 8. De *Galenco* illo ductu longiori dictum est ad DCLXIV. a quo tamen *Laurentianus* differt, quem eo referebat, *Taury* p. 22. Tripartitum vas ejaculatorium *Riolanus*, lubens

omitto, quod ad tubam, fundum, & orificium uteri dixerat se in gravida vidisse *Indi* p. 366.

- (7) Flexas tubas esse dudum *Galenus* pluribus locis, & ante eum *Herophilus* l. c. deinde *Vesalius* l. 25. V. f. 26. K. cumque capreolis comparavit *Fallopium* p. 197. porro *Graafius* p. 259. (cujus tamen icones nimis rectae sunt) & *Bidloo* T. 52. &c. Directo vero in universum varia est. Olim ambire testes dixerat *Plazzonus* L. II. c. 10. *Graafius* sere transversas & sine deorsum verso. Ita pene *Chefelden* T. XXXII. Sed alibi *Graafius* magis compressas, descendentes, deinde ad ovarium inorsum conversas facit. Transversas etiam *VVinslovens* IV. n. 607. *Sharagff* vero ascendentes pingit, sine versus uterum converso II. f. 1. 2. p. 401. 449. Super testes scandere, deinde retro eos descendere, sineque suo sursum vel deorsum patere *Morgagnus Adv.* I. n. 30. T. III. idque frequentius esse confirmat *Adv.* V. p. 74. aliquando tamen conscendere ovaria, non superare, alias ne conscendere quidem IDEM. *Verleyerius* situm mutabilem esse (ut in gravidis deorsum respiciant p. 312.) & eadem *VVinslovi* sententia est. Ego in gravida femina, cujus historiam dedi p. 2. *Morgagni* descriptionem confirmavi, cacterum incertam invenio, quoniam facillime dum removerentur intestina, dimoveatur, & alioquin modo in pelvi, modo super vasa iliaca reperiantur. Etiam

nunc

Glandulosa) Fabrica tubarum crassa [8] est, scabra intus & villosa, similis glandulosa. Cryptae (9) sunt mucilaginosae, quae ex latiori fundo per angustius emissarium viscosum liquidum effundunt.

Hae

nunc bis video „super ovationem ascendere, deinde oculum versus rectum intestinum convertere.

- (8) Tubarum membrana exterior a Peritonaeo continuatur, tota levis GRAAF, p. 262. Interior ab utero est LIEUTAUD p. 161. pulsatior, crassior, rubentior *VVinslov.* n. 213, a qua imprimis laciniae illae producuntur, rugosa tota.

Inter utramque infinita vis vasculorum est in rete mirabile impleitorum: conf. HEISTERI T. III l. f. 11. & *Iconem nostram*. Sed & musculares fibras inter duas tunicas descripserunt varii, SVVAMMERDAM. *prodr.* p. 23. VVERFER de cic. p. 124. DUVERNEY *mem. de l'Acad.* 1702. p. 404. orbiculares extiores SANTORINUS p. 228. longitudinales (in vacca) SBARAGLI *seps.* p. 453. DUVERNEY l. c. interiores, in lacinias productas SANTORINUS ibi. T. II. f. 3. Utraque etiam VVINSLOVVUS habet n. 611. & TAUVRY p. 64. illas autem spirales vocat. Anulum veto cis fibras, qui tubas constringat DRELINCOURTIO dictum *concept. de conc. Per.* 6. & SCHELHAMMERO *exere.* 12. *de gener.* & BIANCHO *de gener.* p. 73. nullum habemus vidi. Recentiores addunt spongiosum corpus, VVINSLOVV n. 613. quale in deferente vase est DCXLV. utrique membranae interponi, cujus ope tuba possit erigi a sanguine effuso DRELINCOURT l. c. *Per.* 7. FANTON, p. 219. HARTSOEKER *Cons. Physf.* p. 110. DRAKE L. I. c. 21. COMMENTATOR HEISTERI, PALFYN II. p. 231.

Mihi de eo corpore vere cavendone nondum satis constat. An vasa illa numerosissima viderunt? Tubum autem nervum illum, quem in tuba reperiebat ad uterum latiore RIOLANUS p. 178. 179. & in priori medietate admettebat VESLINGIUS p. 73. ego quidem non intelligo.

- (9) In tubis mucus reperiri solet VVERFER de cic. p. 124. qualis in utero, non dissimilis humani leuinae RUYSCH. *obsf.* 45. in vetula, VOGLI l. c. II. p. 46. in virgine, in puertpera vero SANTORIN. c. XI. n. 18. & in universum in junioribus LINDEN *physiol.* p. 282. aut lactis aliquando coacti similis BLANCARD *anat. pract. obsf.* LV. Cum testium succo comparabat Bartholinus *anat.* p. 259. & *bist.* 92. Cent. 1. Ego vero mucosum vidi, sed turpem, ut E. N. C. *Dec. II. ann. IX. obsf.* 224. a femine masculo valde diversum. Lympham VVINSLOVVUS vocat p. 613. & lapidam, coagulabilem *Littre mem. de l'Acad.* 1704. *bist.* p. 27. Hunc potest uterus suppeditare. Sed etiam in tuba muci fontes invenerunt, glandulas nempe Cypriano dicta: in *epist.* p. 21. *Duverney* l. c. *Tauvry* p. 64. *Santorinus obsf.* c. XI. n. 18. *illor. d'un feto n.* 26. & *Parisius bist. de l'Acad.* 1704. *obsf.* 3. timidius autem VVINSLOVVUS l. c. Exhalare vero & in vaporem cogi, saltem partem ejus, constat ex Heisteri experimento, quo mercurius in aetrias impulsus in tubarum caveam exit not. 34. ut omnino non necesse sit, ad tubas lubricandas liquorem ovarum adhibere, quod fecit *Paitronus della*

Hae tubae ponuntur in ligamentis latis. Ea ab ARETAE O CAPPADOCIE (10) cum alis vespertilionis comparata fuerunt: ab aliqua similitudine, quae his alis est cum ligamentis, ubi ab utero versus ovaria expanduntur. Hoc nomen retinuerunt apud recentiores. Ipsae tamen tubae mobiles sunt, & libere [11] in fluctuante membrana disponuntur, nihilque impedit, quominus sursum, deorsum, antrorsum, vel retrorsum, dextrorsum, sinistrorsum moveri, & versus uterum accedere, aut ab eodem facillime recedere possint.

Animalium) Incomparabilis HARVEJUS (11*) & ingenio summo poluit, & rara felicitate beatus est, ut ex liberalitate CAROLI I. omnes necessariae ad totum opus impensae ei subpeditatae fuerint: iste eximius vir, reliquit nobis historiam generationis animalium, quae ARISTOTELIS (12) simile opus tantum certe superat, quantum aurum terra pretiosius est; cum tot talenta [13] in praeceptorem suum ALEXANDER effuderit. Omnes seminae animalium quadrupedum, gradientium & respirantium. (nam aves unicam tubam habent [14]) duabus tubis uterum instructum nascitae

della gener. II. p. 46. & Cyprianus. Flavum esse in vetulis vaccis, & ferneolii forte genus vult Sbaragli p. 451. In raris similis in oviductu viscor est du Hamel bist. Acad. p. 275. & in Raja oviductus papillis muciparis repletur Stenonis myol. spec. p. 147. Collins p. 656. (etiam de aliis piscibus). Aliquando interescit in enormem hydropem. Centum & quadraginta aquae libras in tuba reperit Harderus apian. n. 88. Aliud exemplum est in Zod. Gall. I. p. 202. & 150. librarum Cyprianus I. c. f. 3.

- (10) Vide DCLXIII.
(11) Nisi aliquando praeter naturam utero adnascuntur, qualia exempla VOGLI habet anthrop. p. 227. & BIANCHI p. 75. 76. aut iniquino recto &c. Sed nulla in corpore, particula est, quae non aliquando ad viciniam accreverit.
(11*) De gener. anim. p. 228. Duodecim nempe damarum copiam HARVEJO fecit, quas subinde a conceptu secuit.

(12) Neque ipse tamen rudis aut indiligens, nisi omnino multa ex aliorum fide recenseat, neque perinde in secando aut in assiduitate observandi versatus fuerit.

(13) ATHENAEUS in *Dipsosopbist.* L. IX. licet non multum huic famae tribuat eruditissimus SCHULZIUS bist. med. p. 358. Sufficit tamen, quod PLINIUS confirmat L. VIII. c. 26. & ipsa res legentem facile docet, venatores nempe & piscatores, & aucupes, iussu regio, quidquid haberet observationum, in adversaria ARISTOTELIS contulisse.

(14) Rarissime duas, & praeter naturam, quale exemplum in gallina MORGAGNIUS vidit *Epsb.* XX. & aliud N. STENONIS A. H. II. p. 226. n. 31. Nam avibus unica tuba, uti unicum ovarium est, TAUVRY p. 66. ium quadrupedibus oviparis, fibris in gallina spiritalibus cinctus PEYER. *mercol.* p. 164. In insectis oviductus duo sunt, deinde in unum conflunt MALPIGHIUS de hombyce T. XII. p. 35.

naetiae (15) sunt, & in vaccis totus uterus manifeste in duo cornua finditur, in muliere vero cornua multo angustiora sunt, & minora, & dicuntur tubae (16). Hae in homine tubae, quae in animalibus cornua sunt, in iis animalibus, quibus statum est coeundi tempus, eo solo tempore mutantur, quo haec animalia in libidinem ex naturae lege ruunt. Soli (17) nempe homini nullum tempus definitum est, quo generet, reliquis animalibus pene omnibus suum tempus statutum fuit, quo, neque alio, mares & feminae paciter lasciviant, appetantque venerem, reliquo anno se mutuo repudiatura. Ergo HARVEYUS, indagaturus, quid in femina mutaretur eo tempore, quo ad generationem idonea redditur, facile vidit aptissimum consilium fore, si in femellis certo tempore venerem appetentibus, in hanc mutationem inquireret. Equas adeo, vacas, cervas, damas secuit, tum eo tempore, quo marem refutant, tum eo, quo appetunt & admittunt. Experiundo didicit, nullam uteri marem palli, uterive virginei diversitatem esse, nisi quae in tubis (18) est, & in ovariis (19). Tubae nempe incisae in femellis veneri non obno-

- (15) Uti duo iidem ovaria sunt, ita duae in omnibus tubae. TAUVRY l. c. Rationem diversitatis addit idem, quod in quadrupedibus motus per tubam a pede alterne in gressu prompto juvatur, avibus autem non alia, nisi a vesicularum aerearum motu vis sit p. 68.
- (16) Quadrupeda & cornua habent, & tubas, inulter solas tubas, male cornuum nomine etiam passim recentioribus receptas, ut VENETAE.
- (17) Tum animalibus, quae homini familiaria sunt, cani, equo, feli, porco, iuro. Equos in Alti toto anno equae athenae adhinnivisse PAUSANIAS *Ellae*. l. p. 314. Certa tempora in primis cervi observant.
- (18) Est utique. Vide DCLXXIII. De tubis pareus est. Sed aliorum exstant experimenta. In femina impregnata tuba inflammata, quae ovulum comprehenderat cum semine viri EDIMB. SOC. ESS. V. p. 336. In alia post venerem occisa, tuba rubicundior, crassa, distenta, verius ovarium lucente. RUYSCH. apud DIEMERBROE-

- CKIUM & apud ERNDL. *It. angl.* Bat. p. 90. In cane ad venerem, turgente tuba vasis plenissima VALISN. *della nova delle femine vivipare* c. IV. n. 5. 7. 19. idque ante receptionem ovi sibi semper adparere, ut simul major sit ID. n. 17. In cuniculo pariter tuba rubicundior GRAAF p. 305. Liquidi aliquot uncias in tuba ovario adherente vidit BUSSIERE *Phil. transf. abridgd* III. p. 212. & adeo dilatari in gravidis, ut digitum capiat BAYLE *de catamen.* f. 23. Cornua cuniculorum magis rubra GRAAF p. 305. & exientia reperiri post conceptionem, plenaque succo viscido COSMOPOLITA p. 45. 46. live EVERARDUS. Turgidam post conceptum tubam NENTERUS vidit *physiol.* p. 320.
- (19) Ovarium ante venerem macrum est (in cane) VALISN. c. IV. n. 24. Idem a conceptu plenum liquido viscido EDIMBURG. V. p. 337. Ovarium a coitu rubrum VERHEYEN. *Ill.* p. 314. Post coitum continuo vesicularum tunicae pluribus vasis conspicuae SBARAGLI *scrp.* l. p. 300. & opacae GRAAF p. 267.

obnoxii, internam cavitatem levem habent & lubricam; mucro intus inunctam. Sed in venera libidine interior superficies tubarum quasi inflammata adparet, maculisque rubris variegatur. Deinde in semellis, quae venerem non appetunt, tubae suo pondere labuntur ad inferiora, & simbriarum laciniae pendent, uti in castrata femina semper flaccidae reperiuntur. Sed veneris tempore, etiam in gallinis, statim a coitu tubae rigent, & laciniae expanduntur, & non raro, continuo (20) a coitu, reperiuntur ita expansae, ut ovarium amplectantur contiguae (20th).

Fetus

p. 267. Ovum aliquod reliquis majus perpetuo RUYSCH. *Tbes.* VI. n. 5. (sed de corpore luteo dicit) Congressus tempore nascitur in ovario damarum fibrosum tuberculum, quo ovum ab ovario liberant Peyer *mercur.* p. 40. & in scropha globuli undique ex ovario eminent ID. ib. quod globuli simile; glandulosum describit, GRAAF l. c. & foramen denique adparet, per quod ovum transit p. 228. Sed vide de eminente corpore luteo DCLXIX. Adeoque mutator omnino ovarium ad conceptu tempora, quod non bene negaverat HARVEJUS, (VALISNERIO monente c. X. n. 4.) & ea ipsa mutatio partes demonstrat magnas esse ovarii in generationis officio IDEM c. 9. n. 3. In flore uterino ovantur pugno aequali BLANCAARD *anat. Praef.* II. obs. 99. ovaque piso aequalia BONNET. *Med. Sept.* I. p. 216. SCHURIG. *de mulieb.* p. 336. Idemque vidit BRENDelius, & magna inde symptomata hysterica SANTORINUS p. 224., ruptaque ovarii membranam, quam diduxerat corpus intum turgidum IDEM *istoria d' un feto* n. 29. Ovaria plenissima hydatidibus in femina manica COMM. NOR. 1748. *bebd.* 12. & ovarium ovi gallinacci mole BUDAeus *misc. obs.* 6. In hysterica vesiculae tomidae DRELINCOURT. *de femm. ovis* p. 519. In virgine a retento semine crasso ovarium pugni mole VENETTE

p. 208. & in puella non casta semine turgidum p. 222. Testes in animalibus catulicentibus magni, & semine pleni HARVEJUS p. 272.

- (10) Sed dissentiunt alii, neque continuo a coitu, & post aliquot dierum dies adhaesionem tubarum, observant C. BARTHOLINUS &c. In caetera primo & altero die distantes, tertio quartoque admotas ovario tubas vidit, ovumque recipientes Schurig. *sylleps.* p. 75. & Langius ib. p. 61. & sexto die aut quinto in juvenca demum tubas ovarium amplexi a Desfuisse *de formatione fetus*, vixit vero septem horis a coitu in cuniculis GRAAF p. 306. & foramen in ovarii tunica tertio die ovum transmittere, serius in majoribus animalibus p. 267. eoque tempore egere videtur, ut ex ea lege recedere & per ovarii membranam penetrare queat, si *Taurorum* fides p. 83.

- (20^a) Post venerem vetus ovarium conversam vidit Ruysch. apud *Diemerbroeckium*, & Elsholtzium E. N. C. Dec. I. ann. 6. 7. obs. 196. & Mengeti *Bibl. anat.* p. 550. ovario veto fibrosis appendicibus adhaerentem; osculo suo adglutinatam quasi ovum abortivam (extra conceptum tamen) Valisnerius c. 5. n. 23. Deinde tubam ovarium amplexam post coitum saepe vidit Graafius p. 269. *Acad. des Sciences.* 1704. *bibl.* 21. & Bussiers *Phil. Transf.* n. 207. *astridg.* III. p. 218. &c.

Fetus) In feminis humanis non raro reperi sunt fetus matri suae funecti, qui in tubis (21) nutriti fuerant: in tota nempe longitudine antea duae tubae: modo in angusto orificio tubae, proxime juxta uterum,

8c *Valisnerius* c. 21. n. 11. in *vaeca Duverney junior Mem. de l'Acad.* 1701. p. 243. atque in *sue Buffiere Phil. Trans. abridg.* Ill. p. 212. & n. 207. in *afina N. Stenonis Atl. Hafs.* Il. p. 229. in *cane Schurig. sylleps.* p. 75. & *Goetliche* apud *cumdem* p. 50. in *juvenca Desvoig. de formatione fetus:* & in *ave demouille de numidio Parisini*, in *rana Valisneri* operum T. I. p. 445.

Porro ovum in tubam pendulum ex vasculo pedunculo *Buffiere* in *femina Phil. Trans. abr.* Ill. p. 212. *Goetliche* apud *Schurig. sylleps.* p. 51. Ovum autem in tubam receptum in *femina Edimb. Soc. Eff.* V. p. 316. in *crinaceo Peyer ad Muraltum* p. 256. *Valisnerius* in *cane* c. IV. n. 5. & *vulpe ib.* n. 5. tubam late instar cuculi ovarium amplexam vidit, ipsumque demum notum perisalticum, quo tuba adreptum ovum promovebat c. IX. n. 12. Ita *LITRIUS* illustre exemplum habet tubae adhaerentis ovario, ovum amplexae, quod media parte ex ovario exterat *hist.* 1706. n. 8. & aliud pene simile 1701. p. 244. Similis fere *VERCELLONI* historia est, & plucula in canis tuba ovula vidit *SCHURIG.* l. c. *MANGETUS* etiam ovula extra ovaria, & in ipsa tuba in *femina* reperit l. c. p. 72. & in *cane* simillima observavit *GOELIKE* apud *SCHURIG. sylleps.* p. 50. 51. deinde ex ovario de petiolo pendula ib. nisi ea quidem fuerint hydatides, uti non male suspicatur *SBARAGLI scerp.* p. 381. quales saepe de tuba pendulas vidi, & pingit *NOORT-VVYCK.* atque passim reperio *E. N. C. Dec.* Il. ann. 5. obs. 71. ut

que ovum de ovario pendulum. ann. IV. obs. 74. pro ovo etiam habitum in *COMM. NOR.* 1737. *ibid.* I.

- (21) Denique *RIOLANUS* duo exempla setum in tuba reperorum habet p. 120. quorum alter pollicis longitudine fuerat. Non ignoro, parum huic historiae tribuere *G. I. A. STRAUSIUM* in *epist.* ad *STRAUSIUM*, rationem vero dubii in tanto exemplorum consensu non video. Aliud ex *BARBATO* ipse *SBARAGLI* narrat *scerp.* l. p. 266. Aliud exemplum est in *E. N. C. vol. V. obs.* 152. aliud in *Phil. Trans.* Ill. p. 216. n. 251. aliud ex *MENONE MATTHIAE* apud *SCHURIGIUM* in *sylleps.* p. 89. Fetus in tuba siccum reperorum memorat a *DUVERNEYO DIONIS* 367. & placenta praedictum, cum tubae finis pene caecus esset *E. N. C. Vol. 5. obs.* 152. & *DUVERNEY Mem. de l'Acad.* 1702. p. 298. seqq. Fetus tubarium etiam vidit *BROCKIUS Comm. Nor.* 1735. *ibid.* 19. Ex *Fabricio Terza Lana* duo exempla refert *Patonus della generaz.* IV. p. 57. *SANTORINUS* etiam narrat historiam fetus in tuba reperi, iconemque addit T. II. f. 3. 69. *CYPRIANUS* propria epistola historiam tradit fetus, quem ex tuba matris excidit superstitis, ebfucriorem tamen, ut etiam negaverit tubarium fuisse *BIANCHUS* p. 390. 191. Sed & *Profoer* meus *TEICHMEYERUS* setum tubarium vidit, quem post sex annos ex inciso abdomine, crassaque ad duos digitos sinistra tuba exciecit *ILL. TEICHMEYER med. for.* p. 64. & dentes maxillaeque fragmentum ex tuba excisam *TEICHMEYERUS*

rum, modo alibi in flexione aliqua, modo propius fini tubae, qui in fimbrias expanditur, modo in superficie ovarii, quod extrema tuba expansa comprehenderat, accreta ovario. Plerumque tamen in media uteri cavea fetus in humanis feminis reperitur, in brutorum autem femellis multiparis in cornubus.

§. DCLXIX.

NERUS refert *misc.* 1730. p. 1421. Bis etiam conceptionem tubariam vidit I. DOUGLAS in tract. *de cunic. partu*: & lego PETERMAN. NUM talem conceptum vidisse. VASSALIANUS etiam fetus, quem in uteri potius hernia quam in tuba sedisse, MAURICEAU adfirmat p. 77. seqq. omnino tubarius fuit, ut icones docent in PHIL. TRANS. n. 47. & apud MAURICEAU p. 50. & in ELSHOLZII *diff. de tubario conceptu*, & confirmat DIONIS *cours d'anat.* p. 555. & DUVERNEY *mem. de l'Acad.* 1505. p. 505. In vacca partum tubarium habet BIANCHI p. 51. Hue porro pertinent historiae fetuum, qui in tuba enutriti, cum enormiter dilatati fuerunt, & in abdomine reperti fuerunt. Tale exemplum habet DIONIS *cours d'anat.* p. 373. & aliud, nisi ad duplicem uterum pertinet p. 330. & ZOD. GALL. *ann.* IV. m. febr. Aliud SAVIARD. *obs.* 60. & *Phil. transf. Abr.* III. p. 2. 14. Idemque describit DIONIS p. 315. seqq. BIANCHUS scrum habet, placenta sua ad tubam adnatam, qui ultimo per anum putridus eiecitus est p. 181. Fetum immaturum ex tuba rupta elapsum fuisse LITTRIUS describit *Mem. de l'Acad. des Sc.* 1702. p. 279. seqq. Similis CALVI historia est, nisi quod matris funesta fuerit *hist. de l'Acad.* 1214. *obs.* 2. & VALISNERI c. 17. hue enim pertinere MORGAGNUS testis est *adv.* anat. IV. p. 82. Verum non solus casus fetus invenit tubarios, NUCKIUS enim cani, tertio a coitu die, coetu ligavit,

deinde 21. die reperit inter ovarium & vinculum duos fetus, cum reliqua tubae pars uteri vicinior inanis esset *Adenogr. curios.* p. 69. 70. Experimentum enim falsum esse durissima conjectura est VOGLI & PAITONI l. c. IV. p. 94. 95. in tanto eum reliquis experimentis consensu.

Quomodo vero ali potuerint in tuba fetus, explicavit CYPRIANUS. Vasculis abundat tuba, & alibi non rarum est, adfectas partes in enormem massam adfluxu humorum intumescere. Omnes tamen tubarii fetus exigui fuerunt SANTORIN. *istor. d'un feto*, neque facile sextum mensem superaverunt DUVERNEY *Memoir de l'Acad.* 1702. 406.

Caeterum haec suffus propendere est necesse, postquam SBAKAG. omnino tubam ovarium amplecti, ova exfugere *seps.* II. tum ova de ovario excipere & promovere posse negaverat *seps.* p. 451. & adfirmaverat, saepius se expertum, nunquam in cornubus ovum invenisse p. 372. quae etiam LEEUVVENHOECHII obiectio est *Exper. & cont.* p. 402. Addit SBAKAGLI, longitudinales fibras tubam potius elaudere p. 453. Alii vero, tubam non mutari, neque dilatari tempore conceptus, obijciunt, ut DUVERNEY Chirurgus ZOD. GALL. II. m. Mart. & infusus est VERHEYEN. se tubam ovario applicatam non reperisse II. p. 316. Denique NABOTHUS se castellis vinculis tubas constrinxisse, nihil diminuta fecunditate ait *de steril.* n. XII. Verum reliqui mortales

§. DCLXIX.

Utero) Ovaria haerent in membrana eadem, in qua tubae, continuo cum tunica, quae super uterum expanditur. Uterum autem & tubas (2) nullibi contingunt, cum in plano ab utrisque remoto sedeant.

Firmantur) Ne facile a loco suo divagentur (3).

Magna) Testibus tamen virilibus minora (3*). Veteres pariter testes dixe-

rales pene omnes consentiunt, tubas, ad ovaria accedere posse. Nam etiam sponte plerumque adhaerent extremis laciniiis not. 1. & vasis repletiis adiungunt, ut ad ovarium se quasi convertant KEIL. *comp. anat.* p. 107. SANTORIN. p. 129. qui aliquas etiam hic partes esse credit nervi plexus alarum vesperitilonis p. 230. Erigi spongioso corpore repleto & adhaerere. HARTSOECKER *suite des conj. phys.* p. 110. & analogia omnino lavet sexus masculi. TAUVRYUS etiam fibris suis spirales & longitudinalibus & breviores fieri, & ad ovarium adduci credit, uti ex simili fabrica fit in oviparis p. 68. Sed eae fibrae obscuriores sunt. GRAAFIUS vero vinculo multum tribuit p. 305. Porro fimbriae musculosae ovarium amplecti possunt DRELINCOURT. apud MANGET. II. p. 138. *de conceptu Perioch.* 13. & ovum exprimere, tunc anulo fibrarum contractae. *promovere Perioch.* 5. 6. HARDER *apiar.* p. 34. & eo tempore tubae insigniter tument, robustaeque sunt, quando adhaerent ovario BUSSIERE *abridgm.* III. p. 211. Deinde tuba ovario adnota reperita est, per pfiora, & in tuba fetus: ut omnino non teneantur, demonstrato eventu, mechanice docere, qua fieri poterit.

Denique in aliis animalibus, quae certissime ovipara sunt, longe minor imer ovarium & infundibulum, sive tubum uexus est, neque

Tom. IV.

fere nisi vineulum, ad quod inflexus oviductus ascendat. In avibus SVVAMMERDAMIUS testis est, I. c. p. 24. & BELLINUS, & VALISNERI c. 19. n. 9. ut olim admiratus sit HARVEJUS, quomodo ovum ex vitellario per distans infundibulum descendere possit p. 83. In piscibus, ut in cane, oviductus per abdomen mobiles fluitant N. STENONIS *myol. spec.* p. m. 146. In ranis autem, non solum longe pro animalis statura ab ovario distant tubae, sed praeterea immobiles sunt SVVAMMERDAM. I. c. PEYER ad MURALTUM p. 405. &c. & adeo arcto orificio aperiantur, ut ignoratum prioribus primus invenit VALISNERIUS I. c. c. 19. n. 8. In testudine vero tubae foramen minimum, finis ab ovario remotus & aversus est, & desunt laciniae amplexurae, & tamen ova eo venire necesse est, cum ovaria pariant TAUVRY p. 38. 60. In vipera denique oviductus foramen reperiri nequit MORGAGNIUS IV. p. 82.

(1) *Valida, in Textu*) Teres illud distans DCLXIX. & latum DCLXIII.

(2) De tubis vide DCLXVIII. not. 2.

(3) Mobilis tamen esse adparet ex DCLXIII. not. 2. CARPUS modo supra cornua esse, modo inferius, modo longe remota in MUND. p. CXCVI.

(3*) Duplo minora in homine VALISNERIUS c. 1. GRAAF. p. 225.

K

dixerunt: communia autem sunt [4] omni generi animalium femininorum. Eadem eximuntur ex vaccis, porcisque saginae destinatis, vulnus autem,

- (4) Ovaria corpora sunt femiovalia, utrinque compressa VVINSLOVV. 604. basi lata ex ligamento suo, sive peritoneaco orta, postea retro rubas, & paulo superius SBARAGLI f. 1. 2. conf. GRAAF T. I. Ibi innumerabilia vasa a spermaticis ad ovarium accedunt, quorum ramuli per medium axin baseos in ovum adfcedunt GRAAF. T. XVI. f. c. e. Haec pleraque cincinnata sunt, & serpentina, & olim a GALENO cum caesarie comparata fuerunt *de vultu. diff.* c. IX. Cincinnata vocat SBARAGLI p. 421. & pingit NUCK T. XXXII. Anteriorum a basi in eminentiam adfcedunt ovaria, arcu comprehensam semielliptico, utrinque depressam, latamque GALENUS l. c. c. IX. Superficies limitatur equidem pene insuperabili (VESAL. p. 658.) adhaesione membranae alarum vespertilionum, quae ovarii communis membrana est, pro darto data a GALENO l. c. simplex in homine, & similis peritoneaci, absque ullis carneis fibris, quas in vacca vidit MALFIGHIUS *op. ad Spon.* p. 30. & VALISNERIUS c. 3. p. 17. & in equa *Idem* c. IV. n. 1. & in femina nominat *Idem* c. V. n. 24. tum *Littre bist. de l'Acad.* 1701. p. 143. Neque SBARAGLI vidit p. 302. 303. uti imaginarios illos *Galenus* cremastres ovariorum bonus *Carpus* non repetit p. CCXC. Neque video aliam propriam testium tunicam, diversam a propagine ligamentorum laterum, qualem *Riolanus* proposuit p. 100. & *Littre* l. c. nisi de industria velis in lamellas separare, ut *Santerius*, *isthor. d'un feto* n. 27. vide consentientem, necum *Graafum* p. 126. *Lientaud* p. 364. Hinc inde plerumque ova-

rium eminentibus turget hemisphaeris, quae olim ratio fuit, cur *Vesalius* cum glandulis conjunctis comparaverit l. c. & p. 658. ubi sinus, ad pisorum similitudinem protuberare scribit; glandulosum vero dixerit & pinxerit *Spigel. de form. fer.* T. XXI. f. 1. conf. *Sovamerdam. mirac. natur.* T. III. *Elsholtz.* E. N. C. Dec. I. ann. l. *obsf.* 197. f. 2. &c. Substantia propria alba, pulposa, humecta, ex brevissimis, arte stipatis fibris mollioribus, parum tensis *Valisneri* c. 1. compacta, nihil in corpore humano sibi simile habet, utunque tamen cum conglobatis glandulis convenit. Conf. *VVinslov.* n. 609. Cum placenta comparat *Bienchi* p. 48. quod pariter in villis abeat. Sed differunt longissime. Ceteras substantiae ovarii in alina fibras *Valisneri* c. IV. n. 2. a *N. Stenois* tactas A. H. II. p. 129. & in equa ex externa membrana perfectas *Valisner.* c. IV. n. 1. etiam *Sbaraglio* dictas c. 413. & *Littre bist. de l'Acad.* 1701. p. 194. & *Vesalio* forte *exam. obsf. Fallop.* p. 145. & in porca *Valisnerio* c. 3. perinde nunquam vidi. Neque cellulas peculiare in ovarii novi, in quibus demum vesiculae nidulentur facile eximendae, dictas *Drelincourtio de sem. fem.* n. 9. p. 591. *Elsholtz* l. c. & *Nigrisilio* p. 16. neque alius, praeter *Duverneyum*, ovarium per cicatriculam insulari posse videri & insular cellulosa fabricae turgere, quae cum vasis spermaticis communicat *Mem. de l'Acad.* 1701. p. 140. De Lymphaticis vide DCLXIV. Ea in ovario, & in ipso ovo vidit *Valisneri*, & ab ovo in corpora lutea exire c. 12. n. 6. *Graafus* in interioribus ovarii non vide-

autem, erepto ovario, consolidat veterinarius. Femellae vero, quibus excisum est, nunquam ulla adficiuntur libidine venerea, neque concipiunt unquam. Hujusmodi castrator in Germania fuit, cui cum minus casta filia esset, ita bilis mota est, ut aperto latere castraret puellam, quam ab eo tempore nulla tetigit veneris cupido (6).

Sphaeroides) Ex sphaerica figura compressa. Hi testes in virginibus teneris leves sunt, coitus vero tempore perpetuo scabri, majores, pleni sanguine.

Inclusa

viderat p. 227. *Malpighii* vasa flavo liquore plena in ovariis reposita huc pertinere videntur p. 32. Praeterea duriuscula vasa ignota in quibusdam animalibus reperit *Valisnerius* c. 3. n. 27. an arterias? in juvenulis utique ovaria magis succulenta sunt *Valisneri* c. 2. globosa magis, & pondere drachmarum duarum *Santorini* obs. p. 221. *Graafius* in recens natis & infantibus a quinque granis ad decem, in flore aetatis sesquidrachmam, in decrepitis scrupulum pendere scribit p. 225. In vetulis ovaria exsucca reperi, scabra, minora, duriora: quae 10. tantum grana pendere *Santorinus* testis est p. 222. conf. *istoria d'un feto* n. 21. Vidi tamen in quinquagenaria femina, obsoleta ovaria vetusta, quaedam ova continere, & duo corpora lutea: alias in vetula ovarum loco miliaceos tantum acinos, albos, solidos, reperi. Cur autem decrescant quidem, sed non evanescant, ut in gallinis, responder *Tauvry de la gener* p. 49. quod in avibus & majora, & molliora sint. Sed ratio evidens est in peculiari fabrica glandulosa spongiosa, quae in viviparis copiosior est, licet neque avibus desit *Collins* p. 646. &c. Ipsa denique corpora lutea praeinde in vetulis delentur *Valisn.* l. c. c. 18. n. 18.

- (5) Primum ovaria dixit *N. Stenonis* an. 1667. in *spec. myel.* p. 145. ad. *Bat.* etiam *Svianmerdanio* teste *prodr.* p. 54. post cum *van Horne prodr.*

p. 15. ut male *Hornio* tribuat *Dismerbroeck* p. 229. Recentiores omnes consenserunt *Sharagli* excepto, qui *vaguetaria* solet vocare *scapp.* l. p. 304.

- (6) Historia exstat apud *VVierum, Graef.* p. 240. Olim, „aprisi partem partem vulvae resecari, sic conceptus faculratem & anorem veneris extirpari, *Aristoteles* auctor est *hist. anim.* l. IX. c. 50. Perisæde hoc confirmat *Verbeyen*, per sectiones animalium castratorum, edoctus „senioribus ovarium solum, junioribus praeterea uteri partem resecari, utraque potro a venere abstinere & a conceptu l. p. 326. *Gardanius* vero apud *Leavenhoeckium experiment.* 64. *Cent.* III. & *Venetio* p. 228. & *Sebargius multibr.* p. 69. & *Peyerus de rumis.* & *Raifsyn. quadr.* p. 49. omnino ovaria eximi dicunt, indeque animalia sterilescent. *Barbette* tamen *prax.* p. 83. iuibus uteros eximi mavult, & *Rouffetus* alias vasa spermatica, alias ovaria, a peritioribus denique uteros, etiam praegnantem excidi p. 226. 227. ut videatur in gallinis quidem certo ovaria eripi, de viviparis nihil adhuc firmum sit.

- (7) Ova in pletisque cadaveribus vegetae aetatis reperi, majora, minora, propiora membranæ, vel profundius demersa, inaequalia, ab avellanae mole ad minutiam lentis. Minuta pingit *Bidloo* T. 51. l. 4. & semine nulli non majora,

a

tum

tum *Kerkring. anthropol.* f. 1. qualia lego *Ettmullerum* vidisse apud *Schurig. de mul.* p. 334. nimis magna *Bradley account of the vovorks of nature* d. 169. Numerus incertus est. Duo tantum vidit *Bartsolinus hist.* 98. Cent. II. septem, octo *Nigrifolius* p. 22. viginti ad triginta *ETTULLER*, viginti *Garmaun*. Plena sunt liquore, alias ex luteo pellucido, alias turpi opaco, alias mucii simili. Sero lacti comparabat *Vesalius* & in hysteriis erocum viderat p. 658. Est etiam, ubi praeter liquorem flavum irregulare corpus intus reperi, de quo sibi. Membrana robusta est, sed undique adnata carni ovarii, a qua vasa habet, per membranas evidentes distributa *Svammerdam. prodr.* p. 30. *Graaf.* p. 227. *Berger.* p. 456. qui etiam nervorum meminit. Nunquam autem ovum ita dissoluta vidi, aut credo apparere, qualia pinxit *Svammerdam*. T. II. III. & dicit se vidisse p. 30. Sedes in ovario ex maxima parte in ambitu est *Graaf.* T. XVI. ut casu fiat, si aliquando in medio majora, miliacea parva in ambitu fuerint, quod *ETTULLER* & *ARMANNUS* habet in *SCHURIGII syst.* p. 112.

VESALIUS primum l. c. c. 658. & *exam. obs.* *Fall.* p. 135. deinde, cum semen quaereret, aequo vel luteo succo turgentes vesículas vidit *Fallopium obs.* p. 195. b. In ruminantibus testes vesículas plenos reperit *COITER* p. 124. quarum aliae aquam, aliae liquorem luteum continebant. Connatis vesiculis rectes in femina constare *SAL. ALBERTI* p. 103. *RIOLANUS* muliebrem testem racemum esse, ex quinque vel sex vesiculis p. 119. *SPIGELIUS* verba *COITERI* fere repetit p. 260. de *D. MARCHETTI* eas pariter vesículas vidit p. 44. multatque addit fuisse. Vesículas in glandulosa materie ovarii

habet *VVBarton.* p. 225. limpido semine plenas p. 222. Ova vero esse *N. Stenonis* auctor est, & *I. van Horne* l. c. nam neque *Drelincourtius* de *ostinestri* partu, neque alii, quos adeo multos excitat de sem. ovii p. 589. neque *Honoratus Fabri* vesículas pro ovis & hospitio hominis habuerunt. *Baldus* autem *Angelus* unique viperarum ova vidit, minima, in duplici vulva longe disposita, & minime ignoravit viva inde animalia nasci de vip. p. 41. 54. ad quadrupeda vero inventum nunquam transtulit. Deinde praeter ea, quae ipse dixi, peculiariter, densam ovi membranam, & sub ea vasorum rete *Malpighius* habet ad *Spon.* p. 31. facile visibilem etiam inanito ovo. Eam alii in duas partiti sunt *Murali.* p. 220. in equa, *Keil.* p. 105. *Stokbaemer.* *Bobn.* p. 22. *Nigrifolius* p. 22. externam densiorem, internam subtiliorem, pellucidam *Nigrifol.* & in asina denique *Valisneri* duas membranas, vasaque in primam, hinc in alteram cuncta, & internam faciem villosae similem describit c. IV. p. 3. *Nigrifolius* autem l. c. glandulas minimas internae superficiei addit, in quas vasa terminantur, microscopio visibiles, sed nemini praeter cum haecenus visas. Vasculosum vero petiolum, ex quo penderet ovum, passim invenies *Pbil. transf. Abr.* III. n. 212. *Nigrifolius* p. 22. *Lieutaud* p. 362. cum ego non petiolo aliquo, sed undique connexa reperiam. Cum ovis piscium summa adfinitas est. His enim pariter duae membranae sunt, & humor intus crystallinus absque vitello *STEN. myol. spec.* p. 146. Similia etiam sunt in plurimis insectorum, ut cochleis *ANT. FELIX MARSIGLI in epist.* n. 9. Dudum *ARISTOTELES* avibus ovum bicolor esse, piscibus unicolor de *gener. anim.* L. III.

Inclusa) Ut nullo nisi duplici tempore foramen in ea membrana reperiatur (8).

Haud queat) Uti nemo masculini testis fabricam hactenus explicavit, ita neque femini testis structura exposita est. Testis masculus non potest in glomerem explicari, & erravit BELLINUS [9], quando vas feminale credidit ejus longitudinis esse, quae conficitur habita ratione ponderis totius testis ad breve aliquod filamentum, quod explicaverat, & lanci appenderat. Ita confecit, vas feminale trecentarum ulnarum florentinarum longitudine esse. Sed mille sunt vascula seminaria, brevissima omnia, quod per RUYSCHII praeparationes nunc certo scitur. Verum in teste feminino longe difficilius est detegere quidquam: cum neque NUCKIUS artificiosa sua mercurii injectione, neque RUYSCHIUS felicissima sua cera aliquid de hac structura detexerit. Videtur, arterias ubique quasi desinere, venaeque in superiori parte ovarii primum incipere, neque vasa alia reperiuntur, & tamen ex his ipsis vasis contextus certissimè componitur ovarium. Quo vero alii de fabrica testis muliebris scripserunt, ea fere ficta sunt.

Sphaerulae) In omni [10] femina humana, aut bruta, in perfecta sanitate extincta, quando in vigore aetatis constituitur. Haec solus bene

L. III, c. 1. & Needhamus de form. fet. c. 3. qui Rajam solam excipit. Hoc rectè NIGRISOLIUS monet p. 21. qui addit, trutarum ovis & similia esse, & aequalia p. 22. Ex NIGRISOLIO PAITONUS Diss. III. p. 14.

(7*) *Lymphatico, in Testu.*] Totum ovum sacculus est liquore plenus, qui ad ignem coagulatur *Svammertum*, p. 45. *Dresincourt, parerg.* de ovib. n. 4. *de fem. ovib.* p. 591. *Murali*, p. 220. *Taurvy* p. 47. *Sbaragli* p. 349. 393. *Kerkring*, in *antrop.* c. 1. *Peyer, obs.* p. 37. *Graaf*, p. 309. 310. *Vorbeyen*, p. 130. E. N. C. Dec. III. ann. 9. 10. obs. 191. *Nigrisoli* p. 22. *Valisneri* c. 3. *Teichmeyer*, de generat. b. 31. *Brentel*, in *Schacberi diss. de virg.* bydr. Keil. I. c. *Douglas Phil. transf.* IV. P. II. p. 116. *Manger. Theatr.* II. p. 63. *Gandolphe bist.* de l'Acad. 1703. p. 33. ut omnino ova, ut in gallina, cocta indurecant. **ELSHÖLZ E.**

N. C. Dec. I. ann. 6. obs. 191. idemque in plurimis quadrupedibus verum esse reperit *REDI degli anim.* viv. p. 78. Blandus est liquor, & albumini similis *MANGET* I. c. in sue, *STENONIS* A. H. II. p. 229. in asina: ut subauster *VENETTI* Lapor, aut subacris urinosus *GEUDERI* apud *SCHURIG. muliebr.* p. 341. & experimenta, in quibus *SBARAGLI* vidit liquidum ovorum non coivisse p. 393. omnino ad putredinem referam, quae & acres, & volatiles reddidit humores. Aliquando ita viscidus est, ut cum lenie crystallina comparaverint *EDIMBURGENSES* T. V. p. 337.

(8) Vide proprio loco inferius.

(9) DCXLIII.

(10) Omnino in omni animalium genere huiusmodi bullae reperiuntur, *PARISINI* de tigr. avibus, insectis, piscibus, minime excepta anguilla, uti ante *VALISNERIUM Phil. Transf.* n. 231. **ALLINIUS**

ne descripsit MALPIGHIUS (11) : tribus nempe ova constant partibus , calyce glanduloso , duabusque membranis . In venere magis eminent .

Calyx) Calyx, sive capula glandis hujus corporis similis est. Quando sanæ vaccae (12) ovarium ex corpore resolvitur , immittitur tepidae , & diu

NIUS vidit , deinde in *A. Suec.* Vol. 1. p. 476. confirmatum est . In cochlearum omni genere LISTERUS vidit , & ANT. FELIX MARSIGLI L. c. & poneotes ova cochleas C. GESNER , in limacibus HARDER *apier.* p. 36. In quadrupedibus viviparis , & in feminis humanis pierumque reperiuntur , ut nihil sit , quare NIGRISOLIUS suam ovorum visorum historiam pro re memorabili recenscat p. 17. 22. uti non oportebat a CONTIO oegarii adeo vulgare experimentum GIORN, *de letter.* T. XII. p. 281. &c. Reperiuntur porro in cane , felle SVVAMM. *prodr.* p. 19. mure l. c. ubi addit , in utroque genere valde protuberare , in leaeoa *Parisini* , *Redi* , lynce , tigride *Parisini* , ursa *Redi* , suæ *Peyer. morycolog.* p. 49. simia *Parisini* , porcello iudico *Sten.* taxo *Idem* ib. equa *Peyer. exere.* p. 153. & *Murali.* p. 220. aliis *Redi* . Inter ruminantia in vacca *Graaf* T. XIV. f. 1. XV. *Redi* , in bufalo *Idem* , in cerva *Idem* , io dama *Idem* , in ove *Leeuwenhoeck anat.* & cont. II. p. 165. & in omni demum quadrupedum genere *Graaf* p. 229. *Peyer. ad Muralium in vadem.* p. 400.

- (11) In femina sua suspensa , ex ovario vidi quasi baccam protuberare , succo plenam , rimosam , acinosam , ex vasis de ovarii substantia suspensam , facile separabilem . In alia femina suspensa , cuius ovario tuba adhaerebat , bullam similem avellanæ vidi , plenam aqua sordidi coloris , cinctam ad basio corpore ex luteo fusco , lacunato , & granuloso . Deinde in gravida puella a vel 3 mense ,

corpus luteum olivæ simile , flavum , acinosum , sinu medio , sed caeco divilum , non pervio foramine apertum , sed caerulea , debili , membrana clausum vidi . In alia quinquagenaria muliere duos lenticulares sacculos flavos , duriusculos , caves vidi , quarum partem pollicis longos . Sed in gravida quinto , vel sexto mense , felicior corpus luteum vidi , magnum , rotundum , luteum , acinosum , membrana ovarii comprehensum , in medio cavum , inflabile per foramen exteroæ membranæ , subrotundum , inflammato circulo rubente cinctum . Totus iste calyx , oexus equidem ovario cellulosa tela , & vasis , facile tamen eouclabatur . Satis adeo certum est in feminarum , et si non omnium , ovaris reperiri glandulosa cava corpora , quæ proprio canale cum foramine , membranæ exteroæ communicent . Ea vero fibrosa esse , aut musculosa , aut demum villosa , cum meis experimentis non consentit . Glandulosa esse mecum Morgagnus *Adv. anat.* IV. p. 78.

- [12] Primus COITERUS glandulas ovariorum vaccinorum vidi p. 224. diu neglectæ a GRAAFIO visæ sunt io vaccis , globuli nempe , radiatis facti particulis flavis , in medio in membrana limpidum , continentes liquorem , quo expulso fovea superfit p. 227. T. XIV. f. 1. IDEM ex ove cum cavea , sua expressit T. XIV. f. 4. 5. tum eminentia cum foramine suo f. 3. ex cuniculis vero T. XXV. P. Q. & fule descripsit C. XVI. io his bestiolis vidi hos folliculos a coitu opacos fieri , & rubentes , & vasculosos , & ex ovario emi-
nere

diu immergitur, tunc adparent vasa lymphatica. Ergo superficies exterior removeat, quae fabricam ovarii coercet; apparebit interior facies

nere p. 305. nihil enim aliud omnino sunt, quam lutea corpora. Porro HOBOKENUS in vaccis auream glandulosam substantiam descripsit de *secund. vitul.* p. 230. & pulchre depinxit f. 35. 36. SVVAMMERDAMIUS apud SCHRADERUM in *Praef.* corpus fibrosum flavum, cum foveola in gravida muliere vidit. Deinde N. STENONIS in asinae ovario appendiculas calycum similes describit A. H. II. p. 129. & corpus triangulare multa ova comprehensum IB. in mula vero corpus glandulae conglomeratae simile cavum, liberum, extrema parte existente p. 230. ELSHOLZIUS corpus, nuclei crassi mole, spongiosum, rubens, in infantida vidit l. c. & pingit, sed inclusum ovario f. 3. PEYERUS autem in ove tubercula rubicunda, globosa, fibrosa, sive papillas ad MURALT. p. 414. 415. tum in damis DCLXIX. not. 19. corpora glandulosa descripsit *Merycol.* p. 49. fibrosa, & ova globosa in porcis praegnantibus protuberantia non videntur differre, quae ibidem citat. Sed MALPIGHIIUS eorum naturam profundius introspectit, tum in vaccis, tum in mulieribus, glandosum nempe corpus esse, simile capsularum renalium ad *Spon.* p. 32. componi lobulis angulosis, quasi ad vasa appensis, & ex varicosis propaginibus luteis compositis p. 31. cavea, plurius mole excavari, l. c. plena diaphano humore concrecibili, patente in foramen papillae ovarii p. 33. extus habere tumores inaequales, & fibras carneas alte se infinuantes, & vasa sanguinea, propriamque membranam papilla ex-

cepta, quae sola membrana ovarii tegatur p. 31. cavum illud membrana succingi, quae instar ramorum per substantiam corporis lutei deducatur, ejusque ramulis lobulos appendi p. 31. DRELINCOURTIUS calyces nerveo carnosos describit *Perioch.* 12. quibus ova immarura valide, maturalevisime nectantur *Per.* 13. ovum expellere natos ib. carnes suis, quas tribuit, fibris: neque alia forte sunt corpuscula conglobata, quae in puerperae teste vidit de *femin. ovit.* n. 15. COLLINS eadem recepit p. 606. 607. neque aliae forte sunt minutae ovarii glandulae, quas ait succum pro vesiculis praeparare p. 590. 591. BARBATI ova quantum ex VOGLIO video p. 22. cum intus varias protuberantias habere dicat, omnino corpora lutea sunt. Huc forte pertinet ovum olivae magnitudine, quod in hystericae virginis ovario vidit DENYS *confere.* p. 64. & ovum forte feminac, in magno ovario ita turgens, ut eximi posset C. BARTHOLIN. *overr. misell.* 2. p. 42. nisi hydatides fuerunt. TAUVRIUS haec corpora lutea etiam carnes fibris mista describit, & papillam efficere pro expellendo ovo p. 56. 57. Deinde VERHEYEN. globulos eminentes in sue vidit II. p. 316. & papillam in vacca ex coitu protuberantem p. 314. auctam in impraegnantis p. 313. tum in ove p. 315. BOHNIIUS recte, secundum mea quidem experimenta, negat musculosum esse p. 13. BERGERUS in puerpera cavum, & protuberans describit p. 457. SBARAGLI saepe vidit corpus ex teste erumpens, flavum, cujus cap-
sula

cies ovarii, scabra undique, & plena tuberculis, sive corporibus luteis: ea MALPIGHIUS calyces vocavit: vitellorum autem minimorum similes sunt

sula per graviditatem dehiscit, p. 453. BRENDELIUM lego in gravidæ ovario unum vidisse. RUYSCHIIUS apud ELSHOLZIUM, & MAGNETUM in *bibl.* p. 551. ovi in teste sedem, nempe luteum corpus, spongiosum, cavum, in cavea rubris villis oblitum, vidit. Porro in *Thest.* VI. n. 32. in femina invenit calycem ovi egressi oblitum rubicundæ materie, villosa, in medio vero foramen, & exiguum cavitatem, quam globosam lente coeuntem describit *Advers.* Dec. III. n. 11. ex qua credit ovum proditisse delicto calyce, eamque addit, parvo post coitum intus rubere, & villosam, & scabram apparere. IB. alibi vero a conceptu cavitatem in ovario inius rugosam vidit *Adv.* I. n. 2. DUVERNEYUS addidit, cavitatem istam cum vasibus spermaticis communicare, & flatum eo dimittere, non tamen semper succedere experimentum. (p. 241.) *Mem. de l'Acad.* 1701. p. 242. 245. conf. f. 7. 8. 6. 3. pinxitque corpus avellanæ mole f. 3. eminens, perforatum f. 1. &c. In ovibus perinde fere rubentem ex superficie eminentiam, intus vacuum p. 245. 246. CL. GOELIKE adhuc juvenis in cane corpora glandulosissima vidit eminere apud SCHURIG. *syll.* p. 50. LITTRIUS in femina „ carunculam, cerasi similem intus glandulosam, extus musculosam, cavam, cavea in foramen membranæ ovarii communicante vidit *Mem. de l'Acad.* 1701. p. 384. & foramen ducens ad cellulam sanguine plenam 1705. *obs.* 7. & alias in femina, per foramen ovarii in cellulam incidit, vicinis partibus ovarii per vasa

nexam, exterius rubram, musculosam, interius glandulosam flavam ib. p. 245. Porro carunculam pisi mole in ovario vidit 1704. h. 21. anno 1706. vero *bibl.* 8. calycem vasculosum ex glandulosam, & musculosam parte compositum. VALISNERIUS plurimum in ipsis laborem posuit, & in plerisque animalibus reperit. In vaccis papillam eminentem, cavitatem magnam triangulam, fabrica conglomeratæ glandulæ c. III. n. 17. & foramen invisibile n. 19. In ove separabilia eadem corpora, cava, cavitatem vasibus vestita n. 22. In equo & hæc, & mista nigra corpora T. 2. f. 3. In porca numerosa, plurimum vasibus ad ovarium nexa, quæ inter eximendum rumpuntur, plena liquore albuminoso *specificis levia* c. 3. n. 15. In cane tria corpora spongiosa, a coitu tumentia, papillaria, extra venerem vero minima papilla destituta c. IV. n. 15. viscido liquore turpida cava, intus liquore lymphatico, alias albuminoso plena, exiguo ostio n. 5. p. per illud, & laterales poros fundencia liquidum n. 7. 11. quasi sphincteribus cinctos n. 10. foramen vero ducens in caveam corporis lutei n. 8. substantiam quasi intestinulorum forma n. 6. 8. quæ intestinula tubul ex acinis sive globulis componi videntur, & vasa admittit habeant n. 10. In eodem animale extra veneris tempus corpora lutea parva, paucos liquidos plena, non eminentia vidit c. IV. n. 24. In capra pariter papilla eminente conspicuum, cavum, foramine patens, lobulosum, valde vasculosum C. V. n. 4. simile fere in rupicapra n. 1. In felle plura, manifesto perforata ib. n. 3. In mure

sunt, quales in gallinarum gallinacearum ovariiis reperiuntur. Fabrica horum calycum singularis est, carnea, aut glandulosa; figura cava, unde nomen est. Ex ea cavitate corporis lutei emergit vesicula (13) aqua plena

mure denique pancreatis specie, in mediis fissa corpora, quae facile ex ovario eximi possunt n. 8. In virgine libidinosa papillam eminentem lympham pellucens plenam, glandulosam, ex rubro flavam, ovario distinctam vidit n. 16. SANTORINUS fissam a corpore luteo turgido membranam ovarii reperit *ibid.* d. un. feto n. 24. & *obs.* p. 224. ejusque alibi insignem magnitudinem in praegnanter, cicatricem parvam n. 16. & *obs.* p. 227. cavum autem membrana cinctu n. & ovi periculum forte continens. Fabricam etiam cum intestinulis comparat p. 222. VASEIUS partu vidit *grav. app.* n. 17. in femina ceram aequale luteum, & spongiosum HILSCHERUS *de op. gener.* p. 17. tum in vaccis, pili in cellula sua capacia, & canibus in femina vero denuo MOEBIUS *diff. in obs.* 2. GALEACIUS perinde, ut MALPIGHIUS, in duabus feminis & foramen ovarii, & sub eo latens olivare corpus, ejusque caveae, & caveae in foramen communicantem, & glandulosam, fibrosamque naturam, vasaque, quibuscum ovarium adhaerebat *Comm. Bonon.* p. 128. 129. BIANCHUS calycem ovarii, sive rotundam cavitatem, ab ovi superfluitate, & reticulum vasculorum absque glandulosa fabrica defectibus p. 418. T. 1. TERVVIUS papillam, & cicatricem ex femina pingit *Comm. Nor.* 1735. hebdomada 39. CL. NOORTVYCK paulum diversam ratinam, tuberculum T. IV. f. 4. & cicatriculam ad tuberculum paulum distans poro communi-

cantem, in gravida delineat *diff. uter. grav.* p. 8.

- (13) Ambigua quaestio est, an haec lutea corpora vesiculosae prius dictas, tanquam calyces comprehendant. In oviparis, quod calyx dicitur, est exterior tunica nvi cum vasculoso pedunculo, qui aliusque manet racemo, quando novum delapsum est GRAAF p. 297. RUYSCH. *Theor.* IX. n. 16. In struthione describunt PARISINI calycem instar glandis apertum, vasculosum, producentem caudam, novo adnatam. Addit TAUVRYUS l. c. p. 52. ova calyce suo firmiter adhaerere. In quadrupedibus oviparis fere similia sunt, ut in testudine TAUVRY. p. 38. Deinde MALPIGHIUS frequenter involucrem luteum capreolatum super minimas vesiculas obdnci l. c. p. 31. & in recens natis adnatam vidit luteam materiam p. 32. GRAAFIUS in corpore luteo manifestum novum iconem expressit l. c. T. XIV. f. 4. In femina videtur admittere VVINSLOVV. ut culibet ovulo suis quasi a substantia ovarii calyx accedat: n. 605. VALISNERIUS etiam in vacca sterili vidit, luteam sub ovis materiem c. III. n. 20. si recte intelligo VERHEYENIUS in vacca a coitu rubescens papillae insidentem vidit vesiculam II. p. 315. N. STENONIS in lupa basin ovarum cingit glandulosa substantia, uti in avibus ACT. HAFN. II. p. 226. DUVERNEYUS junior in vaccis vesiculam ex calyce dimidia parte eminere vidit *Mém. de l'Acad.* 1701. p. 245. f. 4. NIGRISOLIUS, cellu-

plena, quae sedet in cupula, & ab ea tota amplexu obtegitur, neque superficiem ovarii contingit, quando ovum immaturum est. Quando vero femina ad venerem pervenit, tunc cavea calycis latefcit, & vesicula ita turgēt [14], ut pene tota libera ex ovarii substantia emineat, caly-

cemque

cellulas suas, in quibus vesiculae nidulantur, glandulis aut incrustari p. 16. LITTRIUS autem inclusum calyci ovum in femina fuisse describit *Mem. de l'Acad.* 1701. p. 147. & anno 1706. n. 8. ex calyce ad dimidiam extensum, calyce tamen retentum. RUYSCHIUS *Thes.* VI. n. 32. omnino corpus luteum pro calyce habet. HARTHOEKER ova faeces esse plenos gelatina, & in calyce cre-scere dixerat *suite des conf. phys.* p. 112. BLANCHUS p. 417. corpus luteum omnino pro calyce habet, cui interventu placentae adhaerescit p. 47. 418. & pingit villosum calycem, qui ovum completur. Manifesta tamen diversitas est calycis oviparorum, & corporis lutei. Ille enim est ipsa exterior ovi membrana, quae dimissa interiori in ovario remanet GRAAF. I. c. p. 247. 268. RUYSC. *Thes.* VI. n. 32. *Adv.* III. p. 16. In homine vero, & viviparis nihil membranacei habet calyx, sed ipsius ovarii pars princeps glandulosa est, neque satis certo haecnus vesiculis ovarii luteo corpore ambiri visum est, *conf. not. 15.* Hinc factum est ut DUVERNEYUS major nullos in mulierum ovaris calyces reperiri obijciat ZOD. GALL. *Ann.* II. *M Mart.*

- [14] Corpora lutea veneris tempore demum generari, & conceptus, neque prius adparere, ne in puellis quidem 13. & 16. annorum, GRAAFIUS p. 314. & BOHNIUS dixerat p. 10. KEHL. p. 109. 110. atque in fetis vaccis solis reperit HILSCHER. I. c. GRAAFIUS de-pique post conceptum ex vesiculis

generari, quas vulgo ova dicunt p. 251. atque jado post coitum emergere p. 227. Verum omnino ante coitum dudum generantur MALPIGHIO jam observante p. 32. & reperit BERGERUS p. 458. non in virginibus solum. SANTORINO teste p. 223. sed in suetentilla VALISNERI c. III. n. 16. & in parvis mutibus incipientibus lutea corpora c. 5. n. 8. & in agna demum trimestri c. 3. n. 25. & in vaccis virgineis VERHEYEN II. p. 313. Delinde paucis succellive prodeunt VALISNERI c. 17. n. 4. & lente augumentum c. IX. n. 4. versus eam aetatem tamen, quae ad venerem apta est, majora sunt c. 1. n. 7. & veneris tempore instar papillae eminent c. IV. n. 7. 12. PEYER I. c. DGLXVIII. not. 19. suntque maxima VALISN. c. IV. n. 7. & in brutta, & in feminis, ut exemplum habet SANTORINUS *istor.* n. 24. ut toto ovario in adultis porcis majora sint VALISN. c. 3. maximae vero parti ovarii in vacca aequalia IB. n. 17. & DUVERNEY *Mem. de l'Acad.* 1701. p. 241. & majora c. 3. n. 17. *conf.* MALPIGH. p. 32. In ove vero n. 28. & in cane catuliente c. IV. n. 7. simili mole observantur. In cuculo ex GRAAFII iconibus citatis nihil in ovaris praeter folliculos adparet: in femina duae cellulae conspiciuntur ovarium LITTRE 1701. p. 144. & in praegnanne femina magnam ovarii partem luteum corpus tenere observat SANTORINUS, *videlicet istor. d' un feto n. 16.* Sed & LITTRIUS vidit in praegnanne, & fetum credidit continere non om-

nido

cemque soli basi adpositum habeat. Hoc Clarissimi viri ovum semineum dixerunt, verum ovum non est pellucida bullula, aliquot liquoris guttulis plena, uti descriperunt plerique; sed cupula sphaerulam continens (15),

L 2

&

nino minimum, *Mem. de l'Ann.* 1701. p. 147. Aliquo adhuc tempore ab imprægnatione crescunt in ove VERHEYEN. p. 315. Deinde paulatim decrescunt, & prima papilla prominens retrahitur, atque evanescit TAUVRY p. 58. sensim autem in graviditate etiam corpus luteum minuitur, ut magnum sit, quando fetus parvus est KEIL p. 109. 110. VALISNERI c. 3. n. 22. & etiam intra quatuordecim dies decremētum distingui possit VALISN. c. 3. n. 21. 22. Ipsa aliquando evanescit cistrix VALISN. c. 10. n. 15. ut ultimis mensibus corpora lutea solida videantur Graaf. p. 228. tuncque sensim evanescunt *Bartbol. specim.* p. 122. *Malpigh.* p. 32. *Berger.* p. 458. In porca prægnante corpora lutea jam inania, & crassa, & foramine destituta *Valisnerius* vidit c. III. &c. In capra pariter decrepita luteum corpus reperit IDEM c. V. n. 4. contracta a partu in cane VAL. 5. n. 17. & valde diminuta *Graaf.* p. 310. non tamen destrui in feminis *Santorinus* recte observat p. 125. In puerpera vidit superstes *Littre* 1705. *bist.* 7. & a partu papilla ipsa aliquando superest BOHN. p. 19. tum luteum corpus VATER *gravid. app.* n. 17. Quæ ego vidi, eorum aliqua uno alterove anno ab ultimo partu superfuisse necesse est; uti duobus annis a partu superstitia, pallida, designantur epicriticulis *Santorini. obs. anat.* c. XI. n. 15. Pro his autem, quæ consumuntur, nova sensim recrescunt *Valins.* c. IX. n. 5. pauca simul, & lente. Ita in mure post abortum septem nova renasci vidit IDEM c. 5. n. 5.

& in prægnante capra novum subcrecere IB. n. 4. & cum majoribus minora in equa simul adesse c. IV. n. 1. Videtur cum istis consentire observationes *Graaf* II. p. 312.

Numerus incertus est. In subus undecini, & ad viginti usque vidit *Valisnerius*, plura nempe. quam fetus ib. n. 14. uti sex in sele pro quatuor fetusibus c. 5. n. 4. tum *Malpighii* p. 31. & plura vidisse testis est, quam fetus fuerint, & *Graafius* p. 308. In cane aliquando tot quot fetus *Valisn.* c. IV. n. 21. quinque nempe, & in ove n. 28. c. IV. sub finem, & in cane pariter *Histib.* I. c. p. 17. In ove prægnante, duo, VAL. c. II. n. 24. & in universum in multiparis numerosa, in pauciparis, & in femina imprimis pauca, & in istis, quantum video solitaria sunt. Non quidem definiti potest, tot omnino esse quot fetus; quam legem *Peyer* ad *Murai.* p. 414. 415. & *Keil.* p. 110. habent ex *Graafio* p. 308. ortam. Sed numerus, quo lutea corpora excedunt, referri potest ad eos casus, per quos nunquam ova destruuntur, aut in abdomen effusa evanescunt *Drahen.* de sem. mul. n. 25. Vide mecum sentientem *Verheyenium* II. p. 312. per experimenta in cuniculis capta.

(15) Ex his vocibus adparet, *Praeceptorum* a *Malpighii* sententia non alienum esse. Is nempe ova, vulgo dicta non pro veris ovis habuit p. 32. uti neque *Valisnerius* c. 9. n. 9. sed pro organis secretoriis, & plures vesiculas credidit in unum luteum corpus assumi, cum maturum idem ovarium

& eo major pro sphaerulae portione, quo animal longius a conceptione distat, eo minor, quo instat propior. Haec ipsa cupula cum sphaerula

in

rium pene totum occupet, tuncque vesiculae fere evanescent p. 32. VALISNERI c. IX. n. 7. verum autem, & genitale ovum contineri in papilla rotundum, ut MALPIGHIUS credit p. 31. milio aequale p. 32. 33. id sensum erumpere putat IDEM ex protuberante papilla, a carnis fibris extensa, per hiantem sulcum, & a reliquo ovario pene dissoluta p. 33. & aperta ante ovi exitum VALISN. C. p. n. 6. qualia etiam in muribus vidit VALISNERI C. V. n. 8. Luteum vero corpus filtrare pro ovulo, quod ex eo prodit, succos, quos vascula ovi reorbeant MALP. p. 32. Similia fere BERGERUS habet p. 458. Aldie VALISNERIUS, cum succum prius in vesiculis praeparari, praeditis villosa fabrica vasculosa, qualis in intestinis est c. IV. n. 3. & eundem succum in intestinorum similibus rubulis lutei corporis secundo deputari c. IX. n. 16. tum de mum ferum alere. Eadem sententia Santorino est, & Morgagno Adv. anat. IV. n. 28. p. 51. qui tamen a Malpighio diversum sunt, quod ovum verum in luteo corpore profiteantur se nunquam in tot experimentis vidisse, crebant tamen in centro corporis lutei esse Valinf. c. IX. n. 17. nimis forte tenerum, ac pellucens, quam ut sub oculos carat integram IB. sub finem. Sed etiam Graafii experimenta consentiunt, cum fateatur ovum in tubis cuniculorum decipulo, quam in ovario minus reperi p. 307. & in T. XXVI. f. 1. collata cum T. XXV. & nullibi ovum dicat se folliculo circumdatum vidisse. Paitonus denique fusc. pro Malpighio dixit Disc. III.

Qui vero ante Malpighium scripserunt, & recentiores plerique, non invisibile aliquid ovum, ut Valisnerius, neque minutum, & a vesiculis diversum, ut Malpighius, sed ipsam vulgo notam vesiculam ovarii aliquam calyce comprehendere credunt, ipsumque corpus luteum esse quidem filtrum, quod succos pro ovo praeparat Bohn. p. 19. vi tamen comprimentibus fibrarum vasa constringere, quae ovum alebant, ut marcido periculo spoote de labatur Dralincourt. Perriob. 13. Tannry Ip. 53. 56. 52. Bartholinus spec. anat. p. 112. Peyer merycol. p. 49. Huius sententiae auctores dixi not. 5. Bianchus praeterea, quod passim vel videtur Praeceptor, corpus luteum in placentam abire credidit p. 49. valde praeter veri speciem, cum in ovario maneat hinc calycem a corpore luteo diversum fingere cogitur p. 47.

In obscurissimis quaestionibus, de lite quidem Valisnerii cum Malpighio nihil definitio, cum verum, & ab omni hydatide diversum ovum nondum viderim, nisi forte D. VVEYGANDI observatio in phocaena facta pro Malpighio definitur, ibi enim ova, semini papaveris aequalia, ex ovario per foramen membranae externae ab auctore expressa leguntur Brisson. suppl. IV. p. 53. Pro corpore luteo vero contra ova vulgo dicta multa militent, quae dicuntur ad DCLXX. not. 14. ut omnino credam, certo tempore in vesicula una, ut Santorinus, vel pluribus, in medio liquido generari corpus luteum, tunc vesicularum munere functarum formam deservi, in luteo vero corpore subnasci verum ovum, in quo sedes futura est

in uterum delata, excrefcit ibi, abique ovum in amnion, & chorion [16], aqua plenas, ita, ut fetus non in cupula, fed in expanfa fphaerula fedeat; liquor vero contentus, tenuior equidem albumine, perinde tamen ad ignem cogitur.

Binis) Quae feperari poffunt. Earum exterior in chorion fit, interior in amnion: cupula vero fit in placentam, quae ex ipfo ovo nafcitur, neque uteri productio eft, licet in eo crefcat. 1726. Semen denique in medio ovulo haeret, cinctum his membranis, & in infantem formatur.

Parva) Minima in puella tenera (17), fed ita, ut poffint demonftrari.

Vieta) Femellis tum brutis, tum humanis ovaria pereunt (18): viriles vero testes nunquam delentur. Nempe NATURA aetatem ftatuit, poft quam nulla femina conciperet, pro maribus autem nullum ne effociffimis quidem certum tempus fancivit, quo elapfo generare nequeant. Britannus ille longaevidiffimus [19] centum & viginti annos natus adultarii reus fuit, & coram tribunale debuit refpondere, & non diu ante id

eft homuncionis. Ita fere *Santorinus* p. 222. & utrinque *Graaf*, p. 230. & *Malpighius* „ ovum materiem effe, ex qua forte corpus luteum excitetur p. 37. Vide mire contentientia experimenta *Graaf* c. 17.

- (16) Ita olim *Graaf*, p. 278. *Drelin-court*, de hum. fet. membr. de fem. mul. n. 7. 12. de conc. *Pericb*. 34. *Sovammerdam*, prodr. p. 20. *Kerkring*, ad T. I. *Bohn*, p. 22. Sed inferius plura fequuntur.

- (17) Vesiculas in fetibus murinis reperit *Valisneri* c. 5. n. 5. 9. & in minutis muribus c. 5. n. 8. In fetu vituli *Harder*, *apiar*, *obs*. n. 8. In recens natis *Malpighius* p. 32. In cane ante biduum nata *Valisneri* c. IV. n. 18. In vitulis 4. 5. hebdomadarum magna, & nihilo minoram quam in vacca *Leewenboeck exper.* & cont. II. p. 174. In agnis teneris *Sbaragli* p. 490. In agno trimestri conspicuae *Valisneri* c. 3. n. 25. & in fve tenerae c. 3. n. 16. In fetu humano recens edito *Peyerus* vidit *ovare*, p. 100. in quinquenni virgine

conspicuae ova *Valisneri* c. 5. n. 22. & in octenni *obs*. 2. & tredecenni *Harder*, *apiar*, *obs*. n. 77. Non ergo recte *Bohnus* in junioribus vesiculas minimas effe p. 3. & fensim augeri per aetatem: neque *Nigrifolius*, qui sub fecunditate demum tempora ait apparere p. 81.

- (18) In femina quidem minuuntur, indurantur not. 4. *Sbaragli* in anno fa vacca ita non deieri ait, ut majora fint quam in vitula p. 419. & de vesiculis idem dicit p. 490. & corporum luteorum in vitula tenuia vestigia vidit *Valisneri* c. 5. n. 24. Gallinis autem utique tota evanescunt nvaria *Graaf*, p. 247. *Harvei*, p. 8. & uterus p. 24. Rationem diverfitatis exposuit *Tanvry*. viviparorum enim ovaria propriam carnem habent, ovaria oviparorum pene meri sunt racemi ovorum, ut nihil superfit istis destructis. Ita piscibus & lacteae vesiculae, & ovaria poft coitus tempus perfectae inania sunt *Harvei de gener*, p. 7. & in vipetis *Baldus Angelus* p. 41.

- (19) DCLVIII.

id tempus prolem generaverat, quantum quidem ex humana fide constare potest.

Veneris] Sive per ludibria infomniorum (20), sive per venerem naturae lege exercitam. Homines enim utriusque sexus, secus, quam bruta animalia, in somniis eadem tentigine adficiuntur, quam per vigiliis sentiunt, & perinde semen frugiferum viri ejiciunt, ovaque sua ex ovariis mulieres, uti in robusta, & legitima venere.

Emineant) Hae sunt mirabiles observationes GRAAFII [21]. Femella cuniculi ad marem admissa fere certo concipit, ut raro omnino fallat, & quatuor quidem, vel quinque fetus ex uno coitu suscipit. Quot fetus concepit, tot post coitum bullae in ovario prominent, quod certum est ex plurimorum experimentorum consensu. Hae bullae crassescientes emergunt supra ovarii superficiem, elevant ambeuntem membranam,

- (20) Argumentum urserunt varii contra ovorum defensores, gallinas nempe, & anseres, & perdes (Aristot. de gener. anim. L. III. c. 1.) etiam virgines bistor. anim. L. VI. c. 2. ova subventanea parere, feminas humanas minime Vogli c. 2. & fule Sbaragli. Verum recte Valisnerius c. 20. n. 6. gallinarum ova perfecta in ovario esse, feminarum ova post conceptum demum forte nasci, & solvi ex luteo corpore: & rara esse in feminis, quae uniparae sint, & aegerime demum obsevari c. 18. n. 20. Deinde, si fides auctoribus, etiam feminae varii temporibus ova deposuerunt, non impraegnata solum, quae inferius dicuntur, sed adfinia subventaneis. Ita KERKRINGIUS fieri credit referentibus etiam virginibus antrobop. p. 3. DRELCOURT. perioch. 19. & ova cum mensibus egesta GRAMANNUS habet in epist. de ovo: GOVEY ex sola voluptate delabi in uterum, ibique fecundari, ut etiam a clystere irritatae aliquando vesiculas peterint, scribit p. 76. 77. in versione D. Hofmanni, PAITONUS fere eadem ratione ova matura absque semine masculo de

ovario solvi, inque uterum descendere credit Discorsi IV. p. 82. 83. Virgo lascivior ovum peperit cum mensibus BRENDL. de omb. p. 36. Bullula clara a femina in pollutione excidit DIEMER-BROECK p. 134.

- (21) C. 26. centum vero cuniculos, & quadraginta oves secuit p. 367. Nempe hora vigesima quarta ovarum fecundati folliculi opaci sunt, & diluti rubri, [intelligit corpora lutea] & papilla incipit emergere. Vigesima septima, hora tubam ovarium amplexam, papillas manifestas, liquorem stillantes vidit. Quinquaginta horis manifestius in folliculis glandulosam materiem, caveamque adparere T. 25. Z. Post tria nycthemera papillare tuberculum glandulosum perforatum, & in oviductu ova minima, genita tamen membrana cincta. Post quatuor dies ova haec ulterius provoluta versus medias tubas &c. Quae omnia cum VALISNERIANIS appime consentiunt. Caeterum VV. LANGLEY similia cum cuniculis experimenta fecerat, & exstabat codex observationum SCHRAADERO teste in obs.

nam, eamque dilatant, donec ultimo bulla per foramen membranae ex ovario prodeat, & extus emineat, arctata intus, & ad calycem adhuc haerens (22); tunc vero actione tubae Fallopianae deglutitur, fertur in uterum, & fit in ovum impraegnatum, nisi tale prius fuerit, & relinquit in ovarii substantia cicatricem, quae, coalescente membrana ovarii, sensim evanescit. Hoc nunc admirationem meretur, quod hoc corpusculum de ovario separari possit, cum tamen totum ovarium ambeatur membrana (21), nihilo minus densa, quam faciei epidermis. Deinde, quo modo exeat, quaeri potest. Verum etiam alibi leges naturae adeo admirabiles esse novimus, ut nihil addere possimus de ingenio. Tota medicina frustra explicaret vires ad conceptum, alimentum, aut partum fetus: nihil certe promoveret. Verum experiendo leges invenit, quae omni hypothese repugnant. Homines entia, & eorum modos non intelligunt, uti CREATOR intelligit, neque a prima origine rebus adfuerunt, & tamen quae sunt superbia, ubique definire sustinent. Emite fetam gallinam, sanam, vegetam, inspicite uterum: videbitis ovarium, sive vitellarium, quod lumbis adpensum est, plenum luteis corporibus sorte triginta; in eorum minimis solum fere (24), luteum corpus adparet, abique ullo pene bullulae vestigio, quae in centro

(22) Non habet GRAAFIUS, neque ovum vidit, nisi in tuba.

(23) Ex argumentis est, quae contra ova proponuntur a DÜVERNEYO in ZOD. GALL. l.c. MERYO *bist. de l'Acad.* 1701. p. 48. seqq. LA-MYO, & alius. Verum multa responderi possunt. Fissurae enim minimae sensim dilatari possunt, uti vasa dilatantur, quae, destinata vaporis, sanguinem transmutate debent, ab urgente ovulo, & contra naturalem, sed minimum porum nitente. Ita DRE-LINCOURTIUS „ova sensim membranam testis dilatare, non rumpere *de semin. mulieb.* n. 13. & omnino lego „vesiculam magnam, eminentem, ita intumuisse, ut membranam ovarii pene dirupuerit, eaque adtracta dissiluerit E. N. C. Dec. II. ann. 9. obs. 214. Et frustra certe negatur membranam ovarii pro ovulo fin-

di posse, quam infinita exempla docent omnino fissam reperiri not. 29. Ita etiam in ranis membrana communis ovarium continet, quas tamen nemo dubitat ova parere VALINS. c. XIX. n. 8. conf. PAITONI *Diff.* III. p. 14. tum in raiis, canibus, piscibus LITTRE *Mem. de l'Acad.* 1701. p. 146.

(24) GRAAF. p. 292. omnino ait solum albumen continere, quae inter ova minora sunt. Sed idem magis serio p. 245. post HARVEJUM p. 7. solo vitello ait consistere: & omnino in majusculis gallinarum ovis ita reperiri. Ita in struthione se habere PARISINI auctores sunt. Particulas tamen albuminosas in vitellis ovario innexis mistas adesse, etiam HARVEJUS auctor est p. 102. cum coacti in lamellas abeant.

tro latet: majora vero habent vitellum (25), ex cujus centro albumen eminet, super utrumque autem, & vitellum, & albumen membrana se expandit. Saepe triginta hujusmodi ova adfunt. Omnia autem ova, tum quae ab exitu remotissima sunt, tum quae proxima, una membrana communi involvuntur: quae a subnascente ovo ita extenditur, ut exituro vitello aperta iter concedat: quomodo fiat? quaeritis. Lex naturae est. Hi vitelli ex centro primum [26], deinde sensim omnes ex ovario promoveantur. Primum in eo ovo, quod tubae proximum imminet, & inter reliqua magnitudine eminet, nascitur ex medio vitello corpus [27] binis membranis testum, nempe albumen, id cum incremento ovi emergit, & circa calycem extenditur, fit in ovum, albumine constans, & vitello, quod in tuba Fallopiana cortice duro cretaceo (28) circumfunditur. Ergo omnino extra dubium est, legem in animalibus oviparis sanctam esse, ut omnia ova ejusdem ovarii una membrana fortissime coerceantur, neque eo minus omnia, sed fusa singula tempore, in tubam exeant per membranam non laesam, sed dilatam: sive demum gallina marem admisit, sive abstinerit.

Fetu)

(25) Non habent, omnibus fere consentientibus.

(26) GRAAF. p. 245. confer. T. XVIII. ubi centralia ova minora, in ambitu vero majora pinguntur: in columbis sola duo ova perfecta reperiri, cum duo tantum pariant, reliqua minora esse. In Rata, COLLINS T. XLIII. pastinaca HARVEI p. 6. & in aliis piscibus magna, parvaque ova in raecum congregantur COLLINS p. 657.

(27) Nondum invenio. Solum vitellum exire, & membranam suam, quae tamen totum non ambit, calycis nomine in ovario relinquere GRAAFIUS ait p. 246.

(28) In utero. Haec calx accidentaliter est, potestque abesse ab ovis. Comorae gallinae fere solum animalculis palutibus vivunt, tunc

ova absque teste ponunt: BRUKMANN. *epist. item.* p. 98. Aliquando etiam nostrates mollia ova pariunt HARVEI. *de gener.* p. 28.

(29) *Cicatriedum, in texto* Cum minime desint, qui etiam foramen in ovario negent, ut DUVERNEYUS senior, & LAMBIUS, & perfricta fronte SBARAGLI p. 203. & fateatur se nunquam vidisse VERHEYEN II. p. 316. 317. &c. rem istam uberius visum est proponere. Cerum est ante conceptum, & turgescen- tiam corporis lutei nulla rimam adparere GRAAF p. 268. SANTORINUS p. 223. [de virginibus] & TAUVRY p. 10. (de non impraegnatis), campae rimam, postquam evata est, sensum iterum evanescere, neque semper perinde conspicuum esse SANTORINUS p. 225. neque debet.

Fœtu) Hujusmodi casus in EPHEMERIDIBUS GERMANICIS, ACTIS PARISINIS, & BRITANNICIS passim extant descripti. Feminae fuerunt, quae conceperunt, & utero feliciter gesserunt, passae sunt tormina naturalia in partum exitura; & diu cum his conatibus absque spe luctatae, cum neque obstetrix, neque vir obstetricius, quidquam in utero reperi-

debere non abuti, ut multi solent, vagis illis, & subcoeruleis ovarii fissuris, GRAAFIO dictis. p. 125. &c. nimis copiosis, quam ut omnes ovum transmiserint MERY *bist. de l'acad.* 1701. p. 50. cum etiam in uniparis plurimas reperiit MOEBIUS *diff. cit.* n. 1. eili multiparas inde agnoscere velit LIEUTAUD p. 164. & fœtum numerum BLANKARD, & LITTE. 1702. p. 181. Verum nihilo incertius est, dum tomet a coitu luteum corpus, sensim, & una, lanuina post alteram secedente, SANTORIN. p. 124. in virgine, solvi membranam ovarii, quam corpus luteum turgens diducit SANTORINUS *ijstor.* n. 24. ut in vaccis etiam adtenuationem membranae ovarii DUVERNEYUS videtur *Mem. de l'Acad.* 1701. p. 241. & nasci foramen in apice papillae MALPIGHII p. 32. VALISNER c. V. n. 4. in capra, in cane vero c. IV. n. 10. & sub finem, tum GOELIKE l. c. in felle VAL. c. 5. n. 3. in vulpe ID. in ove GRAAF. T. IX. f. 2. &c. & VALISNERI c. 3. n. 24. 16. in vacca minimum & invisibile, sed ut tamen liquorem pressum emittit VALISN. c. 3. n. 7. manifestum vero, & lunatum apud DUVERNEI p. 243. 344. *Comm. Paris.* a 1701. f. 3. 6. 1. valvula ibi aliquando praeditum p. 245. GRAAFIO etiam vilum p. 168. & HOBOKENO f. 2. rugis radiatis circumscriptum, in lepore vero VVALDSCHMIDIO dictam, &

NENTERO *physiol.* p. 320. Ergo ubique, & in omni animali, modo exiguum, modo non minimam fissuram apparere, constat, quae in cavitatem corporis lutei ducit. Hanc fissuram, & subjectam cavitatem plerumque in mulieribus viderunt VVERFFER *de cicat.* p. 124. SLADUS ex RUYSCHIO in *At. Hist. ann.* II. n. 4. optime, & apud *Diermerbroeck* p. 135. & in *Bibl. Mang.* p. 550. Berger. p. 457. Ruyfcb. *Thef.* VI. n. 33. Adv. l. n. 2. *Thef.* XI. n. 20. *Littre bist. de l'acad.* 1705. obs. 7. & an. 1701. p. 324. manifestissime, & an. 1702. p. 281. *Nigrifol.* p. 22. *Sarracenus* apud *Foglium Goelike* apud *Schurig. sylleps.* p. 71. & ex proprio experimento p. 73. *Douglas abridgm.* IV. p. 115, siue tunc pridem foramen adfuerit, ab ovo tantum dilatatum *Hartschocker. fuit. des. conjec.* p. 112. *Tauvry* p. 58. siue ab ovo urgente formetur, quod minus probabile, *Littre* tamen placuit *Mem. de l'acad.* 1701. p. 145. & *Körkringio*, & *Elstolzio*. In cane *Valisnerius* praeter majus foramen minora, lateraliter vidit, sphincterulis quasi circumdata c. 4. n. 7. 10. qualem etiam majori adscribit. In femina *Suamnerdam* apud *Schredgrum* in *praef.* cicatricem etiam, sub ea corpus luteum vidit. Cl. vero *Noortvuyk* foveolam quidem rugosam reperit, sed poro quodam docentem ad tuberculum prominens, quod lateraliter a cicatrícula distabat, p. 8. T. IV. f. 4. in

reperiet, misere perierunt. Incisum abdomen est, & repertus perfectus novimestris fetus, qui vel in ovario esset [30], vel in tuba [31], vel in

in cuius basi fissura esset *ib.* cum vertex non perforaretur. Deinde eadem avaritas lente minuitur *Ruyfch. Adv. Dec. III. u. 4.* ipso tempore imprægnationis, ut aliquando evanescat, aperto foramine, sed collapsio *Valis.* c. 3. n. 22. [in ove] & semper, si *Valisnerio* fides, cum tempore deleantur c. XI. n. 6. qui omnes cicatriculas præter naturam esse docet. Ita etiam *Taurvry* in femina visu difficiles esse facit p. 34. nullasque in multipara repertas, lego in *Breil.* 1733. m. Jan. Saepè tamen diu superstes est cictricula *Santorino* teste p. 225. etiam a partu p. 19. & in puerpera *VVefferus* pili capax foramen vidit, & in puerpera pariter *Douglas*, post duos vero anno *Santorinus* c. XI. n. 15. In vaccis se nilunari figura conspicua foramina pingit *Duvernoy* l. c. f. 6. 8. & semper reperiri *Littrius* auctor est 1701. p. 146. & *Lieutaud.* p. 162. Vidit etiam cavitates, ubi ova fuerunt *Svammerdamius* prodr. p. 29. & *Peyer. exerc.* p. 78. & *Golicke* apud *Schuric.* p. 30. & pingit ex femina *Trevv. Comm. Lit.* 1735. n. 29. T. IV. f. 11. Ego, secus quam *Valisnerius*, saepe & magnis a partu intervallis reperi, neque tamen perpetuo. Nam remota causa extendente, ut alibi solet fieri, ipsa vicinarum partium pressio minutulum, necne resistentem, hiatus perpetuo minuit, ut primo membrana tenera caveam corporis lutei protegat, & ipsa denique ea cavitas deleatur.

- (30) Exempla satis rara sunt. *Littrius* in ovo humano, adhuc calyce incluso, ferum satis perfectum, eum funiculo umbilicali vidit *Mém. de l'Acad.* 1701. p. 147. sed huic hi-

storiae *Santorinus* parum tribuit, cum *Valisnerius* c. XI. u. 7. Fetus in ovario exemplum video citari ex *Journ. de médecine* an. 1663. *Valisner.* c. 17. n. 21. In suis ovario fetus putrefactus *AB. M. Balb.* 1699. p. 47. In ovarii stearomate non pili solum, quod nihil demonstrat, sed dentes *Phil. Coll.* 2. & du *Hamel bist. acad.* p. 265. & ossa præterea erant similia. *Sampson Phil. Coll.* 1. 2. *Tylon* apud *Grevv. cotal. mus.* p. 8. aut cum dente alveus *Phil. trans. abr.* IV. p. 110. aut dentes soli *Ruyfch. Aed.* III. p. 6. T. 2. f. 4. 5. *adv.* l. n. 2. aut denique caput cum dentibus *Duvernoy* apud *Vannette* p. 253. Ex rupto ovario effusus est, quem *Riolanus* descripsit, quinque uncias longus p. 182. & apud *Straussium*, & alter, quem descripsit *D. de S. Maurice* apud *Blegny ann.* IV. V. m. Jan. *Phil. trans.* n. 150. qui idem videtur citari a *Böttgero* diss. de fetu præconcepto. p. 7. & aliud exemplum *Vissus* habet apud *Mangatum theatr.* II. p. 140. aliud, *Nours* fetus ex ovario elapsi, & per rectum intestinum excreti *Phil. trans.* n. 416. Huc etiam historiam suam refert *Bianchus* p. 169. sed ex ovario produsse non liquet. Mola denique, nempe carnosum pene pollicare corpus, in ovario feminae apud *Littrius* describitur *bist. de l'Acad.* 1703. obs. 14. & moles carnea, & ossa, & cartilaginea apud *Mulebacher* in epist. ad *Lancisium*.

- (31) Vide DCLXVIII.

- (32) Huius modi exempla innumera. fere reperio Fetus absque læsione uteri intrer uterum, & rectum intestinum sedens exiit apud *Mongenis*

in ipsa cavea abdominis (31), ut tamen placenta sua ad ovarium adhereret, cum interim uterus integer, & purus, & inanis esset. Naturalis autem parius fit, quando ovum in uterum fertur, & in eo adolescit.

M 2

§. DCLXX.

conis It. III. p. 457. Fetus maturus in ventre materno, hepaticus, placenta ad lumbos posita, utero tubisque integris *Hist. de l'Acad. 1716. n. 4. Santorini* fetum per 23. annos gestatum, subsequens conceptus videtur demonstrare non in utero fuisse. Fetus Musciponaeus triginta annis gestatus, pene lapideus, pariter integro utero in abdomen effusus fuit v. *Straussii*, & *Lau- schneri* descriptionem p. 1. sede, parum tribuit *Patinus* ad *Bartb. Epist. Cent. III. n. 82.* & omnis fides derogatur *Cent. IV. n. 51. Sanguerdus* etiam historiam *Dolensei* excusat. Fetus post quindecim etiam annos gestatus in hypogastrio, chorio suo ad mesenterium adnatus, apud *Blanchum* citatur p. 164. forte idem quem dicit *Roubaux. opus. filosof. VI.* & addit ovario coniunctum fuisse. *Orthanius* etiam ille fetus 46. annos in sacco fuit, utero adnato. Aliud exemplum geminorum in tumore ad uterum, sed integrum, adnato, post aliquot a conceptu annos repertorum est, in *E. N. C. Dec. II. ann. 4. obs. 22.* Aliud *Courtial* habet fetus integro utero, & ovarius in abdomen expulsi. Fetus in abdomine excisus ex viva matre apud *Amellum* exstat. Hue *Cypriani*, fetus pertinet, quem aegre tubis tribuo. Fetum etiam excisum ex abdomine, placenta sua ad tubam *Fallopianae* adnatum, recenset *Cl. Triceni. obs. p. 64. Ex F. Tertio de Lana* historiam fetus.

ex ventre exempti *Valisnerius* habet, quem credit ex tuba excisum, verum non liquet c. VI. n. 16. in genere in his graviatibus ventralibus, & solis, *Bianchi* caesaream operationem laudat. *Tolotana* mulier, quae 27. annis fetum in abdomine gestavit, notissima historia est, quam *Peyerus* habet *exerc. p. 79. 114. & Phil. tr. abr. III. p. 217. & Connor. diss. med. phys. p. 56.* Sed is ex utero ulcere effusus fuerat *Blegny* in *propr. tract.* neque adeo huc pertinet. Fetum suum, per anum extractum, in tuba etiam vel ovario sedisse credit *Matris Mem. de l'Acad. 1702. p. 313.* sed nullo, credo, certo fundamento nixus. Fetus canini, superfetatione geniti, in abdomen effusi, exiles *Phil. trans. abr. II. p. 305.* ibidem agnorum, & leporum similes historiae habentur n. 302. ovilli vero fetus *Breil. 1721. M. Nov.* tum fusus apud *Vater Grav. appar. n. 7.* Prope scrophae hepar tumor vilcidus, in quo fetus corruptus *Alt. Baltb. 1699. p. 79.* Lepuiculi *Rommeli* ni vulgo noti sunt, sed dubia fides est; alia historia exstat in *Comm. Nor. 1731. hebd. 27.* Hos fetus, quotquot ex utero rupto, aut tuba, aut ovario, fractis non sunt elapsi, omnes ex ovo generatos fuisse videtur, quod ex ovario, per aliquod caecae forte, aut aberrantis tubae vitium, in abdomen elapsum, a vicinis vasis nutritum fuerit.

§. DCLXX.

Demonstrationem credo dari posse. Sumatur maxima inter aves magis parabiles, anser, aut cygnus, sanus, vegetus, in aetate ad venetatem sufficiente. In his avibus, olim ARISTOTELE docente, ab eo tempore vero FABRICIO, HARVEIO, MALPIGHIO, & BELLINO, sub pulmone machina oblonga sedet, figurae vix determinatae, quam multae inter linguas modernas vocant *EyerstoK* (1). Huic circumponuntur tubercula numerosa, & omnia denique una communi membrana ambiuntur. Haec tubercula ova sunt, quorum aliqua majora sunt, & magis maturata, alia minus. Sed inprimis eo tempore vitellus vastus reperitur, cum initio bullae liquore plenae. Hoc nunc ovum est, cujus fabrica ex corpore luteo constat, quod in infundibulo in vitellum abit, & ex bullula in centro posita, quae se ad omnem circumferentiam sensim expandit, & in albumen abit. Id ovum, quod haecenus descripsi, manet in infundibulo aliquandiu, extra vitellum, & fovetur: vitellus interim parum crescit, albumen autem adeo velocia incrementa capit, ut intra breve tempus totus vitellus in albumine sepeliatur. Nunc ovum perfectum est, sed molle haecenus, si enim gallinam in hoc stadio aperueris, reperies duas membranas exteriores, deinde in centro, ad obtulum-angulum, vitellum sedentem, cui albumen circumfunditur. In centro vitelli sacculus colliquamenti haeret, valde exiguus, qui in amnion, & chorion, abit, vitellus autem in placentam, ex qua vasa umbilicalia veniunt. In centro denique sacci colliquamenti pullus est. Haec nunc omnia per singulas horas, accurate observavit MALPIGHIVS. Sed humana femina ovum quidem nullum ponit, quod corticem habeat: neque enim testa ad ovum pertinet, & unice cavet, ne ovum, dum extra matrem incubatione fovetur, vel a matris pondere, vel a propria mole elidatur aut laedatur. Neque cortex [2] in ovario adfuit, sed in uropygio generatur,

(1) Ovarium HARVEIVS describit *E-xere*. 3. in lumbis situm, proximè renes, fundamento laxo, posito, fungoso p. 8. In eo vitelli variae magnitudinis sunt p. 6. ab-que albumine p. 7. cum propria membrana, super quam alteram, dom separantur, ab ovario accipiunt *H.* quae ipsa delabente vitello in ovario manet cum vasis suis, est-que calyx ille supra dictus GRAAF. p. 147. Albumen autem ex utero illius secretum, & circumdat vi-

tellum BELLIN. *de motu cordis* p. 53. HARVEI p. 23. 25. etiam in piscibus COLLINS p. 659. In ute-ro etiam duro cortice obducitur Harv. p. 18. qui tamen in aere libero magis indurescit p. 19. or-tum autem non ducit a renibus, neque cum urina advenit, aut excrementis pariter obducit p. 82. et si id probabile videatur. Horum simillima adducit FABER ad HER-NANDEZ p. 762.

(2) Haec celeberrima quaestio navio fusus

neratur. ibi enim bursula est, creta plena, quae circa ovum ibi depositum undique adfundit gypseam materiem, & ipsam mollem sexta ante partum horam, sed ab aere continuo in calcariam crustam abituram. Sed ne albumen quidem ad ovi essentiam pertinet, cum a pullo consumatur,

sufusus, & pro dignitate tractanda est.

Primus omnia, etiam vivipara, ex ovo generari *Harveius* dixerat p. 2. & exerc. 61. sed per ovum non intelligebat vesiculas ovarii; verum,, membraneum sacculum,, in quo liquor contineretur, mediusque cresceret fetus. *Empedoclis* ortus animalium ex ovo ab *Aristotela* citatus de gener. anim. L. 1. sub fin. nullo experimento fulcitur. Sed *N. Stenonis*, & *J. van Horne* primi docuerunt, viviparorum testes ovaria esse, & vesiculas, testibus contentas, vera ova. In hanc sententiam inciderant, ex consideratione anatomicas comparatae, quae in omni insecto, pisce, ave, quadrupede, similes sere sphaerulas liquido plenas reperit, in eo sere diversas, quod in viviparis in glandulosa substantia lateant, in oviparis nuda, & absque parenchymate cernuntur. Deinde *Graafius* susus hanc thesiam ornavit in praef. ex epistola ad *Sebaetium* p. 211. tanquam novam ac suam, cum ovula illa viviparorum in apice papillae, deinde in tuba, denique in utero reperisset: ova denique humana, hippocraticorum similia, cum sacculis colliquamenti impraegniatis compararet. Cum hisce viris recentiores sere omnes senserunt, omnia nempe, & ovipara & vivipara animalia ex ovo generari *Drelincourtius* in conceptu de conceptu, & alibi adversus class. 4. &c. *Parisini* in anat. Tigridis, Collis p. 591. *Corn. Constantinus*, *Connor eussg. med. art.* 10. *Nenter* p. 329. *Peyer* apud *Mu-*

valt. p. 421. *Harderus apior.* p. 34. &c. *Verheyen*, *Everhartus* vel *Cosmopolita* p. 4. 32. 433. *Falsyn.* *Mazinus Inst.* p. 211. *le Fevre* in *physiolog.* c. 29. 30. & plerique alii. Verum contra ea ova susse, ab Italis disputatum est, a *Malpighio*, *Sberaglio* septe I. II. tot. *Valisnerio* in I. cit. & Op. omn. II. p. 41. *Foglio*, *Psatono*, tum a *Venetis*, *Meryo*, *Mauriceo* p. 10. *Lamy*, *Duvernio* seniore. Ergo varia objecerunt, falsa aliqua, ad quae supra responsum est DCLXIX. alia veriora: 1. Vesiculas firmiter innexas esse carni ovarii, neque inde absque magno malo, natove ulcere separari posse *Lamy*, *Valisneri* c. 4. n. 1. in equa c. 3. in sue c. IX. n. 8. c. XVIII. n. 15. *Foglio* p. 221. *Mery Comm. Paris.* 1701. *bist.* p. 47. &c. neque unquam ovum ab ovario solubile reperiri *Laewenboeck epist. phys.* p. 209.

2. Ovum multo majus esse, quam ut a tuba recipiatur *Duvernio* *Zod Gall.* ann. II. m. *Mart.* *Laewenboeck experim. & contempl.* p. 28. *anat.* & cont. II. p. 157. *Valisneri* I. c. c. 29. n. 12. *Foglio* &c. Ita namque vaccae avellanae mole ipse *Graafius* pingit, cum tubae angustissimae sint T. XV., & idem de asinae ovis cerasi aequalibus *Valisnerius* c. 4. n. 4. Addit *Valisnerius* ovum *Graafianum* nimis minle esse, quam ut tubam nixu suo dilateret, ubi in uterum dura, & callosa inferiatur.
3. Vesiculas in ovario majores esse, quam ova, quae in tubis, aut utero aliquando reperta sunt, Naturam vero nunquam retrogredi, sed

matur, & unice circumfundatur nascenti animali, ne viginti diebus, quibus incubatur, alimento careat. Totum ergo verum ovum constat fasciculo colliquamenti, & vitello. Neque obscurum est, cur ovum humanum albumine destituitur & cortice. Non corticem habet, quia ovum in molli matris utero loco tuto fovetur: non albumen, quia toto tempore gestationis a matre alitur. Vitellum autem

sed fetum a primo momento conceptionis perpetuo crescere VALISN. c. IX. n. 18. c. X. n. 6., falsumque esse Graafium, cuiusmodi ova in ovario decies quam in tubis majora esse p. 109. T. 16. f. 1. Et urget Leeuwenhoeckius, ova vulgo dicta in ove majora esse, quam conceptus septimi diei anat. & contempl. II. p. 165.

4. *Sbaragli* addit, ova Graafiana non respondere fetuum numero, & pauciparis vaccis numerosiora esse, quam multiparis canibus, felibus, serophis *sepsi*. p. 312. 335.

5. Ova Graafiana non incipere sub tempora veocis, & in vitulo 4. 5. septimanarum aequae, quam in vacca, magna esse Leeuwenhoeck anat. & contempl. II. p. 174. conf. DCLXIX. not. 17. imo minui in praegnantibus *Stenon*. *ast. Hahn*. II. p. 231. *Littre* I. c. p. 383. conf. *Santorinum* p. 222. &c.

6. Sed neque evanescere pro numero fetuum, qui pariuntur, verum in ipsa graviditate omnia una fere, deleri *Valisneri* c. 10. n. 6.

7. Ova viviparorum animalium verorum ovoium omnino dissimilia esse *Sbaragli* p. 289. &c. *Valisn.* c. 18. n. 27.

8. *Papi* & *Voelius* p. 96. obijciunt, nullam rationem dari, quare non uno inira totum ovarium secundetur.

9. *Nabothus*, se saepe ova morbosa, tubas clausas, & similia vidisse in feminis, quae certissime peperissent: ut in gravida tartarea vidit *Sbaragli* p. 191. *Morgagnum* etiam fateri, frequentissime in ovaria, varie morbosa reperire *Adu.* I. p.

35. & VALISNERIUM c. 12. n. 5. ex veneris, ut credit, intermissione, quod quidem innumereabilibus exemplis confirmari video, hydatidum, hydropsis, athoromatum, pilorum, etiam meis non infrequentibus experimentis. Vide dudum *Sbaragli* p. 304. 393. & olim *Riolanum* p. 365.

Non ignoro, quae soleant responderi 1. Nihil difficultius ova viviparorum solvi ab ovario, quam placenta de utero, fructus de petiolo *Graaf*. p. 269. aut vitellus de calyce in oviparis *Berger*. ad *Valisn.* c. 9. n. 6. & omnino hunc in gallinis ovi cum calyce nexum validum esse, quem tamen certum sit abrumpi *Tavury* p. 52. in testudine denique ova in calyce, lia mergi, ut in immaturis nullum foramen appareat *Tavury* p. 38. Et inter vivipara aliqua esse, quae ova perinde, uti in avibus, separata habeant, exemplo erinacei, & porcae *Dionis* p. 283. (sed de istis dubito) eaque aliquando libera etiam in muliere reperi *Sovammerdam prodr.* p. 20. Omnino denique separari posse, cum separata visa sint, & ova ex ovario emeruisse vident *Blasius obs.* anat. L. V. n. 4. & vicinum cicatricis ovum *Duverney juniori comm. parisi.* 1701. p. 245. Sed & lutea corpora iuniora innata ovario esse, maturefcentia solvi,

2. Tubas facile dilatari, etiam lenitatu *Paistonius dist.* II. p. 43. atque adeo ab ovo, vi peristaltica impulsio, superari, Addi potest, rigere forte in coitu tubas, & dilatari, idque valde probabile esse,

tem habet, nempe placentam, & colliquamentum sacculum nempe, amnion. Ergo ovipararum, & vivipararum ovis non aliud discrimen est, quam in albumine alimentario, & defendente testa, quibus viviparae destituuntur: reliqua omnia in utrisque perfecte eadem sunt. Minor

ex dilatatione simbriarum, & accessione ad ovarium. Potro *Tauvryus*, ovum in ovalem figuram fingi posse, sic diametrum minui credit p. 55. Sed etiam in *Chamaeleonte*, evidenter oviparo, oviductus ne setam quidem admittit *Valisnerii oper. T. I. p. 410.*

4. Responderi posset, Ovum abruptum de ovario vasisque nutritiis aliquantum minui, donec ex celeritate corculi aucta, infertae in uterum radicae placentae, alant reddantque liquores, quibus distendatur ovum DCLXXV. not. 9. Sed potest etiam cutis aliqua abscedere, neque absque exemplo est insecta ante metamorphosis suas mole minui.

4. In iis semellis, quae plures fetus pariunt, ova forte per series sensim expediti, neque plura simul adparere, quam necesse sit, uti de luteis corporibus certum est. *Valisnerius* ex sua hypothesis respondet, plures esse in vaccis vesiculas, quod plures in uno corpore luteum absorbantur c. 19. n. 8.

5. Hoc difficile videtur, & hic facile vincunt corpora lutea, quae adeo evidenter sub veneris tempus, & a conceptu tument. Posset tamen *Leewenboeckius* repodni, etiam magnorum, & parvorum piscium, qui certo ovipari sunt, tum adutorum, & juniorum ova eadem mole esse. *Epist. phys. p. 166.* & *Baker p. 159.* idemque de animalibus spermaticis verum esse *Id. ib.* Deinde ego quidem in fetibus, & relictis puellis vesiculas ovarii non reperio conf. *III. Teichmeyer* simile experimentum de *gener. n.*

17. In vaccis vero, & animalibus brevis vitae, ita praecipit est tempus pubescentiae, ut non mirum sit ova recens natorum ab ovis juvencae unius anni parum differre: hinc in iis animalibus, etiam lutea corpora ante tempus veneris adparere DCLXIX. etc.

6. Ova praegnantium aliquantum comprimere, neque idem destrui, nova vero augmenta minus detrimentum facere.

7. Infirmitas est. Piscium enim ova vesicularum similia sunt. Avium autem ova ideo a viviparorum ovis differunt, quod alimentum fetus, nempe vitellum contineant *TAUVRY p. 45.* Ab hydatidibus autem, a quibus negat distingui posse *VOGLI c. I.* vel sola perpetuitate satis distinguuntur.

Ad 8. facile respondeatur, unum tantum maturum esse *VALISNERIUS* autem reponit, in oviparis multa uno coitu ovifecundari, quia nulla ipsis lutea corpora sunt, haec autem in viviparis semper pauca generantur c. 19. n. 6. Plura tamen aliquando uno coitu secundari, dicitur ad *DCXCIV.* & exemplum mirabile *RUYSCHII* habet, massae cum variis artibus egestae, qui pro multis fetibus fulsicerent *Thef. II. off. 1. n. 6.*

Tum ad 9. ea mala, quae reperit *NABOTHUS*, poterunt intra novem graviditatis menses nata fuisse.

Sed rationes, quare in sententiam *VALISNERII*, aut certe *MALPIGHII*, pronior sim, haec sunt. Corpora lutea veneris tempore apparere divi DCLXIX. & ab ovatio manifesto separabilia esse ib.

&c

ror adeo, fuisse claros viros, qui negarent, aliquam inter, ova viviparorum animalium, & oviparorum ova similitudinem intercedere.

§. DCLXXI.

An ovum humanum omnino in uterum feratur, dubitari potest. Certum coim est, tubam ita non continuam ovario esse, ut etiam remota sit, neque videtur tubam ovarium amplecti posse, nisi animam aliquam habeat, quae tubam adfurgere jubeat, ut ovarium amplecti possit (1) Sed id non videtur probabile. Adeoque tota res figmento proxima videtur. Verum philosophus nullum phaenomenon pro impossibili habere debet, nisi quod notae demonstrationi repugnat. Neque nos homines naturam discimus ichnographiam, ex idea faciendo, sed sensim & diligenter observando phaenomena. Gallinae vitellarium ad lumbos haeret, inde vero longe distat uropygium, & infundibulum, quod ova recipere debet, pendulum in cavea abdominis fluitat. Et tamen igne venereo incitata tuba gallinae erigitur, & amplectitur ovarium, atque adplicata resorbet ovum, retinet per dies aliquot, alit, ducitque ad exitum.

& numero fetum proxime respondere not. 14. & certissime foraminis ovarii opponit not. 19. Deinde haec princeps ratio est. Si vesiculam corpus luteum ambit, viderunt GRAAFIANI. Nunc ego juvenio corpus luteum intra vesiculam nasci. Sequitur hoc corpus veneris tempore maturari, adeoque omnino vesiculam praeparare aliquid pro corpore luteo hinc evanescere, quando corpus luteum maturum est, neque immediate fetui inservire. Nempe jam GRAAFIUS vidit, post coitum inter ovi membranas subnasci flavam materiem p. 231. Deinde RUYSCHIIUS coagulatam cinereu o corpus in majori vesicula in ovario adhuc inclusa depingit *Thef. VI. n. 5. T. 4. Adv. L. T. I. f. 2.* & VATERUS repetit de *uteri polyep. n. 5.* „cavum nempe ovum medullare. Denique VALISNERIUS in virgine reperit, in eminenti vesicula intus nasci luteum corpus lunata figura

c. V. o. 16. si recte intelligo. Haec etiam mica forte est, candidior, quam in medio ovi liquore reperit SCHRADER in *praef.* Ipse autem iotra dissectam vesiculam vidit flavum, glandulosum nucleum. Si tamen experimenta, DCLXIX. not. 11. satis firma essent, tunc utique GRAAFIANAM praefeream sententiam. Nunc ad alteram pronior, puto tamen repetenda esse experimenta.

(1) *Coof. DCLXVIII. oor. 21. & DCLXX. 2.* Neque quidquam juverit SBARAGLIUM, si mechanismum adplicatae tubae mious bene explicaverimus, phaenomenon enim demonstratum otium facit explicaturis ratioem phaenomeni. Addit ingeniose TAUVRIUS, omnino rubas oon oportuisse ovarium perpetuo amplecti, ita enim non potuisset eo se adplicare, ubi ovum maturius eminet p. 57. neque nisi ovum, alterumve recipere. Sed alia gravissima obiectio est, quam minime oportet dissimulare.

rum naturalem. Inde nunc certo scimus, NATURAM facere, ut tuba flaccida, remota, se ovario adplicet, inde vero vitellus decidat, neque unquam in abdominis caveam elabatur, quod naturale videtur, sed in fauces tubae perpetuo defluat, quae tamen adeo remota est: nihil enim certius esse potest, quam ovi, nihil morantibus istis difficultatibus, receptio ex ovario in tubam, etsi non negaverim, flaccidis tubis hanc reformationem impossibilem videri.

Oculis. HARVEJUS tubas rigidis suis finibus ad ovaria admotas vidit, & humanum uterum, in quo fimbriae tubarum cum ovario concreverant. Ergo non repugnat naturae, recipi per tubam ovum, & ad uterum descendere. Alia ecce experimenta. In foro porcariorum singulis sabbati diebus, centum forte porcellae castrantur (2) ut eo abundantius ex sanguine pinguescant. Haec operatio est hujus modi. Veterinarius incidit abdomen paulo supra cristam ossis ilium, inserit digitum, tubam adripit cum ovario, educit, eductam adspicit & resecat, reliquum recondit, vulnus confuit, ita effecit, ut nunquam ea porcella utero concipiat, & tamen uterum non attingit. Objicies forte, animal sterilefcere, quod ovaria semen generent (3). Verum si haec ovariorum functio est, quomodo

dissemulare GRAAFIUS & alii not. 20. ad DCLXVIII. viderunt, continuo a coitu tubam ovario non cohaerere, sed aliquo demum a coitu tempore. Tubarum enim adplicationem omnes solemus orgasmo venereo, & irruenti sanguini tribuere. Quae ergo, si nequidem orgasmi tempore admoventur, admoveandi causa est? quae via eo semen advenit, si tuba veneris tempore ovarium non attingit? hanc difficultatem VOGLIUS urfit. Sed omnino experimenta pro tubae a recente coitu ad ovarium adhaesione superare videntur illa pauca contraria, maxime, si integram oviparorum analogam historiam adhibueris. Aves enim ex sola titillatione dorsi absque maris femine ova concipiunt HARVEJ p. 13. qui in Castuario etiam vidit ova concepta ex vi struthionum venere p. 15. & in vetusto pſtaco PARISIINI 1726. bſſ. 2.

(2) DCLXIX. not. 6.

(3) HIPPOCRATES in omnibus scriptis semen muliebre recipit debilius virili *αἶμα γυναικ.* n. 7. sed necessarium &c. ARISTOTELES semen feminis vix ullum concesserat *de gener. anim.* L. I. c. 20. & negaverat humorem libidinosum, quem in semine excernunt, ad conceptum facere *de gener. anim.* L. II. c. 4. Sed fuisse contrarius GALENUS, utique semen in feminis esse contendit, paucius equidem, masculo *de femine* L. I. quae etiam SPHAERI sententia est apud LAERTIUM L. VII. c. 1. & imperfectius *de utilitate part.* L. XIV. c. 10. id per cornua in uterum venire l. eod. & *de utilit. part.* L. XIV. c. 10. & in vidua quadam, crassum cum maximi voluptate, post iritationem pudendi excrementum fuisse L. II. alias per somnum elabi, ad libidinem autem praeteritum facere *de util. part.* L. XIII. p. 11. AVICENNA similimum.

GALE.

modo fit, ut id semen in uterum potius [4], quam in caveam abdominis veniat? Ergo eo redeundum est, CREATOREM sic voluisse, neque aliter rem possibilem concipio, cum adeo manifesto ostium tubae in cavum abdomen pateat, neque tamen ovum in caveam abdominis unquam effundatur: quantum quidem ex observationibus didici. Ergo facis abunde constat, feminam testes suos, ideo natam esse, ut ova praepararent, quae matura, tempore orgasmis venerici, in tubam Fallopianam, ovarium expansis tubis undique, quasi viginti digitis, amplexam absorbeantur, recondantur, & per constrictionem tubae coarctata adigantur in tubam, & in uterum deponantur. Tunc, si in uterum ova descenderint, quando semen masculinum in uterum advenit, coarctato utero ovum in utero manet: nisi hoc semen adfuerit, idem ovum ex corpore feminino sine sensu dilabitur.

. DCLXXII.

GALENICO exemplum citat viduae, quae tacto pudendo vim feminis excreverit FEN. 1. p. 649 COLUMBUS verum semen contra negantem FALLOPIUM se in testibus mulierum vidisse asseverat. p. 246. quod video nuper repetiisse D. VENETTE p. 222. abusum sero vesiculae alicujus turgidioris, & contentam in ovis liquorem semen tenuius esse repetit MAURICEAU p. 10. additque D. de MARCHETTIS, semen ex testibus per quaedam alba vasa in tubas venire p. 45. Inter recentiores CI HENRICI de *veste. femm. mul.* p. 18. li quorem glandularum Nabothi pro semine muliebri habet quod commissum virili fetui continuat VOGLIUS autem semen in testibus muliebribus generari docuit, & e citante D. PAPI SBARAGLI vero & PAITONI *Dysc.* III. p. 14. feminis liquorem spirituosum in testibus credit generari, qui in sanguinem resorbeatur, & ea fere faciat seminis, quae viris suum semen praestat ex DCLVIII. Eadem enim olim GALENO sententia fuerat de *femine* L. I. Deterius ATHENAEUS apud GALENUM de *femine* I. 11. c. 1. & super LEEU. VVENHOECKIUS ovaria omnino

inutiles esse imitationes testium viditum *Epist. phys.* p. 210.

- (4) Ita omnis vetustas „ nullum conceptum fieri, nisi mas & femina eodem tempore semen emisserint ARIST. *hist. anim.* L. X. c. 4. & semen muliebri cum virili misceri, atque ei quasi pro alimento esse GALENUS de *femine* T. I.
- (5) *Propellere, in Textu* Haec maxima difficultas erat, ut ovum reciperetur in tubam. Promoveri facile intelligo fibris circularibus successively contractis, etiam respiratione adjuvante, dum ovarium tubae adherens superne rectum inquit. Ita DRELINCOURT de *conceptu peritoe* 5. 6. 15. REDI vol. VI. p. 262. 263. DIEMERBROECK. p. 134. &c. Io cane. GOELICKE ova matura in ovario, in tuba, in utero denique vidit, etiam in eadem cane. & repetitis experimentis SCHURIG. *Syll. p.* 49. 50. Hoc iter intra triduum a cuniculi se perfici GRAAF. p. 115. VERHEYEN. L. II. p. 118. in ove vero die undecimo ID. In raris ova m. aprili in ovario, majo in oviductu & utero, junio fere in otero, julio in aquam effusa. VALISNERIUS vidit *Opere* T. I. p. 445. Frustra reclamant, nunquam

sc

§ DCLXXII.

Alparebit) Quis unquam crederet, nisi qui vidit, cūfens abdominis feminae gravidæ adeo enormiter distendi posse? Demonstrat autem eventus, quam extensiles membranae sint.

Alienus) Mastratur sexto à partu mense vacca, si unum fetum pepererit, reperies unam in ovario cicatriculam, duas, si duas; & duodecim, omnino, si raro exemplo duodecim ediderit fetus. Deinde vaccam sextam jube mastrari tertio post coitum die, apparebit in ovarii superficie, eminens bullula (1). Ergo eo tempore, quo lascivunt semellae, latens ovulum crescit, tumet, vergit extrosum, dilatat eam, qua ambitur, ovarii membranam: Inferior pars hujus bullae semper crassior est, nempe placenta (2): superior, tenuior, est chorion & amnion. Nunc quomodo fetus isti, qui foramina in ovario reliquerunt, in uterum veniunt? Non alia certe, quam per tubas, via.

Cavo abdominis) In hominibus eandem legem obtinere, discitur ex actis Parisiis (3). Parisiis enim mulier concepit, utero gessit, parturivit, sed in ipsis nixibus perit, aperta est, reperta tuba Fallopiana ovario adnata, & ingens in cavea abdominis fetus.

§ DCLXXIII.

se ovum extra ovarium vidisse. *Leeuwenhoek. ep. phys. p. 296.* Cum in cuniculis ova in robis toties viderit *Graafius*, nuncinque testium adlegaverim. not. 30. 32. ad DCLXIX. Id dubium manet, an totum ovum de ovario migret? Ita vulgo creditur van *Horneo* p. 45. & *Svammerdamio* auctori *prodr. p. 23. Drelincourtio de sem. mulieb. n. 11. 12. & de concept. Perroch. XI. & Graefio epist. ad Schacht. p. 212. & Gouperio introd. & omnis secta Graefi consentit, rumpi nempe de ovo periculosos, maturos, atidos *Drelincourt. de sem. mul. n. 16.* sic ovum delabi, tubaeque recipi. Contrario modo solum fetum in ovo latentem exire *Palisphericus* sentit C. 13. n. 5. & ovi contentum solum, te-*

lito in ovario calyce, ut in gallinis *Ruyssb. Thes. VI. n. 21.* Nuperus denique *Auctor von der natur. ovulum minutum, verum ovum, latere in majori, vulgari vesicula, eam rumpi in conceptu, verius autem ovulum exire proposuit n. 875. 880.* Verum ova humana, masculula, toties reperta undique integra clausaque membranis, & saeculi colliquamenti ovi simillima, satis opinor demonstrant, totum ovum de cortice luteo solvi, & descendere.

- (1) Nempe corpus luteum not. 11. ad DCLXIX.
 (2) Proxime dicitur, ex teneri embryonis annio undique vasa, nempe placentae rudimentum erumpere.
 (3) Conf. not. 30. 32. ad DCLXIX.

§. DCLXXXIII.

Spiritus] Fuerunt inter veteres, qui sedem libidinis venereae in orificio superiori ventriculi, & circa mesenterium lumbosque ponerent. Non male, nam in hominibus a venere exhaustis & in eo ventriculi orificio, & in lumbis vitium accedit, & omnia ibi relaxantur (1).

Inflammatione] In eo statu calor [2] semper adest, tum in maris, tum in feminae genitalibus partibus, omnino inflammatorius, summusque, quem homo ferre posset, ab irruente & agitato sanguine arterioso ortus. Omnis enim coitus & in mare, & in femina, cum inflammatione fit, quae in gangraenam abiret, si diutius duraret. Sed & elementa geniturae masculinae, & ovum muliebri tunc intense calent, & agitantur velocissime: deinde semen maris exit in uterum, & tunc actum est a mare id omne, quod in generatione agit.

Errora-

(1) De deliquis animi: aliisque morbis netvorum e venere conf. DCLVIII.

(2) Qui in glande masculina etiam thermometro potest explorari: sed uti glans & penis, ita clioris sanguine turget, & nymphae GRAAFIO observante p. 144. & vagina demum, quae & ipsa, jam VESALIO docente, turget, penemque fungosa constringit p. 657. RUYSCHE. *adv.* III. n. 4. Totus etiam in coitu uterus ita sanguine inebriatur, ut vel a morte rubeat. Uterus, qui concepit, rubet, major & villosior fit, os hiat RUYSCHE. *Thes.* VI. p. 32. & apud DIEMERBROECHUM VERHEYENIUS II. p. 314. in vacca rubentem vidit a coitu uterum; & in cuniculis hoc signum est cupidinis venereae COSMOPOLITA p. 45. Ipsa denique corpora lutea post conceptum rubent, & villis scabrescunt, DCLXVIII. Sed etiam ante venereum avium uterus insigniter mutatur, & carnosus fit HARVEJUS p. 23. in damis vero crassior *exere.* 66. Aliquando equidem legitimus, uterum a venere non mutatum reperiunt fuisse *Phil. transf. abr.* III. p. 212. sed longius a coitu & post

aliquot, ut videtur, dies.

(3) Haec menstrua sunt, quae canibus, septem diebus fluere ait ARISTOTELES, cum genitalium protuberantione *hist. anim.* L. 6. c. 20. & humor, geniturae similis, quem equae venereae emittunt IB. c. 18. Uterus sub veneris tempore mollescit & fudit humorem albugineum HARVEJ. p. 294. 295. Uterus a coitu secundo plenus humore limpidio RUYSCHE. apud DIEMERBR. & SLADUS in ACT. HAFN. *ann.* II. n. 4. In vacca praegnanter uterus liquore albugineo plenus L. SYLVIVS. In cornu uteri cervicali a conceptu copiosus liquor albugineus LUDOVICI E. N. C. *Dec.* I. *ann.* 8. *obs.* 17. In utero paucis a conceptu diebus, lympham RUYSCHE. apud MANGETUM in *biblioth. anat.* II. p. 550. De vaginae vero, & extremi pudendi liquore spumoso, quo per venerem irrorantur, hic loqui superfedeo, quem vix credibile est in uterum venire.

(4) *Apertius, in Textu*] In recentem, impraegnata muliere os uteri hians RUYSCHE. apud SLADUM, & MANGETUM I. c. Tum in vacca VERHEYEN. II. p. 314.

Irroratum) In omnibus animalibus, quae coitum adpetunt, bullae (5) lentum smegma habentes de inguine stillant, & eo signo de vaccis cognoscitur ad ferendum taurum idoneas esse.

Verum hic theoriae nostrae obponit se HARVEI auctoritas [6], quae nos pene ad scepticismum ducit. Vir iste omni fide dignissimus, & in expe-

- (5) *Papillis*) His omnino videtur abundare organum muliebre. In nymphis papillae SANTORINUS dixit p. 211. in interiori facie vaginae SANTORIN. *obs.* p. 212. Papillas nerveas agminatas, prope vulvae osium PEYERUS habet *obs.* 3. in hymene & rugis SANTORIN. p. 212. ibidem & in osculo uteri *Ruyssb. Thes.* IV. n. 9. Et istae quidem sentium veneris percipiunt. Quas vero papillas Praeceptor ex Morgagni citat *adv.* I. p. 10. IV. p. 45. eae utrique carnes sunt, subcartilagineae, maxime in vetulis, pene conicae, quae agminatae rugas vaginae faciunt, ipso Morgagni teste ita inclinat, ut deorsum aciem convertant, penique resistunt l.c. Hae papillae in duas principes series ordinantur ID. ib. *Garengeot splanchol. ed. nov.* II. p. 58. anteriorem & superiorem majorem, substratam urethrae, dictam *Vesalto* p. 653. 654 & cum palato recte comparatam etiam a C. Stephano L. III. c. 7. uti recte Pinarius vaginam superne magis rugosam dicit p. 99. & Bourdon. p. 119. & Verheyen. p. 146. & Graaf. p. 170. & Santorinus p. 212. Haec ruga sub urethrae osculo protuberat, saepe fissi, & saepe procidit, perque vaginam turpiter eminet. Altera obposita, minor, inferior, ad anum respicit, dicta *Verheyeno*. Vidi etiam duas medias intercedisse. Omnes ad dimidiam vaginam uteri desinunt, & reliqua pars vaginae utero propior, mollioribus & ramosis rugis exaratur, quales pinxit *Verheyen*. T. 17. L. 2. quam iconem contra

Morgagni censuram IV. p. 45. omnino excuso. Sed & ipsae duae columnae emissis transversis jugis varie conjunguntur. Vide iconem meam ad naturam factam. Caeterum per senium adeo non deterruntur, aut per partum, ut *Graaf*. p. 171. aut per coitum ut *Morgagnus* 1. p. 10. *London. phys.* p. 316. certe meis in experimentis, ut in vetustis corporibus pulchritus adpareant. Vaginam utique arctant *Morg.* & sedes sunt voluptatis I. p. 10. certe augent adstrictiorem, ut non male Medici *Uratilactes* inter causam deficientis voluptatis venerae harum rugarum absentiam recentant. Denique dilatationi in partu favent. Hinc in recente puerpera nullae cervicis rugae *Riolan.* p. 366. Sexia a partu septimana nullae in vagina rugae *Barthol. Cont.* I. *bist.* 32. & in collo uteri vaccini rugae, quibus extensis mire dilaturatur ALDES p. 346. Non ignoto passim exempla legi seminarum, quae absque voluptate conceperint *Pecchioli obs.* 45. L. I. *Lenzoni anim.* 32. *Schurig. congress. bist.* p. 81. & p. 308. *Spermatal.* p. 243. ubi multa exempla compilantur. Sed certum experimentum capere difficile est.

- (6) *Harvijus* in damis imprimis semen crassum nunquam repertum *exerc.* 48. 66. p. 226. ex. 67. tum in canibus & cuniculis *exerc.* 67. in quibus consentit *Graafii* observatio p. 305. Negat etiam advenire semen ad ovaria *Schrad.* de *microsc. util.* & plures alii. Porro galli semen & a viae arctate ab utero excludi, & demonstrari alio modo

experimentis primarius, narrat, in adeo numerosis femellis, quas ipse secuit, statim a coitu, nunquam semen in utero reperitum fuisse, tamen equas, damas, cervas, numerosas secuerit, in quas masculi tantam vim

modo imprægnationem peragi, quod multa ova uno coitu fecundentur *Harvius* monet *ex. rc. 5. Taurv* p. 71. Etiam crassam testum mullebrum tunicam contra semen adlegat *Graaf* p. 266. Præterea negant cautum dari, quare semen virile ad tubas veniat *Lanzvverde de gener. molar.* p. 76. Deinde adducuntur a *Bobbio* p. 6. *Taurv*, *Harvejo*, *Rejo*, *Harvii* argumenta repetente *syn. quadr.* p. 37. atretiarum numerosa exempla, quæ oblique immisione penis conceperint, manifesta demonstratione, seminis crassamentum ad conceptionem non necessarium esse. Ita *Corpus in Mundinum* p. 661. 662. ex *Forotivienfi* & *Thoma de Garbo* & *Zabarella*, & *Riolanus* de femina vix specillum admittente p. 197 & de æque angustafete *Sorbat*, *E. N. C. Dec. I. ann. 3. obs. 273.* atque *Paulini Dec. II. obs. IX. post Dec. II. ann. 7. & Schenck. & Mauriceau obs. 835. & Blomichen obs. 13.* ubi necesse fuit membranam incidere ut pareret. Simile exemplum habet la *Motte obs. 243. 244.* Coacta vagina conceptus felix, qui vaginam aperuerit *ID. obs. 341.* Sed & *Harvejus* similia habet p. 268. & *Parisini 1712. biff. 2. & Paulini l. c. Hymene* integro conceptus *E. N. C. Dec. III. ann. 28. obs. 83. 489.* Atretias porro, quæ conceptum *Riolanus* recenset *encbirid.* p. 173. *Zod. Gall. ann. I. p. 173. Ordo Liptienfis* apud *Schæcher*, in *prog. an. 1728.* edito *Ruyfch. obs. ehir. 22.* & ex sua etiam observatione *Schurig. Gynaicol.* p. 166. 168. Vulva vix calami capace femina imprægnata *Waldschmid de val. med. bod. p. 5.* Semiclausa vulva conceptus &

mors, cum parere non posset *Tricou. obs. p. 64. & simile exemplum. Diemerbroeckii.* Imperfecta aërea concepit *AB. Berol. III. n. 1. Alia*, quæ vix denatium admisisset, a patre secundo virgo ex *Nicolo* apud *Marc. Donatum* p. 617. Alia clausa, ita tamen ut menses fluere, concepit *Phil. Transf. Abr. III. p. 216.* Abique immisione conceptus *Zacchias L. X. c. 43. Mauriceau p. 64. obs. 211. 489. Lanzoni anim. 32. Fabricius ab Aquapend. Schurig. sylleps. p. 141.* Infiltrata equa peperit *Harvii* p. 268. *Borellus Cent. IV. obs. 26.* Conceptus per pessaria *Rouffet. Mauriceau obs. 217.* Ex *Leebelto* ex *Novu. de la rep. des ser. 1686.* exemplum citat feminae, quæ concepit, cum vaginam catene plenam haberet *Schellhammerus de part. gener. n. 27.* Porro in papillione tutam liquore plenam esse *Malpighius* observavit ad *Spon.* p. 34. & in vacca uterum muco plenum idem obitaculum præfatare p. 33.

Sed contraria nunc experimenta sequuntur. Semen in utero in brutis semper reperit *Galenus de semine L. I. c. II.* In utero vaccae semen vidit a coitu *Verheyen. II. p. 314. l. p. 135.* In cuniculi tubis 48. horis a Venete semen & animalia *Leenwenboeck. anat. & cont. II. p. 170. 171.* & in matrice 15. minutis a coitu p. 166. in feminae tubis semen *Fallopis* p. 196. b. *Graaf. p. 276. Riolanus p. 179.* In utero vero suspensæ, quæ quarto ante die coiverat, semen invenit *Corpus* p. CXCI. in utero feminae & in tuba *Ruyfchii* *Thof. VI. p. 13. n. 21. Adv. I. n. 1. l. 3. & Poffellus apud Taurv* p. 179. & *Giesfelden. anat. L. IV. c. 2.*

vim feminis injiciunt, ut videatur non posse fieri, ut visum fugiat, si omnino adesset {7}. Sed contraria experimenta RUYSCHII obponit, qui tot praesentibus testibus etiam medicis, in duobus crudelibus casibus seminarum, continuo a venere obtruncatarum, contrarium vidit. In priori historia classarius miles a pulchra meretrice magna industria exoraverat admissionem, post coitum vero miro furore motus, abiciderat miserae carotides. In altera vir adulterum in ipso inhonesto actu cum uxore comprehenderat, & necaverat deprehensam. Cum ergo RUYSCHIIUS jussu magistratus vulnus undique exploraret, vidit, in cavitate uteri, verum muliebre semen, idemque continuo alkohole vini immisum, induratum, una cum utero adservavit, ut hac ipsa die in thesauris Imperatricis Russiae spectabile superstit. Sed neque HARVEJUS aut fallere potuit aut falli, cum certa sit ejus viri ingenuitas, & copia experimentorum, in vastis animalibus captorum. Conciliare {8} adeo oportet contraria ipsius, & RUYSCHII experimenta: nempe HARVEJUS sua pericula fecit

in

c. 2. Addit *Covvperus*, in oposto ad duas vaginas penem bifurcum reperiri *Abr. V. p. 335.* cui add. potest, toti generi oviparorum (pisces exceptis) pro duplici utero duos etiam penes esse. Ergo verum semen ad ovaria venire *Kerkring. anthrop. p. 2. & Collins p. 600. & Covvperus* sentit in introd. & *Valisnieri c. 10. n. 3. Graefius* autem semen quidem ad ovaria non venire in cuniculis, leporibus &c. p. 263. in vaccis vero & ovibus & muliere utique etiam in tubas penetrare posse credit p. 264. & aliquando admittit *Bergerus p. 465*

Sed instans aetate fructores, humorem in puerperis, in tuba reperiri feminis similem *Bartholinus* observante p. 259 & *Santorum c. XI. n. 18.* & hunc humorem impoluisse sotte *Ruyfchius*, adliquescit, ipsum *Ruyfchium* in vetulae hanc mucosam uterini cum semine virili similitudinem admittit. DCLXVIII. not. 9. Verum in ordinario coitu nihil video, quare semen aut omne, aut ex parte, uterum non subeat, maxime si comparaverim vim illam *suffricem* pudendi muliebris, etiam in acu-

bus cum magno seminarum male observatam, & in conceptione a *Galeno* adhibitam de *femine L. I.* Neque mucum credo in alkohole obdlescere & indurari, uti *Ruyfchius* semen ex utero sumtum, & animalcula demum demonstrant semen fuisse, & nimis universalis est organorum marium introductio in feminea in quadrupedibus, avibus, insectis, quam quae frustra sit.

- {7} Comparat o cum seminis demonstrat, extra conceptum semen de pudendis continuo effluere: & omne denique evanescere loci calore & resorbentium venarum efficacia, hinc aliquot post venerem horis non reperiri. Damas autem *Harvejus* ferus a coitu forte incidit, & ob eam rationem uterum reperit inanem, uti tertio die *Brendelius* castellam de *embr. praenat.* p. 38. & *Everhardus* cuniculam uterum semine vacuum videntur habere, aut demum eae damae non conceperant *Dismersbroeck. p. 181.*
- {8} Ut memores sinus adhaerentium contra negantia argumenta maximam efficaciam esse.

in animalibus bifidis, quibus uterus in duo brachia dividitur, & per eam longitudinem semen facile ita dispergi potuit, ut paucissimum in utero reliquum esset: RUYSCHII in mulieribus, quibus unica uteri cavitates est. Pro RUYSCHIO etiam pugnant seminarum experimenta, quae ex hoc unico signo norunt se concepisse, si semen post veniorem de utero non effluerit [9]. Et veterinarii similem observationem conferunt: ii enim, ut equa ex specioso caballo, magno saepe conducto ad unum initum, certo concipiat, habent pro certissimo praesidio, si genitalibus equae, quamprimum caballus deliluit, sirulam frigida plenam superfuderint, ita uterus constringitur, neque semen effluit, nisi pauculum quid, quod diu post coitum elabatur, jam functum officio.

Constrictione] Post conceptum uterus clauditur. Quo momento bruta animalia conceperunt, eo lumbi concidunt, uterus clauditur (10).

Occurrens] Hoc enim temporis momentum pro conceptu opportunissimum est, quo calor in utroque sexu maximus, febrili certe vulgari multo major est: ita enim actuosissima seminis principia etiam magis actuosiora (11) redduntur: tuncque fit conceptio, si principium generale maris in eo momento ovulo occurrerit, atque adeo vis aliqua ex mare ad sacculum colliquamenti penetraverit.

Poros] Ovum femininum oritur ex ultimis finibus capreolorum arterioforum, distributis ad ovaria: ita SVAMMERDAMIUS docet, & post eum RUY-

(9) Animalia omnia concipiunt, si semen retinuerint, & ne unicum, quod eiecerit, *Galenus de semine*. L. I. Semen quae retinet, concepit *Hipp. de genit. & de natur. pueri*. Quando non concepit, semen excidit *de genit. n. 6. Vide Ven. p. 211.* Sed recte *Aristoteles*, non totum semen ad conceptionem necessario retineri *biff. anim. L. X. 3. & l. c. sub fin.* cauteque cautelam repetit *Valisnerius c. 9. n. 2. c. 10. n. 3.* Sufficit enim unicam guttam animalibus praegnantem, ad uterum venire. Idem respondetur ad arretratum histrias.

(10) In erinaceo os uteri a conceptu clauditur *Muralt. Vadem. p. 166.* & in vacca *Faber apud Hernandez p. 617. Severin. in Zootom. p. 297.* & in cervia *I. M. Hofman E. N. C. Cent. X. app. obs. 46.* Uterus

post coitum se contrahit *Arist. biff. anim. L. VII. c. 4. Gal. de semine L. II. c. II.* Signum conceptus os uteri clausum, & iamque molle, *Mauriceau p. 91. 106.* & nuncum signum conceptus os clausum *Pannarolus Pentec. III. obs. 21.*

(11) Maxime, si revocemus ex DCLII. animalcula spermatica frigore perire, modico calore conservari, & animari, ut omnia insecta solent. Hic ipse calor videtur facere, ut coitus tempore id animalculum, quod fortunatus ovum adigit, maturum, accelerato motu corculi sui, invisibilia haecuna via umbilicalia exierat & arterias suas ovi venulis inferat: uti vicissim calentes ovuli (quod ex utero & corpore luteo calore aestimatur not. 2.) elongata arteria venam umbilicalem animalculi obposita ingreditur. Quae vero animalia ova

RUYSCHIIUS. Calyx [12], sive corpus luteum in homine placenta^e rudimentum est, in brutis vero animalibus coryledonum initium. Per calycem, non per interpositam sphaerulam, intercedit commercium inter ovum & ovarium, & calyx ovi initium est, finisque vasorum conglomeratorum. Separatur tamen de ovario ovum abque laceratione vasorum ovarii, sed ita, ut ea pars ovi, qua ovario necessebatur, debilissima sit.

I. GESN.] Quando nunc stimulis venereis turget ovum, & calescit, & in ampliorem molem intumescit, tunc in ea parte, qua ovum ad ovarium nexum fuerat, & in qua omnia vasa nunc abscissa sunt, per ea ipsa vasa [13], qua olim materies nutritia subibat, [in meo codice] advenit id de mare, quod ovum semineum secundum reddit: sive id sal volatile invisibile esse malueritis (14), sive flatum *argusoudia*, spiritumve MO-SAICUM, qui praegrans incubebat aquae, uti VAILLANTIUS, sive denique

ova non matura ingressa fuerint, aut interiora fuerint, quam quae vasa sua potuerint vasis ovi obponere & insigere, ea, etiam si tubas & ovarium adigerint, mori necesse est. Ex hoc calore venereo forte explicari poterit, quare animalcula in testis virili non excrecant? sed in muliebri demum ovo incrementa capiant? Quod abque hac vi expandente solida, fluidorum motum accelerante, vasa animalculi corculi impetui vi pari resistere videantur, cedant vero ab hisce duabus causis debilitata.

2. Quod radicalia vasa nullibi cum spe intromissionis, & proventus, emittere possint, nisi in paria ovuli intus fluentia vasa. Ita quorundam fungorum semina in solo limbo equivo radices agunt &c.

[12] Supra demonstratum est, calycem & in homine, & in avibus in ovario manere: ovi autem ambitum floccis obduci, quibus cum ovario in vulgari, aut cum luteo corpore, in *Malpighiana* conjunctum fuit, & olim cum utero conjungeretur. *Viciss. nov. syst.* p. 52.

[13] Abrumpi de calyce ovum, non difficulter concipitur, si, quod om-

nino probabile est, in coitu secundo intumescere posueris, ita enim, dum in brevitate se colligit, attrahit vascula, per quae alebatur, & avellit, conjuncta foris vehementi & convulsiva pressione externa ovarii DCLXVIII. Conf. *Aufz. von der Natur* n. 851. Tunc demum & per ea ipsa avulsa vasa, Praeceptor vult irepere vermiculum, & ad finia docet *Valisneri* e. 13. n. 4. Sed obstat gallorum exemplum, qui plura & diversae maturitatis ova fecundant uno initu, manifesto argumento, in ova nondum avulsa vim masculam subire. Decimo enim, & vigesimo die a coitu secunda ova a gallina pari *Harvejus* testis est p. 19. Sed quamvis parie ergo subit? Frustra quaerunt, qui ovum ipsum nondum certo viderunt.

[14] Qui semen masculum ad uterum venire negarunt, si feminalem aëram volatilem de semine exhalare & impraegnare feminam confitentur, & eo manifesto inclinat GRAAF. *ep. ad sebacht.* p. 222. CORNELIUS CONSENTINUS p. 277. & alii. Sed vias varias huic aurae fecerunt. C. BARTHOLINUS *spec.*

que LEEUVENHOECKII (15) animalculum admiseritis, quod decies milites minus grano fabuli: semper utique eodem res redibunt, ut principium imprægnans per hanc, neque aliam viam ad ovum adveniat: cum vero semen maris absque omni dubio communicetur cum ovo, pars vero seminis maxime ætuoſa sit omnino animalculorum congeries; hanc ipsam veram fecundationis causam esse probabile fit.

§. DCLXXIV.

spec. p. 112. per vasa sanguinea reſorbam ad ovaria venire statuit. Sic FANTONUS diff. anat. p. 211. SCHELHAMMERUS diff. 12. AUCTOR L. von der natur n. 878. HANDLEY Eff. of anat. p. 40. &c. Per tubas eo ipſo tempore ovario se adſcipientes VERHEYEN. L. 1. Tr. 2. c. 20. & L. II. p. 324. & VATER phys. exp. p. 720. & VALISNERIUS c. 13. n. 3. qui & ipſe id ſolum, quod in ſemine ſubtile eſt, ad imprægnationem facere credit c. 10. n. 3. quod animalculum in ovo latens ſuſciet, ut humores eius celerius circumeant c. 13. n. 4. Spiritus etiam ſolos de ſemine ad ovum ſubire DREINCOURT. periob. 30. I. VV. PAULI & alii. Per membrarum poros filtrari TAVVRY p. 73. Per vaſa, quantum video, ſua mucoſa, vacis propria MALPIGHIUS p. 34. Alii ne auram quidem, ſed cauſam aliquam fermentationis ſufficere malunt, ut PERRAULT mecan. des anim. p. 484. & CONNOR. evang. med. p. 6. & Maitreſſan & immateriale principium, vel motum, Harveyus ſub ſinem. BORELLUS autem deſcio quid organiſati in ſemine virili ponit II. prop. 173. Verum plus quam auram eſſe motumve, vel mutatio coloris demonſtrari, quam in ovib. hombycum ipſe MALPIGHIUS obſervat, ſterilia enim. ſublutea, ſecunda violacea ſunt de bomb. p. 36. 42. Sed tanarum etiam

ova imprægnata ex albis nigra ſunt, & ſimilia in erucis obſervavit RAJUS ſyn. quadr. p. 450. Id ſuperius dudum, niſi ſallor, valde probabile factum eſt. Adde nunc, quicumque hominem in ovo humano ſuſpenſum viderit, qualem paſſim, in VI. maxime Theſauro RUYSCHIIUS habet, illi ſpontæ certe viſurum, nihil huic fabricæ aptius reſpondere, quam vivum animal, quod in ovum irreſſit, & emiſſa radícula ſe inſeruit huic nativo ſolo. In ovo primo quendam quaſi vermiculum adparere MONROO aſſ. admb. II. p. 212. Qui vero ex DCLII. ante incubationem hominem, aut animal in ovo latuiſſe volunt, ii & minutius vermiculo ſeminali faciunt, & cum ſolum motum ad vitam huius ovi ſufficere volunt, non ſatis reſpiciunt ad ſummam illam neceſſitatem maſculi ſexus, quæ per omnia animalia dominatur. & ad ova ſubventanea, quæ periode emota, & ovario pariter, ut ſecunda excuſſa, ex ſimili libidine, ſimili acceleratione motus humorum ovi, nihil tamen ſecundi habent. Sed vermiculus, quem nunc admitto, & qui ovum ſubis, non per cicatricem advenit, ut GEOFROI an bom. prim. ordin. vermit, hæc enim per imprægnationem demum naſcitur; neque cauſa ſe adigat, quæ videtur eius ſpina doſſi eſſe, ſed vaſculis, quæ inviſibilia fuerunt.

DCLXXIV.

Tale) Ubicumque demum pars seminis fecundans ovo potuit applicari.

Ovario) In homine fetus inventi sunt, in ovo nati, qui ovario adhaerent . In iis calibus oportet omnino semen masculinum ad ovarium venisse : sive per uteri cavitatem in tubarum caveam, & per eam ad ovum venerit, quae opinio vulgo recepta est; sive juxta HARVEI doctrinam, aura seminalis mascula se venis in uterum hiantibus insinuaverit, hinc in sanguinis massam (1), & cum circulante sanguine per arterias ad ovum venerit . Verum hic quidem modus mihi conceptu difficilis videtur . Si enim vis feminis fecundans per cor & pulmones feminae transire debuit, facillime utique aberrare poterit, ut ad aliena loca, longe ab ovario remota veniat, nisi adjumenta alia gratis finxerimus.

Uterum

(1) Conceptus sedem in utero plerique ponunt . Olim GALENUS, feminam concipere semine in vasa subeunte, quae menses fundunt de vulv. dissect. Inter nuperiores ita defendit DÄELINCOURTIUS ad-vers. dogm. 12. & BERGERUS p. 460. & HARTMANNUS E.N.C. Dec. III. ann. 9. 10. obs. 161. Ita fuisse maxime PAITONUS Discurso IV. & nuper GOVEY, qui credunt ex libidine ova ad uterum descendere, ibi demum poros a semine subire PAITON. p. 79. Addit rationem PAITONUS, quod tuba continuo a coitu ovario nondum applicata reperitur p. 32. GRAAFIUS vero BOHNIIUS p. 21. VALISNERI c. 13. n. 4. VIEUSENIUS nov. syst. p. 48. & plerique in ovario ovum secundari statuunt . Hanc sententiam ut admittant, faciunt 1. ova humana in ovario reperta not. 30. ad DCLXVIII. 2. ova humana in tuba reperta, quale exemplum SLADUS ex RUYSCHIO habet ACT. HAFN. 11. n. 4. & DIEMERBROECK., & manifestius EDIMBURGENSES, qui a recenti venere corpus album, ovale, pili forma, cum multo se-

mine ex pressa tuba viderunt exire, in quo, ut nemo subventaneum, aut nondum secundum esse dicat, rudimenta erant corpusculi Ed. Soc. V. p. 336. Plura vide ad DCLXVIII. not. 20. 3. Gallorum vis, qua multa ova eodem tempore impraegnant, ubi manifestum est, in ipso ovario oportere impraegnata fuisse . Uno enim coitu multa ova fecundantur, HARVEI p. 18. etiam vigesimum esp. 39. & ovorum inchoata rudimenta p. 90. 111. & in indica gallina, omnia omnino ova unica venere secunda redduntur MAITREJEAN p. 5. In apum denique regina fecunditas ad octavum & nonum a viduitate mensem superest REAUMUR bist. des insect. V. p. 564. 4. Mutatio manifesta corporum luteorum, quae a secundo coitu tument, rubent &c. Sed ea ovarii partes sunt, non uteri .

(2) Cum crassamentum seminis in uterum veniat tubasque, minime laborandum est de parte mobiliori . Vermiculi non videntur in sanguine, alieno sibi elemento, supervivere posse.

Uterum] Quaeritur, num secundans seminum adunatio in utero fiat: ita GRAAFIUS [3], qui multa dubia in his rebus expedivit. Sumit domesticos cuniculos, mares, & feminas, sed hujus animalis tanta fecunditas est, ut fere ab omni coitu concipiat, & plurimos quidem fetus, vix unquam vero aberret. Ergo eadem hora plures feminas ad mares admittit, deinde easdem diversis temporibus aperuit. Quot nunc fetus concepti fuerant, tot semper in ovario reperit cicatrices (4), sive foveolas, ex quibus corpus luteum ejectum fuerat. Sed in vaccis, uti totidem, quot fetus, in cornubus uteri crenae sunt, ita totidem pariter in ovarii cicatrices. Ita suis aliquando sedecim, quos simul concipiunt, fetus in cornu sedet, vigintique in muribus. Deinde GRAAFIUS ova ab ovario in tubas venisse vidit; ut aliquot horis (4), post eam quaprimum ovum in tubam venerat, secundum adveniret, donec quatuor v. g. fetus ex ovario dextro pulsus, quatuor in cornu cellulas occuparent, id enim semper in tot cellulas dividitur, quot fetus concepti sunt. Ex his experimentis collegit GRAAFIUS, etiam in humani generis femina in ovario ovum impraegnari, inde in tubam & uterum deferri. Si in itinere impedimentum aliquod occurrerit, tunc in tuba fetum crescere, vel in ovario. Verum vir clarissimus experimenta sua unice in bicornibus uteris impraegnatis fecit, in quibus fetus in cornubus geruntur. In homine vero & equa, fetus in cavea uteri sedet. Ea ergo, quae observavit, in bicorni utero valere videntur, in homine vero conceptum potius in utero contingere. Neque tamen negavero, etiam in tubis, & in ovario conceptum posse fieri [5].

§. DCLXXV.

Clausa) In secundo & felici conceptu, infiniti enim casus sunt, in quibus ovulum iterum elabitur (1). HIPPOCRATES in libro *de natura pueri* hujusmodi historiam describit, docetque, qua arte ovum excuti possit.

(3) Argumentum maximum pro sententia nostra est, si factis firmum, iterio demum die a secundo coitu tubas ovario admoveri p. 307. Oportet adeo pridem ovum secundatum fuisse, nam triduo omnino semen vim suam amittit. Sed vid. DCLXVIII.

(4) Not. 1. ad DCLXVIII. not. 21.

(5) Fateatur etiam PAITONUS, in tuba, etsi raro, & in ovario, etsi rarissime fecundationem contingere posse l. c. p. 99.

(1) Inde numerosissimae historiae ovorum humanorum de utero excusorum. Bis mihi oblata sunt ovaria, fere alba cincta membrana, quae undique radículas albas ramosas educeret E. N. C. Dec. III. ann. 9. 13. obs. 191. multo sanguine mista, liquore plena limpidio. Sed hanc lanuginem altera crassior continebat membrana. Intus levis E. N. C. l. c. Celeberrimum ovum est illud HIPPOCRATICUM, quod ex saltatrice saltu jussit

posse expelli, sexto die, ut creditur, simile ovi absque testa, cum fibris albis excrepitis, humore intus pellucido, & in medio quasi umbilico HIPP. *de natura pueri*, & denuo *de aetate* IDEM ait metretices depellere quasi carunculam, in qua, si in aqua inspexeris, reperies partes distinctas. Porro ARISTOTELES pro animalis initio etiam ovum, membranam nempe, intexam venulis receperit *hist. anim.* L. VII. c. 7. Pelliculas a semine muliebri productas, ovae fetum amplectantur, ait GALENUS *de semine* L. I. & eam, ex utero pendere ex loco, ubi vasorum sunt oscula; hanc autem pelliculam fieri in secundam IB.

Haec ova humana, aut subventanea sunt, quo inutilia illa referuntur, quorum fetus casu aliquo perit, aut bono fetu plena, secunda. Illorum ecce exempla. Talia habet GEMMA *Cosmocris*. f. a. p. 86. pro secunda specie. Abortus trium, vel quatuor septimanarum, nempe bulla aqua-plena in amnio, quod chorion cingebat DIEMERBROECK. p. 185. Ovum columbini mole liquore, non coagulabili plenum cum appendicibus apud VALISNERIUM *opp.* II. p. 38. Ovum gallinaceo aequale plenum albumine MAURIC. *obs.* 180. Altero mense in utero sacculus fetu destitutus GALEACIUS *Comm. Bon.* p. 127. Secundo etiam mense ejecta ova subventanea HARVEL p. 230. Vesiculam tertio mense gravida pepererat femina dicta GRAAFIO p. 291. Nova nupta ovum egerit exiguum BARLES *nouvell. decouv.* p. 21. Hydris a conceptu dejecta BRESL. 1725. M. nov. Bursula absque fetu in abortu SCHRADER *obs. dec.* III. v. 6. Cum legitimo fetu ovum externe carnosum, intus granum continens VIEUSSENS. Iconem etiam placenta-

cum membranis abique fetu habet BIANCHI T. II. f. 7. 8. T. I. f. XI. p. 230. 231. & TRIOEN. T. 5. f. 2. 4. simillimam genuino ovo & pariter villosam, & RUYSCHIUS *Thes.* VI. 39. 40. 41. T. I. figuris 2. 3. 4. 5. ut videtur.

Sed vera ova conceptu intus ditata, etsi non rarissima, non tamen vulgaria sunt. Minima in tubis, citavi ad DCLXVIII. Tale etiam ovum in utero liberum, necdum adnatum, NIGRISOLUS ex fovea uteri eximit p. 22. Nuuc alia secunda, minima & maiora, ad diem nonum usque GRAAFIUS pingit T. X. f. 1. ad 7. ex cuniculis. Ovulum pisi mole jam villosum ex femina VATERUS habet *mol. praegn.* n. 4. majus autem BIANCHI T. I. f. 3. ex femina. Embryo tridui & quadridui aetate in magno ovo BIANCHI T. 1. f. 4. Biduo triduoque cerasi mole ova KERKRING. *anthropogr.* p. 3. Tridui quadridive ovum nuci aequale cum minutissimo fetu ID. f. 2. p. 4. Sexto die a venere bullula in cornu cuniculae LEEUVVENHOECK *Aeat. & cont.* II. p. 171. Septimo die ovum undique villosum avellana majus BIANCHI t. 5. Nono die a coitu conceptus ex tunica, liquido crystallino plenus, in quo nubecula, & alius minimus fetus COSMOPOL. f. EVERARDUS p. 48. 49. In sue decimo a conceptu die in medio utero vitrea substantia membrana clausa, in ejus medio fetus cum venis ramosis COYTER p. 124. Die duodecimo ovum humanum aequale pini putamini, jam circumfusus vasculis, cum fetu milii grani similis SANTORIN. *ihor. d. un fetu* n. 5. Decimo tertio die ovum (cuniculi) avellanae mole, cum multa aqua anuli fetuque adhuc informi COSMOP. p. 54. Ovum humanum juglandis mole, fibrosum, cum fetu jam satis formato E. N. C. *Dec.* II.

END.

ann. 1. *obsf.* 119. Ovum humanum columbini simile, villosum, cum semine papaverino non majori fetu, & funiculo E. N. C. *Dec.* III. ann. 3. 10. *obsf.* 191. Ovum nucis aequale cum fetu apud mole. TREVV. l. c. f. 4. 5. 6. Ovum nucis moscatae mole cum placentalae initio RUYSCH. *cur. renov.* n. 56. Ovum gallinaceo aequale, in eo fetus magnitudinis feminis cannabini MAURICEAU. *obsf.* 425. Ovum humanum nucis mole, externe partim fibrosum, partim leve, intus fetus muscae magnitudinis *Vater. de grav. appar.* p. 13. & pulchre TREVV. *Comm. lit.* 1739. p. 147. T. 3. l. 7. 8. 9. Ovum undique fibrosum RUYSCH. *Musf.* p. 170. Ova cum fetu hordei grano non majori ID. *Tösf.* VI. T. 2. f. 1. 2. Ova albuminosa cum fetu puncti simili MAURICEAU. *obsf.* 233. die decimo octavo, & vigesimo. Sacculus in quo gemelli formicae mole BRENDÉL. *de embr. praesens.* p. 38. In vesica fetus apud mole MALPIGH. *postb.* p. 86. Vigesimo primo die enorme ovum cum minimo fetu PINEUS p. 8. Ovum 21. dierum, in eo fetus lunatus cum partium initiis LANGLEY p. 161. Abortus trium vel quatuor septimanarum, bullae similis aqua plenae: cum amnio, chorio, & in membrana externa carnea massa Diemerbroeck p. 185. si quidem hoc secundum fuit. Ovum humanum cum membranis duabus fibrarum ope conjunctis & fetu intus mucoso Hartman. E. N. C. *Dec.* II. ann. 10. *obsf.* 157. Tertia vel quarta septimana ovum cum fetu faba non majori. Ovum 25. dierum cum fetu, nimis puto, perfectio Bidloo T. 57. Ovum anserini mole, in quo fetus acephalos Malp. l. c. p. 87. Vix avellana majus ovum quatuor septimanarum cum vermiculo intus contento HELSTER. *Comp. anat.* f. 27. Ovum

unius mensis, simile gallinaceo, extus tomentosum, intus ampullas tres continens Riolenus vidit p. 388. Ovum 32. dierum magno fetu & placenta Bianchi f. XI. Quinta septimana fetus apud mole in ovo la MOTTE II. c. 24. Eadem aetate fetus, uagve non major, partibus jam formatis MAURICEAU. *obsf.* 246. Aliquot septimanarum digitale ovum, cum (valde magno) fetu Schurig. *syllpsf.* p. 105. Sexta septimana ipse vidi ovum gallinaceo majus, totum obductum placenta, & chorio, cum qua amnios numerosis necessebatur vasculis, funiculo, hydatidi simili, embryoni iusformi insertum. Sexta septimana ovum juglande non majus, cum duabus membranis, fetu, funiculo, artuum rudimentis MURALT. *coll. anat.* p. 623. Sexta septimana abortus membraneus columbini ovi similis, albumine, plenus, cum fetu vix distincto MAURICEAU. *obsf.* 223. Eodem tempore in sacculo fetus ape non major *obsf.* 265. Sexta septimana vesica, in qua fetus apud magnitudine la MOTTE. *obsf.* 205. Ovum gallinaceo paulo minus, cum embryone pisi mole. DIEMERBROECK. p. 184. Aliud, ejusdem fere molis, cum fetu carinato formicae, magnitudine p. 184. Aliud aequale gallinaceo, cum chorio villosa, amnio separabili, fetu pisi aequali p. 183. Aliud eadem magnitudinis, cum placenta, chorio, amnio, & in eo bulla ID. p. 186. Ovum cum crassa chorio, & fetu in amnio, pene perfectio E. N. C. *Dec.* I. ann. III. p. 68. Ovum duorum mensium cum funiculo fili aequali, una extremitate membranae, in altera sanguine coacto la MOTTE l. c. p. 247. Bimestria ova cum vel sine fetu, placenta parum, nisi radicales aliquas habere, cum fetu unguis magnitudine Harvey p. 184. 230. Ovum bimembre in quo, medus

possit (2), quando fetus jam in ovo oculis dignosci potest. Tales abortus frequentissime fiunt, non sentiente femina, ob incredibilem parvitatem. Abortum trium mensium demum percipiunt [3].

Mascul.

diis in aquis, rubrum corpusculum *Collins sist.* p. 627. Bimestrem fetum in folliculo, pro monstro habuit *Jafon a Pratis de utero* p. 47. Ovum bimestre, gallinaceo aequale, cum fetu scarabei mole la. *Motte obs.* 134. Bimestre etiam ovum cum fetu pisi mole, funiculo praeditus, in quo aliqua arcuum apparitio, & radicae externae. *BURGGRAV. E. N. C. Vol. V. o. 79.* Ova duo perampla cum fetu fabae minoris & majoris magnitudine *RUYSCH. Thef. VI. T. II. f. 3. 4.* Novem septimanarum conceptus cum filamentis ex ovo rubicentibus in parte acutiori *BACK. in alleg.* p. 42. Sefquitertio mense ovum carneum, cum fetu apis mole, solito minus *MAURICEAU obs.* n. 108. In abortu 50. dierum ovum gallinacei mole, fetus fabae magnitudine *Harvey exerc.* p. 62. Ovum humanum cum rudi massula fabae mole *E. N. C. Cent. X. obs.* 3. & simile fere *TRIOEN.* vertice acuto, informi fetu *T. V. f. 3.* Ovum humanum sphaericum, anserini mole, cum fetu faba non majore, & tenui funiculo, tertio mense *E. N. C. Dec. III. ann. 9. obs.* 159. Eadem magnitudine cum puero scarabeo aequali la *MOTTE obs.* 134. Mense tertio elegans ovum ab altera parte villosum, anserino majus *HEIST. f. 27.* Magnum ovum tertio mense cum minimo fetu *RUYSCH. Thef. VI. n. 49. T. 3. f. 3.* Mense tertio duae membranae, cum aqua viscosa, hyalindibus & informi fetu *MURALT. coll. anat.* p. 663. Mense quarto ovum integrum editum, & in eo puella viva *REIES.* Mense

4^{to} membrana ovi similis, in qua

aqua & filamenta alba, tresque ampullae pellucidae *L. BOURGEOIS* p. 126. Nempe. ova humana saepe vidit *PLATERUS* annion habentes, in qua tres bullae quae. *physiol.* p. m. 238. eae vero bullae sunt cerebellum, duaeque cerebri lobi *DRELINCOURT. in advers.* vide *DCXCIV.* Aliud ovum humanum, in quo duo corpuscula in curva parum figurata *PLATER* l. c. Ovum exiguum, columbino non maius, cum paradoxo fetu incredibilis magnitudinis *RUYSCH. Thef. X. T. I. f. 3.* Ovum eadem magnitudine cum fetu faba non majori, mense quarto *MAURICEAU obs.* 159. Ovum eadem mole cum maruto fetu editum, in quo embryo formicae aequalis *BERGER.* p. 468. & intra molam atonios minor, & fetus *NOORT-VYCK* p. 121. In massa sexto mense edita, placenta, membranae fetus phaseoli mole, cum artuum rudimentis *ANEL. bist. de l'Acad.* 1714. *obs.* 3.

Ergo & in homine & in brutis (mantica etiam in damis generationis primordium est *HARVEI*) fetus naturaliter ab ipso conceptu semper in ovo reperitur, ab initio leviori, sensum magis undique villosi, liquore pleno limpidi.

- (2) Motu magno aut venere tunc ovum excuti posse, aut supervenientibus mensibus, credibile est, *DRELINCOURT. de sem. mulieb.* n. 30. cum ovum in his primordiis nondum adnexum sit. Caeterum *HIPPOCRATIS* historiam carpit *VALISNERIUS*, quod fetus 7. dierum multo minor sit, quam ibi describeretur c. 21. n. 16.

- (3) De anthropogenia pauca hoc loco decernam.

Musculorum) Non vi musciosa vera, sed utero per inflammationem, aliquam robur accedit, ut se constingat, & osculum obturet, neque tamen fetus incrementa impediatur. Exemplum hujus ab inflammatione roboris est in pene erecto, qui tensi muscoli simillimus riger, quando a sanguine influente turget.

Juga

In recenter impraegnata corpusculum album mucosum in utero RUYSCH, apud SLADUM l. c. Embryonem capite aciculae non majorem RUYSCHIIUS vidit *Cur. renov.* p. 143. & femine papaverino HARTMANNUS E. N. C. Dec. III. ann. 9. 10. obs. 191. Tertio die a eoit in cane carina BRENDL, l. c. Sexto die fetum grano hordei aequalem esse MANNINGHAM *comp. obs.* p. 50. Die septimo vermiculus incurvus 12. fere lineatum BLANCHI T. 1. f. 5. 6. omnino nimis. Vermiculus etiam in primis initiis in ovo MONROO *Edimb.* II. p. 212. In ovillo fetu corpus jam distinctum LEEUVVENH. *anat.* & cont. II. p. 165. Die octavo fetum cumini grano non majorem RUYSCHIIUS recenset *cur. renov.* p. 52. Decimo die vermiculus in ovo est, & adhuc ad albuminis modum ad ignem coigitur GRAAF, p. 311. 1c. 8. T. XXVI. Die duodecimo fetus humanus nulli grano similis SANTORIN. *Ist. d'un feto.* Die 14. ovum, & in eo fetum formatum fabae mole habet KERKRING, f. 3. multo vero majorem CL. GUTERMANN, *Comm. nov.* 1739. h. 9. T. 3. f. 3. Non ignoro, lectulum HARVEYUM, ante 15. diem nihil de fetu apparere, aut certe vix lente distingui secundum TAU-VRY p. 81. Sed contrarium VALISNERI demonstrat c. X. n. 4. 5. Die decimo quinto fetum api minori comparat MAUR. 571. Die decimo octavo, vel vigesimo, in aqua albuminosa fetus puncto similis D. obs. 233. Vigesimo die homo grani hordei mole BESLER.

p. 8. & VAROL. p. 102. Vigesimo primo die non major formica, sed nimis perfectus, in enormi ovo, apud PINEUM p. 138. & 1c. I. In ovo paucarum septimanarum, gallinaceo aequali, fetus pisi duplo minor, cramo membranaceo IDEM p. 183. In ovo gallinaceo minori formicae aequalis fetus p. 184. Pisi magnitudine fetus, in ovo gallinaceo, minori, & plurima aqua, p. 184. Vigesimo primo die 7. lineas longus, apparente artuum initio DODART. *obs. de F. Acad.* 1701. p. 25. pondere 7. granorum. Eodem etiam die fetus lunatus cum partium initiis LANGLEY p. 161. Vigesimo quinto die fetus uncialis PINEUS p. 149. api vero non major BIDLOO T. 57. f. 3. Vigesimo quinto vel trigesimo unguis mole MAURICEAU p. 84. Quem pro 25. dierum fetu BIDLOO pingit, nimis perfectus videtur T. LVII. enormiter major vermiculo, quem HEISTERUS pingit F. 27. Tertia quartave septimana fabae fere aequalem fetum in aquis MAURICEAU obs. 558. Vigesimo octavo die skeleton fere unciale pingit KERKRING, f. 4. Pondus menle primo drachma semis aestimat MAURICEAU p. 38. magnitudinem fabae parem obs. 411. vel api obs. 367. aut paulo majorem ex obs. post. 5. Sed haec non satis sibi respondent. Menstruum fetum digiti transversi mole FATERUS vidit de mola praeg. n. 6. suumque minorem quam KERKRINGIANUM fuisse monet SVAMMERDAM. *prodr.* p. 25. nam menstruum hujus fetus biuncialis est. Die trigesimo quinto fetus apis minoris mole informis la MOTTE l. c. 24. Quina

Juga membranosa) Post EUSTACHIUM MORGAGNUS, & NABOTHUS probe notarunt hanc rem. Uterus intus non glaber est, & ubi uterus aperi-

Quinta septimana fetus ungue non major, sed partibus suis apparentibus *Mauriceau obs.* 146. Sexta septimana aequalem scarabeo la *Motte* p. 134. Eadem aetate fetus exiguus, sed formatus, capite & oculis apparentibus *Murali. coll. anat.* p. 613. Uncialem eo tempore fetum *Vaterus* vidit l. c. & *Bidlow* T. 57. f. 4. & plus quam uncialem *Kerkring.* f. 6. *Guterman.* l. c. f. 1. & triuncialem aique valde perfectum. *Pineus* p. 148. seqq. Altero mense fetum digitum longum vidit *Vater.* ib. Nona septimana in ovo gallinae aequali, duo fetus minimum digitum latus habet *BACCK.* p. 42. triuncialeni vero *TREVV.* l. c. f. 13. & paulo maturiorem alteram f. 14. 15. Tercio mense articulo digiti nondum aequalem, valde parvum. *L. BOURGEOIS* habet l. p. 27. digito vero magno *MAURICEAU obs.* 692. Fetum duos digitos longum mense tertio *HARVEI* p. 230. & trium unciarum pondere *Mauriceau* p. 85. Non recedit pulcherrimus ille *Heisterianus* f. 17. Sed *Pineus* enotimenter adulum pingit p. 154.

Verum facile demonstratur naturae varietas. Nam incrementa numerosa dierum non sequuntur, sed alimenti sorte naturam, & vim impulsivis. Deinde has mensuras turbat, quod fetus saepe dudum ante abortivum partum pereant, aut crescere certe desinant, atque adeo edantur mole minori, quam pro aetate naturalis foret. Hujusmodi fetus falsa germina vocat *Mauriceau obs.* 485. 511. 617. Huc pertinent plurimae hujus scriptoris observationes. Post aliquot sep-

timanas fetum grano mihi aequalem *obs.* 141. sexta septimana vix distinctum corpusculum *obs.* 233. neque majus aperi, *obs.* 295. Altero mense fetus grano hurdei non major, forte 15. dierum *obs.* 314. 673. Nona septimana fetus aperi non major, menstruus forte *obs.* 367. Decimo, quinquagesimo fetus aperi non major, ovum anserino, ex matre obnoxia abortui *obs.* 421. 615. & grano cannabino *obs.* 681. & tritici grano *obs.* 596. Mense tertio ovum, aquis albuminosis plenum, cum fetu grano mihi non maiori *Mauriceau obs.* 616. & cannabino *obs. post.* 135. *obs.* 108. 304. 403. 381. 571. & ovum anatino non majus *obs.* 416. Mense tertio, & dimidio ovum gallicae non majus, fetus aperi, sed post languorem *obs.* 400. Mense quarto cum inedio fetus aperi non major, menstruus forte *obs. post.* 64. Mense quinto abortus juglandis non major *obs.* 498. fetus fabae *obs.* 259. Mense sexto ovum columbino non majus, fetus aperi *obs. post.* 49. & ovum columbino non majus post haemorrhagiam *obs.* 432. Mense septimo ovum pugni mole, fetus aperi non major *Maur.* *obs.* 696. & trimestri non major *obs.* 462. Mense octavo fetus muscae non major, grani ponderis *obs.* 482. Nono mense fetus trimestri non major *Maur.* *obs.* 337. Huc adeo refero fetus quadraginta dierum non majores formicae *Arist. hist. animal.* L. VII. c. 3. *Fernelii physiol.* L. 7. c. 10. (qui tamen suae formicae caput facit avellanae aequale), & *Riolani* p. 388. & triginta quinque dierum fetus apii mole, *Stratonis*, & *Dioclis Carystii* apud *Macrobinum*

aperitur osculo, ibi juga (4) conniventia sunt, quae ad inferioribus fursum admittunt, a superioribus vero deorsum cuncti ovo resistunt. Haec repagula hoc tempore intumescunt, uterum coercent, ne excutiat, quod conceptum est.

Vesicu-

evobium in form. Scip. l. c. 6. sextaque septimana non majorem fetum *Paroli* p. 103. & eadem magnitudine nona jam septimana la *Motte obs. 173.* aut grano hordei *Ruyfch. advers. ll. n. 10.* tertioque mente *Eiusd. Thef. VI. n. 49. T. 3. f. 3.* & in *E. N. C. Dec. III. ann. 9. obs. 159.* Tum quinquaginta dierum fetum, non majorem saba *Harvei exerc. 68.* Caeterum etiam minores fetus satis saepe molestos esse monet la *Motte* p. 247. & alii, cum in primis ea acrate, ex clauso utero placenta aegerrime eximatur. *Conf. E. N. C. Dec. II. ann. 1. obs. 100. 116.*

- (4) Laminae sunt pene cartilagineae, deorsum cavae, similes vaginalibus, in aciem terminatae *Morgagn. adv. l. n. 14. T. 3. L. V.* di transversas valvulas fuisse, uti *FABRICIUS de form. fet. T. IV. PALFIN. de la femme* p. 56. &c. & tanquam ramos ex medio trunco ventis *FABRIC.* ibi. Ita sed paulo nimis evidenter, *MORGAGNUS adv. anat. l. T. 3.* & *SANTORINUS*, ramorum cum appensis pomis simillimas, *T. 2. l. 3. p. 215.* nimis e contrario obicere *BIDLOO T. 51. f. 4.* & *TREVV. Comm. 1731. h. 7. 1732.* Alias duos truncos vidi, ut *SANTORINUS l. c.* & pro perpetuo *VVINSLOV. n. 598.* &c. olim *NABOTHUS*. Alias vidi plures uno trunculo fuisse, rugaeque ramosas. Ita plures, & stus confusos pingit *TREVVIVS*

Comm. Nor. 1735. h. 39. T. IV. f. 11. p. 284. pro re perpetua, & quinque aliquando truncos fuisse *SANTORINUS* testis est p. 215. Alias vidi varie intricatas, & inordinatas, valvulas, directionibus diversis, ad latera recurvatis, ut nullum ordinem facile exprimeres. Alias vix quidquam conspicuas, quod etiam, *MORGAGNO* contigit *Adv. IV. p. 69.* & *BIANCHI* aniam deducit carpenti. Caeterum *HEROPHILUS* collum uteri cum palato comparavit *diff. vulv. e. 7.* & musculosum cartilagineum dixit *GALENUS de utilis. partium L. XIV. e. 3. de diff. vulv. e. 7.* ubi addit in aniculis durius esse. Eadem habet *C. BARTHOLINUS* p. 154. *VESALIUS* addidit rugas esse p. 653. eaeque per aetatem, & venerem duriores fieri p. 657. In icone *FAFRICIANA T. 4.* habetur, sed rudius & absque explicatione. Rugas etiam *DIEMERBROUCCIUS* dixit p. 137. & *GRAAFIUS* p. 181. Chordas *RUYSCHIVS* vocavit *Thef. VI. n. 24.* cupus non bona icon existat *Thef. VI. T. 4. f. 3.* Lacertos firmantes nominat *SANTORINUS* p. 216. Videtur omnino acrem, & alia vaginac contenta morari, ne uterum subeant; deinde facere ad extensionis facilitatem, cedunt enim & explanantur, neque tamen evanescent *SANTORINO* teste p. 215.

Vesiculis] Idem EUSTACHIUS, & MORGAGNUS docent, inter jugs, quae in exteriori osculo uteri sunt, solent autem vocare internum os, ut a vaginae orificio distinguant, ampullas esse sphaericas (5), quae

P 2

per

(5) Vesiculae alias, & saepe quidem, superius quam valvulae ponuntur, ut *Verheyen*. p. 146. T. 17. f. 3. immeritae ex diindia parte in uteri carne, aut ad duas tertias, ut *Henrici de vesicul. fem. mulier.* p. 8. aut penitus absconditae, ut *Morgagnus Adv.* l. p. 18. quales etiam *Trevvius* habet *Comm. Nor.* 1732. p. 284. T. 2. f. 3. aut tantum una tertia. *Naboth.* n. 14. & aliquantum, ut *Noortvuyck.* p. 7. Ibi in utero rarius quidem reperiri *Naboth.* ib. alias, & ibi, & in cervice. Alias omnino inter valvas sedent, ut in *Morgagni*, & *Santorini*, & *Verheyen* iconibus, & apud *Vinslerv.* n. 598. & frequentius esse *Nabothus* auctor est. Alias in limbo osculi interni ID. ibid. conf. *Morg.* l. c. Ego in cervice perpetuas, & ut fallor etiam perpetuas in ea parte uteri reperi, quae in cervicem gracilescit, haec tamen supra valvas est. Duas tantum series esse, ut *Bianchus Theatr. Mang.* II. p. 77. non credo, agminatas autem in unum corpus coaluisse, non repugnans, quod idem vidit. Fiunt tenera membrana, quae tamen per foramen intus in utero potest (*Henrici*). Continent lympham viscidam, pelucidam *Schurig. spermat.* p. 182. sive mucosa, *Littre* l. c. serumque limpidum, ut *Palfyn. de la femme* p. 56. Ductus vero, quos memorat *Henrici*, nemo praeterea vidit. In femina hysterica, magis fuisse narrat *Valisveri* c. 5. n. 23. Has vesiculas, post levem memoriam *Graafii*, qui in-

ter uteri jugs dixerat se vesiculas vidisse p. 181. habet *Cl. Desnoues*, subrotundos tumores, qui expressi materiem spermaticam, flocculentam edant *Zod. Gall. ann.* III. p. 21 *lettres* p. 129. *Littrius* autem in gravida videtur *Mém. de l'acad.* 1701. p. 386. & *Mary* anno eodem *bist.* p. 30.

Sed *Nabothus* an. 1694. ait se sua ova vidisse *de steril.* n. 13. & etiam tunc pro novo ovario habuisse, & eadem in *diff. cit.* reforescens ovarii, pro vera sede, conceptus proponit, ovisque femininis. Addit juniores feminas plura habere n. 14. partemque utero immeritam placentam esse, & aliquando pili mole reperi ib. & liquorem intus albuminosum concrementum continere n. 13. *Cl. Henrici* similem opinionem recepit, addiditque, femini virili similem continere materiam l. c. nempe semen muliebrem activum, quod mixtum virili, tetum efficiat p. 18. *Nabothianum* autem ovarium omnino recepit *F. Hofmannus med. bist.* p. 342. 343.

Deinde has vesiculas praeter priores viderunt *Petermannus*, *Douglasius abridgm.* IV. T. 6. f. 2. *Palfyn.* l. c. *Muys a Schurrio* citatus *muliebr.* p. 316. & *Verheyen*, qui rudem iconem dedit *globosorum corporum* p. 146. T. 17. f. 17. *Trevv.* *Comm.* 1732. p. 13. *Morbis* in *diff. inaug.*, & *Lieutsaud.*, & alii, nemo vero facile in *Nabothi* opinionem incidit, nimis repugnantibus observationibus citatis ad DCLXVIII. 21. & DCLXIX. 30.

Contra *Nabothum* etiam *Botzingerus* scripsit, & *Petermannus* &

per emissaria sua liquidum plasticum [6] amylicae pastae simile exsudent. Praeter eas etiam lacunae (7) ibi sunt, quae lentum humorem exonerant. Hinc in conceptu lentissimus humor, per agitationem inflammatoriam abundius effusus, os uteri [8] obfecit. Tres adeo causae sunt, quae ovum retinent (9) in utero.

Inna-

&c *Etmullerus*, qui citat utrumque, &c *Raysebius Adv. anat.* l. n. 2. qui hydatides esse voluit, &c hic &c in tubis abunde frequentes *Etmuller epist.* p. 9. &c. Ita in utero sphaerulas in hydropica *Duchisne* vidit apud *Palfyn de la femme* p. 80. &c *Breslaviens. 1722. m. Mart.* in ipsa demum cervice e longo petiolo pendulas vidi. Sed *Santorinus*, &c *Morgagnus* l. p. 37. &c *Henrici* p. 7. cum simul utraeque repetantur, non credunt, veliculas hydatides esse: *Santorinus* addit (post *Morgagnum Adv.* IV. p. 70.) in puerperis crebriores esse, atque forte ad eum statum pertinere p. 213 214 (quod idem *Morgagnus* habet p. 71.) additque se in infelici puerperio cervicem absque vesiculis duram reperiisse. Muco leno plenas etiam *Morgagnus* facit *Adv.* l. c. &c *Valisneri*, &c secretoria mucici uterini *Simson Edimb.* Soc. IV. p. 121. Mihi dubiam hanc theoriam reddit emissariorum defensus, nunquam mihi visorum, &c ubertas vicinarum lacunarum.

- (6) Mucus rubrofusus in gravidis os uteri claudit *VESAL. exam.* p. 142. *RIOLAN.* p. 367. *HARDER. prodr.* c. 8. *DIEMERBROECK* p. 236. *ALDES* p. 547. *LANGLEY* p. 163. sed isti ex brutis. *COVVER T. L. f.* 4. *GRAAF.* p. 181. *E. N. C. Cent. X. obs.* 46. *NOORTVYCK* p. 7. ad aliquot in equa uncias *Feyer* in *exere.* In vaccis etiam hunc mucum reperi, &c in feminis, &c in summaervice *MORGAGNUS Adv. anat.* l.

p. 37. Os uteri in meretricie vitulo plenum *D. de FICHIETIS* apud *RAIUM abridgm.* IV. p. 7. &c *MORGAGNUS* ib. p. 12. Subrubrum vocat *VESALIUS* p. 653. quod reperi, sed corruptionis tribuo. Fontes lacunae sunt not. 7. forte etiam ova *NABOTHI.* Ita etiam *MOEBIUS* in *diffic.*

- (7) DCLXIV. Adde in iconibus, quas *PRAECEPTOR* ex *EUSTACHIO* citat, sinus quidem muciferos manifestos, rugas not. 4. perobscure exprimi.

- (8) Ex triangulari illa latiori cavea uteri, dixi angustiore firmissimum canalem descendere, veram uteri cervicem, obervante *FALLOPIO* p. 192. &c facile demonstrant *GALENI* sermone de *vulv. diffic.* c. 7. quam pro secunda uteri cavitate distincte describit *COLLINS* p. 567. &c *SIMSON* l. c. p. 129. &c alii. Eam descripsi, a vagina circumnata excipi. Intra istum adeo canalem prominet cervix, anuli similis pulposi, crassissimi *VESAL.* p. 657. convexi, intra vaginam prominentis, &c quasi suspensi *VVEFFER* de *crut. aquat.* p. 325. *MAURICEAU* p. 33. f. 1. incisii fissura, ex figura uteri, &c situ transversim, lata *VESAL.* p. 555. *FABRIC. T. l. f.* 12. in virgine perangusta. *GRAAF.* p. 180. conf. *PINAEUM* p. 124.

- (9) Os uteri aliquando praeter naturam clauditur, &c angustius est, estque haec ex causis sterilitatis muliebri *Hippocrates* *trisi juracorum* p. 87. &c a *Manningham* p. 47. *Mauriceau*

Innatat) Penitus liberum (10), quia longe minus est minima capacitate uteri: eo tempore, quo nondum adhaesit, facillime ovum ejicitur, quod *faux germe* [11] Galli vocant, trimestri vero fetui demum. nomen inponunt *abortus*.

Humor

riceau obs. 582. *Schurig. muliebr.* (ex *Vraislavienibus*, &c. *D. Panh.*) &c. *Ruyseb. Tbes.* VI. n. 85. &c. factum clausumque a sarcomate in sterili *Bierling* E. N. C. *Dec.* I. ann. II. obs. 208. &c. connatum fuisse, ut oportuerit parturienti cuncto aperiri, lego apud *Edimburghenses* III. p. 317., &c. fere simile exemplum habet *Goney* p. 62. Sed in gravidis, perinde uti in virginibus, *Pinaeo* recte notante p. 128. magis conniveri, quam clausum est, vide etiam *Graaf.* I. c. *Covvper.* T. 51. f. 4. (mense tertio), Dierite vero hiare, &c. ad modum canini rostri produci *Mauriceau* p. 57. Invenio equidem os uteri a surgente utero claudi apud *Hippocratem* apud V. n. 51. *Drelin.* de Concept. *Periob.* 21. *Hobokenum.* anat. secund. vit. p. 14. *Dienmorteck* p. 236. &c. alios; &c. sub initio strictum esse apud *Harveium* p. 270. *Vesalium* p. 655. tridino, &c. quadrado a partu *Horne VVeblmutter* p. 13. vixque stylum admittere apud *GAL.* de diff. vulv. c. 7. *Riolanum* p. 365. arctissime demum constructum apud *Blancard.* anat. *graef.* II. n. 76., &c. mense inprimis quinto, &c. sexto la MOTTE I. c. e. XI. praegnantem vero in universum claudi, &c. coeunti demum hiare, ut semen recipiat apud *Galenum* de util. part. L. XIV. c. 3. In ovibus etiam angustatur *Peyer* apud *Muralium* I. c. p. 409. *Aristoteles* denique etiam post menses effluxos claudi ait *bist. anim.* L. X. c. 2. Verum ego nullum, in cadavere certe, ostium aut uteri, ad alterius emundatio-

ril, unquam strictum vidi. VA-TERUS in gravida etiam pisi capax pingit, &c. qui prius curati sunt, illi quidem morbosum aliquem coalitum descripserunt, isti angustum dixerunt, comparantes cum enormi illa dilatatione, quae in partu fit.

- (10) Ova in canaliculis sub initia graviditatis non adhaerent utero *GRAAF.* p. 308. *DRELIN.* C. de sim. mal. n. 30. &c. in dama *Harveii* p. 233. tum in bifolcis in univertum *ID.* p. 280. avibusque. *Idem exere.* 8. Ita *Graafius* etiam in ovo libero primum nubeculam apparere vidit, deinde punctum saliens p. 278. 280. Tertia septimana in ove nondum adhaeret fetus *Langley* p. 166. &c. quinta p. 162. neque ante diem nonum in cuniculo p. 167. Addit *Harveius*, adhaerere in damis ovum tunc, quando viscera in pectus fetetraerunt *exere.* 69. &c. in e quis *Needhamus* prioribus sex omnino mensibus ovum utero non adhaerere auctor est c. 2. &c. confirmat peritissimus *VVefferus* E. N. C. *Dec.* I. ann. 3. obs. 129. Verum, nimis tardam videtur hanc adhaesionem fecisse *HARVEIUS*, nam placenta multo, quam credebar celerius erumpit *DCLXXVII.* &c. septimo die in cuniculo ova cclulis adhaerent, ut vix eximi possint *Graaf.* p. 309. paucisque diebus recte hanc libertatem definit *Auflor.* von der natur. n. 384. Audiendi sunt, qui hanc libertatem negant *Hartmann* E. N. C. *Dec.* III. ann. 10. obs. 191. & *Monroo* in *At.* *Edimb.* II.

- (11) *Aristoteles* abortus vocat, ferus dearticula-

Humor) Uterus clausus plenus est masculino semine, cum mucilaginoso succo uteri, cum conceptus plerumque post menses sequatur: his nunc humoribus natat ovum, quo uterus major est, & pori mace-rantur (12), ut subtilioris humoris, cui innatant, partes admittant. Haestenus quamdiu nondum urero adhaeret, embryo dicitur.

Meatus) Per eam partem, qua ovum aperitur, ea nempe, qua humor ex ovario in ovum ferebatur, quamdiu ovum ibi fuit.

Inaequalem) Quando pressio undique aequalis incumbit, nullum potest rupturae adesse periculum. Vitellus intra ovum, integrum etiam si concusseris, non rumpitur, quia in medio ovo sedet, neque ovum demum in vesica aqua plena frangitur, utcumque vesicam adliseris.

Crassiores) Una & uterus crassior (13) redditur. Cum enim ex vas

fis

ricularos, effluxus autem quando semen liquidum ante septimum diem effluit *bist. anim.* L. VII. c. 3. *Mauriceau* vixit p. 112. *obf.* 314. 318. 647. 485. 511. & *Bianchus* falsum germen dicunt quod amnion, & placentam habet, fetu vero caret, qui destructus sit *Bianchi gener. anim.* p. 130. 131. T. I. f. XI. T. 2. f. 7. 8. *Alibi Mauriceau* ante mensem secundum vel tertium falsa vocat *germina* p. 94. *Drelincourtius* embriones vocat prius, quam umbilicus utero adhaeserit, fetus autem, quando id factum est *Perrocb.* 35.

(12) In conceptu ante omnia humor adparet DCLXXXIII. not. 3. *Havey* p. 280. *Cosmopol.* p. 160. *Cornelius Constantinus* p. 278. *Prog. V.* In recentem impregnata uterus plenus limpidio humore *Ruyssch.* apud *Diemerbroeck.* In cuniculo die 7. &c. viscidus liquor in utero *Cosmopol.* p. 41. In vaccae cornu dilatato liquor copiosius limpidus, & in eo fetus *Grot* a *Desvign.* de fetus format. & dudum die septimo a coitu, & in utero, & in cornu copiosum, quasi albumen invenit, in cuius medio crassum quid esset *Jacobus Sylvius dissect. var.* p. 73. In ove die XI. ovum in utero solo sumo-

te tutgidum *Verbeyen* II. p. 315. In hoc ergo humore natat ovum, nondum radicabile per experimen-ta not. 10. Augetur tamen, & quando primum villosum apparet, iam multo quam in rubis maius est, conferendo DCLXI. not. 25. cum DCLXXI. no t. 1. Superest, ut per poros bibulos ali-mentum resorbeatur, aut per teneras radículas, nondum visibiles placentae. Ita etiam *Graaf.* p. 279. *Taunry* p. 85. *Valisnerius* c. 13. n. 6. & consentit utique ovi gallinae notissima inhalatio, qua fit, ut humoribus multis exhalantibus, pondere minime minuatur.

(13) Haec celeberrima quaestio est. Uterum equidem dilatari sensim in graviditate nemo negat, ita ut fundus inprimis ascendat, & dilatetur *Manningham* p. 4. *Deventer* p. 40. 39. 28. &c. *Simson* p. 22. & sexto mense tubae ad duas tertias uteri exeant *Deventer* p. 400. *Vater uter. grav.* aut ad quartam, ut *Noortwyck* p. 7. & ad duas sub fundi lateribus uncias, ut *Littra Mem. de l'ann.* 1701. p. 385. integrumve pedem *Desnoes let-tres* p. 32. vel ex dimidio utero, ut apud *Fabric.* T. 1. Idem *Graafius* observavit p. 224. & *Riolanus* p. 355. Vitiola adeo *Pechlini* figura

sis totus componatur, affluente per ea vasa majori humorum copia, necessario in substantia ipsa crassescit uterus.

§. DCLXXVI.

figura est L. I. *obs.* 19. qui in gravido utero tubas ex vertice ortas pingit. Eadem ratio est, quare prolapsus uterus in gravidis adscendat *Mauriceau obs.* 40. & prolapsus ipse evanescat *Pechlin obs.* 20. L. I. *Mauriceau obs.* 95. Addit *Ruysebius*, post *Riolanum* p. 366. vaginam una longiorem fieri, quod necessario sequitur, etsi breviorum reddi velit *Spigelius* p. 263. & ligamenta teletia anteriora reddi *mus. rar.* p. 118. Cervix diu vix mutatur *Graaf.* p. 179. *Verheyen* p. 126. *Simson of the womb* p. 77. 83. ultimo tamen mense *Simson* l. c. aut sextum, septimo, aut quinto demum *Orynos de situ fetus* p. 9. etiam dilatatur, & fere evanescit *Mauriceau c.* 7. donec in puerpera oris uteri cavea cum utero fere confundatur *Lieutaud* p. 359. acque lata, ac uterus *Riolanus Morgagni Adv. anat.* IV. p. 71. & uni similis continuo tubo *Deventer c.* 5. Nimis ergo duriter *Dionit cervicem* omnino negat dilatari *des accouch.* p. 17.

Sed an adtenuetur in gravidis uterus, magna inter medicos discordia est. Adtenuari equidem *Galenus de util. part.* c. 14. de diff. vulv. c. 8. ut in praegnantem tenuissimus fiat, & *Aetius tractat.* IV. *serm.* IV. c. 1. & *Avicenna* L. III. Tr. 2. c. 1. p. 21. & *C. Stephanus* L. III. c. 4. & *Fabricius* l. c. P. II. c. ult. & *Falcobergus* apud *T. Barbolinum anat.* p. 261. & *Schellhammer exerc.* 12. qui membraneum in puerpera invenit, & *Gottike de distoia* p. 2. qui similem *Albini observationem*, & inde ruptum, uterum refert, & *Barles koui.*

dec. p. 3. & *Bohn.* p. 21. & *Molinus* p. 324. & *fussime Mauriceau* p. 19. 20. adducto exemplo puerperae, in qua uterus post partum non crassior duabus lineis fuit, inferius ne vesica quidem densior *obs.* 149. & altero *obs.* 108. p. 70. tunc *Venetis* sua etiam citius experimenta, & experimento confirmat *Pescoli* L. III. p. 61. uti in puerpera quanta pollicis parte non latiore reperit *Chapman.* c. 41. antrina vero penna non crassiorem in E. N. C. *Dec.* II. ann. 9. *obs.* 74. Crassescere denique negat *Molinus* p. 324. Alii adtenuari quidem, solo fundo excepto, cui placenta adhaereat, docent ut *Dionis* p. 287. *des accouch.* p. 38. *Fried.* apud *GoliKe de invers. uter.* p. 21. *Nicoboli.* p. 47. *Barles decouv.* p. 3. *Zod. Gall.* ann. 1. febr. 33. in E. N. C. l. c. fundum enim in primis crassescere certum est *Peyer.* E. N. C. *Dec.* II. ann. 7. *obs.* 204. Sic in E. N. C. *Dec.* III. ann. 9. 10. *obs.* 103. fundus duorum digitorum crassitie fuit, cervix ea, quae pennae anserinae est. Parum adtenuari *Bergerus* p. 496. fere uti *Praeceptor.* Verum nubes testium demonstrat, uterum in praegnanter crassie non minui *Piazzonus*, p. 126. D. de *Marcellis* p. 126. *Harvey* p. 333. 273. 271. *Erdl.* ex *Ruysebio* p. 89. *Peyer* E. N. C. *Dec.* II. ann. 7. *obs.* 204. *Burdon* p. 121. E. N. C. *Vol.* 1. *obs.* 183. *vol.* 3. *obs.* 146. *Cent. X. app. obs.* 3. & *Trevv.* *vol.* 2. *obs.* 49. la MOUTE L. V. c. 16. MOEBIUS *obs.* 2. *Manningham* p. 4. *Luttre Memoir. de l'acad.* 1702. p. 23. Potro

§. DCLXXVI.

Molem) Ovum majus, & globosius fit, & incipit mole sua uteri capacitatem replere [1]. Videtur autem tamdiu liberum manere, donec adeo magnum fit, ut convexitate sua uteri concavitatem contingat, tunc autem cum eo concrefcere.

Ovi

ro I. Sylvius in puerpera uterum unciam crassum vidit in *ifug. & Mory* in puerpera octo linearum crassitie reperit *bist. de Facad.* 1707. *obsf.* 2. & *Heister* simile experimentum adfert, & *Noortvuyt*: *K bist. uter. grav.* p. 111. *Palfynus* digiti crassitie in caefareis sectionibus invenit l. c. p. 55. & *Suntorinus* p. 214. Ipse denique bis octo, & duodecim linearum crassitie vidi, quam in virgine uterus acre superat. Sed augert potius docent *Arantius de fetu* c. 2. *C. Bartholinus* p. 145. *Riolanus de fetu* p. 364. *enchir.* p. 173. *van Horne de deduct.* *Sal. diff.* II. *Heister* not. 31. & *Collins* p. 568. & *Deventer*, qui fufe refutat *Mauriceaum* p. 32. 40. & c. & *Taury*, & *Schurig. mul.* p. 244. & *Muralt coll. anat.* p. 238. qui duorum digitorum crassitie repetunt l. c. E. N. G. *Dec I. ann.* IV. *obsf.* 192. & *Dieffenbach de excind.* fetu qui tres digitos crassum in puerpera reperit, & *Breslaviensis* 1726. p. 362. qui quatuor. Maxime vero in fundo crassifcit, *Riolanus* l. c. *Nicholls* p. 47. *la Motte* l. c. *Douglas phil. trans. abr.* IV. II. p. 216. & *Manningham* p. 2. ubi etiam sexuncis crassitie *Chapman* reperit c. 20. in eo nempe loco, ubi placenta adhaeret *Arantius de fetu* L. 1. du *Portal.* & c. Facile adeo vicerit illa sententia, & pauca contraria experimenta ad aliquem peculiarem

collapsum vasorum referri possunt. Haec crassities utique a sanguine est, vasa uteri enormiter dilatante *van Horne* l. c. *Rau.* l. c. *Deventer* p. 41. A partu tamen non penitus tollitur. Nam multiparis uterus crassior est *Galenus de diff. vulv.* c. 8. *C. Baubinus* p. 171. *Riolanus antbr.* p. 198. *Dionis det accouch.* p. 37. forte quod vasa resistentiam contra liquores suos nunquam penitus recuperent.

- (1) Fetus adultior semper totum uterum replet, ut ipse vidi & *Lette Memoir.* 1701. p. 386. & *Noortvuyck* p. 10. & *Graaf.* p. 279. & icon *Fabricii* exprimit. *Galen* autem sententia, fetum semper uterum perfecte replere, sive magnus fuerit, sive parvus, omnino de solo fetu adhaerente intelligi debet *de form. fet* L. I. ut in ipsum cervicis initium acutus ovi vertex descendat, quod vidi, & *Noortvuyck* l. c. Verum, cum uterus sabae sorte phaeosolae majoris capax sit, ovum veto recenter secundatum multo minus DCLXXV. not. 1. oportet utique tempus aliquod consumi, donec ovum uterum repleat. Hinc sub initia gestationis liberum est DCLXXV. turgent sensim resorbitis humoribus, donec radices agar *Valis.* c. IX. n. 14. *Hendley Esf.* p. 422. & c. adhaeret autem utero, quando cum nunc replevit *Cyprian.* p. 26.

Ovi) Intra tertium mensem ovum in utero anserino aequale (2) factum est, & fetus in illo uncialis. Inde demonstratur, fetum eo velocius (3) crescere, quo tenerior est, & origini propior. LEEUV.

VENHOECKIUS docet, vermiculum feminalem vix aequalem esse $\frac{1}{10000}$ grani fabuli, & hoc tamen granum citissime in uncias excrescit, postque

(2) Incerta fetus incrementa esse, aliofque celeriter, alios tarde augeri adparet ex DCLXXV. not. 2. multum cum hic plethorae gradus potest, aut morbi supervenientes.

(3) Pone vermiculum = $\frac{1}{10000}$ grani

arenae ex DCL. pone arenae decem grana pendere granum unum. Erit vermiculi pondus

= $\frac{1}{10000}$ grani. Sit nunc fetus

mensuarius granorum 30. per BO. TALLUM de sang. miff. c. 3. & MAURICEAU p. 85. erit incrementum unius mensis = 3000000 molis vermiculi. Porro, si tertio fetus mense fuerit triuncialis ut idem BOTALLUS, & MAURICEAU incrementum erit intra duos menses = 48. i. enormiter minus. Sed ab eodem triuncice fetus intra sex menses reliquos fere duodecim librarum pondus adquisit. Incrementum adeo 8. mensium est = 3072. ies molis propriae fetus mensui, sexagesies vero quater molem fetus trimestris superat. Adeoque primi mensis incrementum est, ad incrementum mensis unius ex duobus sequentibus, si aequalia posueris = 3000000 24. & = 3000000

ad $\frac{10}{4}$ ad unum reliquorum mensium a 3. ad 9. Deinde fetus 12.

librarum Intra triennium dimidiam fere staturam attingit SPIGEL. de form. fet. c. 18. Intra 25. vero annos fit librarum 120. decuplo nempe ponderosior. Adeoque incrementum primi mensis est = 3000000. unius reliquorum mensium ad tertium usque est =

12. sequentium vero 10 $\frac{4}{10}$ porro unius eorum, qui a partu sequuntur $\frac{1}{60}$ primum ergo

incrementum ad ultimum 180. 000. 000. i. Tantum valet ténacitas vasorum nascentium, comparata cum duritate vasorum iam natorum. Totum vero hominis incrementum est = 921. 600. 000. 000. i. MORGAGNUS ex arbitraria 44. potentia duplicatae molis fecit rationem pueri recens nati ad conceptum = 19. 100. 000. 000. 000. i. merben. praef. p. 282. BOURGUETUS vermiculum ad elephantem marurum, facit = 18. 000. 000. / X8000. 000. 000. 000. 000. i. Lettre philof. IV. p. 138. BOESSELIUS etiam quotibet mense duplo pondere augeri voluit Comm. Nor. 1717. hebd. 34. sed fere ex conjectura. In pullo longe celerius incrementum est. Vermiculus enim galli, humano non maior, intra 21. dies fit pondere duarum unciarum (vel granorum 1152. secundum BELLINUM de motu cordis

que novem menses novem librarum pondere est. Si pergeremus ita incrementum, in senectute certe multarum millium librarum pondere foremus. Verum, quo diutius increvimus, eo crescimus minus. Pueri ad decimum annum plus incrementum, quam inde ad vigesimum; ab eo vero tempore iterum tardius ad 25. annum, in quo status est.

Vnre] Ovum convexa sua superficie replet concavam faciem uteri. Dum nempe fetus in utero manet, uterus autem disponitur ad sequentem mensium periodum, interim ovum maturius fit, vasa explicantur, & totum ovum turget humoribus albuminosis, & expanditur, testam enim non habet. Quando gravidæ cadaver secatur, & uterus caute aperitur, adparet uterum cum ovo cohaerere (4), neque ullum liquoris [5] inter concavum uterum, & convexum ovum medium interponi. Abortus certe continuo fieret, si quantillum liquoris inter ovum uterumque, medium se interponeret.

Vasculis] Ovum crescit per invisibilia vascula (6), dum humores

ab

- cordis p. 15.) nempe 96. 000. 000 ies major mole vermiculi.
- (4) Cohæsiō ovi cum utero in tenerioribus fit villorum ope, qui ex ovo imbuto resorbtis per poros humoribus & rurgente, (VALISN. c. 13. n. 6.) undique emergunt, & in poros uteri se insinuant, ibique adhaerescunt, ut uterini humores in ovum per poros eius venulosos subeant, arteriosi vero perinde in uterum se exonerent. Maturiori vero fetu manifestum est, villosam chorion villosū utero adhaerere, ita similem, ut vix distinguas, quid uterū, quid chorion sit NOORTVYCK. p. 9. 13. Validam hanc vocat adhaesionem LITRE *Mem. de l'Acad.* 1701. p. 116. & ego in femina, non exiguo a partu tempore manifesto totam uteri cavam chorion adhaerente succindam vidi, uti la MOTTE *obs.* 17. & chorion partem post abortum adhaerentem, & relictam in utero NOORTVYCK. p. 22.

- (5) Cremorem aliquando paucum super chorion effusum vidit NOORTVYCK. p. 10. & aliquid in vacca humoris HOBOKEN. *anat. secund.*

vitul. p. 16. materiem denique albam mucilaginosam VENETTE p. 273.

- (6) Placenta valde praeociter ex ovo nascitur; quantum per observationes colligo. Non ignoro HARVEIUM, ova humana in primis iniis glutinosa, & absque placenta esse pronunciasse p. 236. & exemplum pro sententia sua adferre p. 213. in fetu unguis aequali, quartoque mense rudimentum demum placenta vidisse p. 184. fibræque demum ova esse RUYSCHIIUM adfirmare, quæ aliquamdiu in utero latuerint *Mus.* p. 170. DIEMERBROECKIUM de cique placenta demum die 30. vel 40. apparere, scripsisse p. 200. Sed neque repugno, aut non credo experimentis. Interim in recenter imprægnatæ feminae utero, a RUYSCHIO lecto, invenio, ovum jam lanuginem ostendisse, SLADO teste, in ACT. HAFN. II. n. 4. In embryone non majori capite alicuius, placenta etiam vidit RUYCHIIUS *Cor. renov.* n. 43. in ovo nuci moschatæ non majori, initium placenta vidit *Id.* n. 56. In fetu

ab utero recipit, tam per eam partem, in qua placenta (?) adhaeret, quam in ea, qua chorion ovo uteroque medium interest. Nemo

Q²

hactenus

fetu octo dierum cumini semini aequali ID. *tur. renov.* p. 54. Decimo die in cuniculo placenta ortum GRAAF. p. 311. Duodecimo die ovum humanum vasis circumfusum, cum fetus milii grano non major esset SANTORIN. *ibid.* d' un feto n. 5. In embryone minimo, sustinendum ejusdem RUYSCH. *Thef.* VI. n. 43. T. 2. l. 1. In paulo majori, & fecalis grano aequali pariter ID. *Mus. rar.* p. 162. & maxima in alio semine paeoniae non majore MUS. RAR. p. 170. & alio, semini cucurbitae aequali *Thef.* IV. n. 40. Ovum humanum juglandis magnitudine, fibrosum E. N. C. Dec. II. ann. l. obs. 216. In alio, ovi columbini mole basis pene carnea *Mauriceau obs.* 213. Porro, cum fetu muscae aequali, pars ovi levis, pars fibrosa *Vater de grav. ap. par.* p. 13. Vigesimo quinto die, si experimentum verum est, magna, & lunata placenta a BIANCHO pingitur p. 58. ic. 10. Tertia, vel quarta septimana in ovi externa membrana massa carnea DIEMERBROECK. p. 185. in ovo piuarum septimanarum chorion extas villosa, & in summo initium massae sanguineae ID. p. 183. Cum fetu apisi aequali radices undique villosae BERGER. p. 476. EVERARDUS denique contra HARVEIUM, secundo mensis se prodeuntem ex membranis placentam vidisse, refert in *praef.* Apparet adeo, ovum omnino placentam educere, uteroque prius adhaerere, quam fetus perfectam figuram adeptus sit, quod HARVEIUS pro certo posuerit p. 284. & ex eo GRAAF.

p. 294. 282. & valde probabile esse, quod SIMSONUS, adfirmat placentam nasci, quam primum ovum uterum replet, & adharet l. c. p. 95. & CYPRIAN. l. c. Haec vasa, quae placenta primordia sunt, ex omni superficie ovi omnino undique exeunt *Ruyssb. Thef.* VI. T. 1. l. f. 2. 3. 5. *Heister. comp.* l. 27. & 27. *Santorin. lib.* d' un feto n. 25. *Bianchi T. I. l. f. T. II. f. Comm. Lit.* 173. *beb.* 19. T. III. l. 7. 8. *Hartman. Phil. trans.* n. 2. 8. E. N. C. Dec. III. ann. 9. 10. *ob.* 191. *Berggrav. E. N. C. Vol. V. obs.* 79. *Noortwyck* p. 110 Ex omni adeo superficie amnii filam longa, ramosa, stantia prodeunt, dicta olim *Riolano* p. 384. 712. *Ludovicae Bourfier* p. 26. & *Vienno* nov. *syss.* p. 52. excopta parte cervici proxima *Simson* p. 99. non ergo ex sola parte ovi, aut petiolo, quae ovario adhaeret, ut supra variis p. 119. & *Travury* p. 84. & *Hartfoecker suite des conj. phys.* p. 114. neque unicum haemisphaerium placenta occupat, uti *Bianchi* p. 52.

Paulo profectiori fetui, qualem sexta septimana ejectum bis aperui, universale, crassum, involutum, chorion simile est, sub eo placenta sequitur, quam amnion emittit vasculorum specie. Ita *Bianchi T. 2. l. 7.* sed ex una parte ovi, & ego, nam plerique anatomici, ad alia autem experientia, truncos ramosos ex chorio ajunt exire, & facile detergi, ut *Noortwyck* p. 119. Sed in meis hoc modo fuit. An ex sanguine coacto scitatum membranam vidi? summus anatomicus *Albinus*; mihi tamen vera membrana

hætenus hæc intermedia uterique vascula, vel microscopio [8] vidit:
Et tamen toto novem mensium tempore debent per hæc vasa duodecim
librae

brana chorii simillima visa fuit,
&c confirmare viderur lamina illa
chorii, quæ diceretur DCLXXXIX.
superexpansa placenta. Nam &c
ea ubique subjectam interius placen-
tam continet. Deinde *Harveius*,
&c *Bohnus* primis mensibus docent,
distare amnion a chorio e-
tiam decima septimana, &c *Bohnus*
expertus testis est p. 23. at-
que aquam aliquando inter duas
chorii laminas reperit *Ruyfch.*
Thes. n. 355. &c in ovulo *Schurig.*
Sylleps. p. 105. Inde elisis vascu-
lis, natae placenta illae, mem-
brarum similes, quas *Ruyfchius*
pinxit *Thes.* V. T. 1. f. 2. *Thes.*
VI. f. 4. &c describit *Adv.* II p.
29.

Sensim autem placenta retrahi-
tur *Santorin.* l. c. n. 25. ut in
fetu nuce minori aliqua pars jam
ovi absque villis sit *Trevu. Comm.*
Nor. 1735. p. 308. T. IV. f. 12.
&c in fetu mulca non majori par-
tem levem reperit *Fator.* l. c.
Die 21. placenta dimidio ovo æ-
qualis fuit *Dodart bist. de l'acad.*
des scienc. 1701. p. 25. Die 31.
placenta magna quidem, sed mul-
to minor ovo *Bianchi* f. 11. &
primo mense elapso, si *Biancho*
fides, tertiam partem fetus uni-
ce cingit p. 51. De istis ovib. ve-
rum est, ovum ea parte tan-
guineum esse, qua fundo uteri
adhæsit la *Motte* L. II. c. 24.
initium nempe placenta obf. 172.
In ovo vero quintæ hebdomadis
utique la *Motte* supernam partem
ovi villosam vidit l. c. Secundo
mense, &c ultra, adhuc totum
pene ovum placenta obducitur *Blasius*
apud *Simson.* Nona septima-
na *Backius* ex acutiori vertice
filamenta rufescentia prodire ad-

notavit. Tenth mense fere ex
medio ovo placenta flamma-
pingit *Heisterus* l. c. f. 27. sed mo-
net adfuisse plura, &c consentit
Harveius p. 230. Quinto mense
ovi pars membranæ placen-
tae aequalis est, deinde illa
crescit, & multo major fit *Sim-
son. soc. Edimb.* IV. p. 103. In
fetu suo pene adulto tertiam par-
tem ovi occupasse docet *Noor-
tvyck* p. 14. Video tamen quarta
septimana placenta hydati-
cam *Hartmanni* totum adhuc ovum
cinxisse *Phil. trans.* n. 238. Adap-
ret adeo, omnino eo majorem
placenta esse, quo fetu minor
est *Riolan.* p. 412. *Hartman.* E.
N. C. Dec. III. ann. 9. 10. obf.
191. ut pars levis in ovi initio
totum ovum occupet, in matu-
ro ovo non nisi minorem partem
IB. *Monroo Edimb. soc.* II. p. 145.
Hinc etiam acetabula fetu cre-
cente minuuntur *Aristoteles bist.*
anim. L. VII. c. 8. In brutis
autem, uti placenta alia ratio,
ita ova non villosa sunt *Hart-
mann.*

(8) Plurima de his vasis disputatio fuit,
In femina graviada videram, cho-
rion pulposam totam undique
adhaerere concavae uteri superfi-
ciei, tum ubi chorion est, tum
ubi placenta dicitur, & avulsam
fioccos trahere innumeros, aique
facile, nisi animus advertatur
lacinias utero innexas relinquere.
In alia vero femina, majori fe-
tu graviada, chorion productio-
nes emittere manifestas in sinus
uteri, uti villi uteri fe in chori
filulas implebant. Sed uberius
C. NOORTVYCK, ovum so-
lutum huiusmodi esse, ob cellulosa-
tam, &c vasa, quorum ope ad
utero.

librae humoris, totum nempe fetus maturi pondus, transisse, ut aliqua adesse necessario sequatur. Quando nunc ovum ab utero resolvitur, nullum in convexa superficie foramen est, ex quo vasa (8^a) adesse discamus.

nterum adhaeserat p. 9. 12. Ista quidem vasa numerosa a chorion in uterum ire p. 9. Sed tenerissima, & arachnoidea esse p. 11. & venosa videri, & respondere vasibus uteri, ut vas vasi occurrat, maxima vero caput aciculae admittere p. 9. Trunculos autem venosos addit majores sinus intra chorion fecisse, inde in ejus profundiora se demersisse p. 10. Fungosam adeo externam partem chorii, forte vasa esse, non repleta p. 13. Fibrillas HOBOKENUS dixerat p. 179. & DRELINCOURT de chorio n. 17. MAURICEAU p. 217. BIDLOUS T. 58. quibus chorion utero adhaerere; pelliculas molles, & mucosas, quae hinc utero, inde chorio adnascerentur MALPIGHIUS ad Spon. p. 10. VIEUSSENS de fabr. uter. & plac. Totum tamen chorii nexum omnino modicum esse, ovumque facile solvi, NOORTVYCKIUS vidit, p. 9. quod perinde reperi. Cum autem chorion placentam exterius obducatur, facile intelligitur, non aliam placentae cum utero connexionem esse, nisi quam a chorio habet NOORTVYCKIUS p. 14. Non utiliter adeo la MOTTE membranas placentae operi utero necti dicit p. 247. aut VIEUSSENS apud VOGLI, quando tunc sola involucria alii, salsumque germen nasci ait, ubi ovum utero alia parte adhaesit, quam quae chorion habet II. p. 188.

- (8^a) Ita dudum Galeus, post veteres, ova vasorum uteri eminere in praegnantibus, facere cotyledones, dicit Diocti, Praenagorae Coo, Philotimo de uteri diff. c. ult. & recte Spigelius, cotyle-

dones uteri, non placentae vasa esse, monet de form. fet. p. 2. Deinde pelliculam illam Hippocraticam adhaesi ait, ibi solum, ubi oscula vasorum sunt, hancque pelliculam in secundas fieri de fœmine L. I. veraque acetabula humana fines vasorum esse, per quae menses natarunt l. c. & de util. part. L. XV. c. 4. & vasa chorii utero innexa instar arboris dividi II. venas ad venam uterinam, ad arteriam arterias adhaerere II. & de util. part. L. XV. c. 4. Vasa minutissima placentam cum utero conjungere Fabricius P. L. c. 3. Mucosa filamenta araneorum telae similia a cornubus uteri progerminare Papi apud Vogli II. p. 19. Vascula vero capillaria superficiei chorii intexti utero Hobokenus habet anat. prior. f. 3. Radiculas villosas chorii, & acinulos placentae in sinus uteri subire Berger. p. 473. Brendel. de nutr. fet. n. 6. 9. Siphunculos etiam exhalantis uteri, qui menses fundebant, radices placentae admittere Santorinus obs. p. 218. & hunc ipsum mensium usum esse, ut vasa, quae cum placenta coniungi debent, aperiant Graaf. p. 275. Vasorum placentae ramulos extrahi de uteri poris, & erigi, & in utero respondentia foramina adparere Idem p. 296. Vascula uteri lymphaticonervae cotyledonum radices esse Vioussens nov. syst. p. 17. Infinitas arterias chorion perforare, ut ab utero ad placentam eant Roubaux. observ. f. f. mod. p. 9. Et in brutis, evellendo cotyledones multa vasa, quasi radices evelli Tilg. de plac. p. 307. ut dudum, cum tubercula avellerentur, de utero puncta

mus. Et tamen certissime via aliqua est ab arteriis minimis uteri, in venulas incipientes placentae, & chorii.

Men.

puncta rubra viderit apparere.] *Fabricius* l. I. c. I. etiam in ove P. II. c. 3. eademque viderit *Hobokenus anat. secund. vit.* p. 28. 30. f. 16. 17. Ductum ergo conjunctionis illa nota fuit, aliqua vero addita a recentioribus, quae dicuntur not. 7. 11. & addCLXXVIII. DCLXXIX.

- [9] *Maxime in Textu*] Placenta utero adhaeret non uno semper loco, Graafius notante p. 294. & *Riolanus* p. 374. & *Spigelius de form. fet. c. 2.* & *Simson* l. c. p. 81. & *A. Paucoli de bom. L. III. p. 84.* & *Cl. Bobemero de str. uteri* p. 16. pteruque tamen inter tubas *Fallopia* auctore p. 198. b. & *Riolanus*, quae eadem sedes uteri ideo magis videtur extenilis facta esse, ut tubnascenti placentae cedat *Deventer* p. 40. 41. & vasa, si- mulque majores habet *Riolanus* p. 366. *Stall.* p. 511. Alias ad laetia *Drelinhout. perioch.* 36. anterius vasa est adhaesisse, uti *Arantius* p. 15. *Deventer.* p. 38. *Soc. Edimb.* II. p. 450. *Bresl.* 1725. m. Jul. *Monroe Edimb. soc.* II. p. 228. & *Parsley.* ib. IV. p. 450. Alias posterius *Deventer.* l. c. *Noortvuyck.* p. 12. quod frequen- tius vocat *Vesalius* L. p. 672. & *Spigelius*. Aliquando praeterea in laetere dextro adhaesit *Vesal.* ib. *Peyer.* E. N. C. Dec. II. ann. 7. obs. 204. *Simson.* Edimb. IV. p. 215. *Goulike* apud *Ettmuller in- epist. probl.* 17. aut in sinistro *Vesal.* ib. *Trevu. Comm. Lit.* 1735. T. IV. f. 11. *D. Varehyen.* L. II. p. 321. *Taurvry* prope tubas adnasci ait, ut centrum alteri tubae respondeat p. 99. idque natu- rale esse, ob viscum, quem tubae generat, ovum renitentem. Ad laetia etiam uteri semper ad-

haerere *Venetio* p. 248. sed id non videtur, uti neque *Riolani* observatio confirmatur, qui primo mense placentam alteri utri angulo uteri adhaerere, paulo post toto corpore suo ad anteriorem, vel posteriorem partem adfigi ait p. 374. Ori denique interno cum summo periculo matris adhaesit in *Hist. de l' Acad. des scienc.* 1723. obs. 2. & apud *Bresl.* 1726. p. 132. & *Horne VVebmutter* p. 64. ut tamen leniter avulsa fetus nianu possit eximi *Bobmer* l. c. p. 23. Ad sedem adhaerentis placentae uterum minus, quam in ruminan- tibus, sed paulum tamen elevat *I. Sylvius* (qui forte, cum granis salis non majores faciat cotyledones, villos intelligit) *Ruyfch. Tbes.* V. n. 46. *VATER* in icon- ne, *SCHENCK.* p. 316. [ubi quinque inaequalitates numerat], *Cl. HARTRANFT. de secund.* p. 15. *DOUGL. Phil. trans. abr.* Vol. IV. T. 6. f. 2. Haec adhesio non semper aequae firma est. Laxior abortum, validior difficilem partum facit. Firmitatem adparet pendere a multitudine, & duritie ligamentorum, & vasorum not. 7. Addit *RUYSCHIIUS*, quo perfectius centro placentae funiculus adfigitur, eo validiorem nexum esse *obs. 97. Adv. anat. Dec.* II. n. 10. *de musc. uteri* p. 10. feli- cem autem aberrationem esse, si a laetere infertus fuerit *Tbes.* VIII. n. 15. Eas aberrationes *ARANTIIUS* vidit; & *SIMSON Edimb.* Hist. IV. p. 121. & *HOBOK. anat. vepi.* p. 44. 129. 232. 260. Ha- bentur etiam in E. N. C. Dec. I. ann. IV. obs. 195. & frequentio- res esse centrali infertione *NOORTVUYCK* p. 128. & nunc viden, funiculum pene margini placen-
tae

tae adhaerere, uti HOBOKEN l.c. p. 149. Sed denique haec adhaesio plerumque ad angulos inaequalis est; rarius ad perpendicularum HOBOKEN *anat. rep.* p. 44.

- (10) *Tubercula in Textu.*) In hac adhaesionis sede convexa facies placenta, uterque respondens, inaequalis est, &c tuberculosa RIoLAN p. 369. FABER *ap. Hernandez* p. 615. GRAAF p. 295. MAURICEAU p. 225. NOORTVYCK p. 19. FABRIC. ab AQUAP. *de form. fet. T. II. f. 5.* BIDLOOT. 55. 58. VERHEYEN L. II. T. V. f. 2. HOBOKEN. *anat. secund. hum. p. 14. f. 1. f. XI. anat. repet. p. 12. 22. f. 2. &c 23. Ruyss. Thes. VI. n. 90.* semiglobis naturalibus divisa Roubaulr. *Mem. de l'Acad. 1725.* p. 122. quos faciunt magni rami vasorum placentae, IDEM ibidem p. 123. incerto numero, plures certe, quam quinque, uti numerat *Bartholinus hist. 61. Cent. I. sulcis inter tubera distincta Bartholin. l.c. Mauriceau. p. 225. Roubaulr. off. p. 8.* qui respondent similibus uteri inaequalitatibus supra dictis, non in teneris solis placentis, quale exemplum *Bianchus* pingit i.e. XI. sed in matura etiam placenta, &c a peritis extracta anatomicis, ut a *Ruyssio Thes. V. T. I. f. 1.* quod ex icone patet, aut in utero relicta apud *Noortvuyck. p. 14.* cisi *Ruyssius* videatur rudiori encheireli tribuere ib. n. 57. parvique *Roubaulr. p. 8.* de profundiori forte fissura locuti, qualis aliquando ad oppositam membranam usque penetrat *Idem 1714. p. 181.* Sed neque optime ex *Sylvio* millares vocat asperitates *Riolanus* p. 369. quae adeo magnae sint. In eos sulcos chorion descendit *Noortvuyck p. 19 &c. conf. DCLXXVIII.*

- (11) *Pari proportionis.*) Haec nunc placentae adhaesio firmior est, quam choril. In utero semper crescen-

te uteri superficies interna rarior est *Vesal. p. 657.* vasa ampliora, enormis diametri *Noortvuyck p. 12. &c. digitalia Edimb. IV. p. 450.* sinus aperissimè DCLXIV. ut digitum admittant *Edimb. Sec. V. p. 450.* ita via aperitur, ut sanguis versus placenta determinetur *Simson. p. 75. 77.* dum per uteri gravidi venas, compressas a tumore sinuum, sanguis difficiliter rediit *Id. ib. &c ex eadem ratione* uterus distenditur, sanguine per arterias in laxos sinus irrudente, neque redeunte per impeditas venas p. 77. oscula vero sinuum laxata chorion, &c placenta facilius admittunt *VATER uter. grav. p. 13.* Haec vasa patula, plurima in utero, maxima sunt, ubi placenta adhaeret NOORTVYCK p. 12. Tunc etiam vasa numerosa ex placenta manifesto eriguntur, porisque uteri se inmittunt paulo majora, quam in chorio NOORTVYCK p. 10. Huiusmodi vasa etiam GRAAFIUS dixisse videtur T. XXII. &c DEVENTER p. 49. quando placenta conglutinata uteri vasis describit, ut absque sanguinis effluxu nequiret detrahi, hinc per totam superficiem villosa esse. Sed etiam DRELINCOURT. *Per. 37. &c BRENDLIUS* bulbillos vasculosos placentae subire in vaginulas s. cavernulas uteri docet n. 9. &c in superficie placentae, versus matrem oscula aperta vidit MAURICEAU p. 225. Porro vascula in superficie placentae nuda dixit FABER l. c. p. 615.

Inprimis autem adradrem placentae, similiterque, quo a chorio separatur, placenta firmiter adhaeret per ligamenta NOORTVYCK T. II. fibrarum ligamentorum nomine osim RIoLANO dicta p. 369. &c cellulosa tenaciora p. 10. &c vasa magna T. II. A. A. A. quae digitum recipiunt NOORTVYCK p. 10. sicut.

Menstruae) Feminae semper [12] concipiunt post ultima menstrua, & vix ullo alio tempore. A primo congressu post menses feminae sanae possumus tempora graviditatis dimetiri. Si die v. g. 4. menses menses uxori cessarunt, quanto vero virum admisit, potest tuto graviditatem ab eo coitu repetere, licet multi alii ante primum mensem reditum successerint. Neque aequae feliciter fuerit, si alio tempore conceperint, Nam fetus primo tempore, quo in utero haeret, non potest non turbari ab accedente fluxu mensium. Quae seminae non magnam iacturam sanguinis pati solent, eae vix abortus patiuntur, facile vero tertio mense se tum perdunt, nisi venae sectione copiam sanguinis minuerint. Si enim effluerit tantum sanguinis (13), ut inter ovi gibbam uterique cavam faciem se insinuet, tunc ovum solvitur, & haemorrhagia fit.

In

sinusque sunt mollissimi, venosi T. II. C. in quos vasa parva ex profunditate placentae infunduntur p. 10. T. II. G. In hos sinus inatena uteri vasis injecta veni NOORTVYCK l. c. respondere enim videntur magnis eo tempore uteri sinibus ALBINUS apud NOORTVYCK p. 11. non satis sèper manifesto NOORTVYCK ibi. cum videntur angustiora reddi versus uterum, neque vasa habere in utero, quae sibi respondeant. Ea etiam in cotyledonibus cuniculi pars alba, uterina, glandulae, foramina habet, per quae rubra pars, fetui propria, infunditur GRAAF. p. 314. & olim MALPIGHIUS, in sinuosis cavitatibus uteri succum colligi, qui per fistulosas radicales venas fetus infillaretur l. c. p. 35.

Caeterum ex hac descriptione adparet, quam necesse sit in earatione, qua uteri vasa, sinusque distenduntur, etiam placentae vasa, adeoque fetum incrementum. Vis enim eadem, quae sinus replet, & vasa uteri, respondentes etiam sinus, & occurrentia vasa placentae distendit.

- (12) Femina concipit post menses GALEN. de diff. uter. c. ult. MAURICEAU p. 205. Dionis. accouch.

p. 127. 169. ad diem sextum usque MANNINGHAM p. 50. etiam nimios Comm. Nor. 1712. bbb. 6. hocque optimum tempus est MAURICEAU p. 62. HARVEI. p. 271. Etiam post uteri haemorrhagias facilis conceptio la MOTTE obs. 212. Hinc olim ad conceptum venerem sub mensem finem laudat PAULUS L. III. c. 74. & hoc arcano dicitur FERNELIUS sterilitatem Catharinae Medicae vicisse VENETTE p. 43. Addit HARVEIUS, etiam instantibus mensibus bene concipi l. c. quod contrarium videtur observationibus prius adjectis, ob menses continuo secutos. Vasa quidem uteri tunc humidissima sunt. Etiam mensium tempore, concipi potest MAURICEAU obs. 676.

- (13) Hinc illae observationes RUYSCHEI, quas etiam bis proprio experimento vidi confirmatas, placentas abortuum bimestrium. Tab. IV. n. 81. & trimestrium Tab. VI. n. 100. sanguine grumoso adhaerente augeri, ut majores videantur, quam sunt, conf. Tab. VI. n. 15. & in minimo fetu capiti aciculae aequali placentam cruore imbutam se vidisse Cur. renov. n. 144. Ovum extus cruore tinctum habet Berger. p. 469. Pla.

In ovum) Omnis pars Chorion adhaeret utero, vera concretionē, maxima tamen adhaesio est, ubi placenta ponitur, per istam enim, quae prius fuit vitellus, praecipue fetus alitur. Maneat in mora placenta, & fetus expellatur, ne una quidem sanguinis gutta effluet. Si vero etiam placenta exiverit (14), tum verò sanguis quasi de victima summo impetu exsiliet integris unciiis. In partu naturali nullus sanguis profluit, nisi postea, quam chorion, & placenta de utero solutae fuerunt. Ergo sanguis steterat ante placentaē superficiem. Sed non stagnavit ibi, id enim circulationi sanguinis repugnaret. Ergo videtur placenta cum utero in unum quasi corpus coalescere, ut fetus unam cum matre vitam vivat, unum calorem habeat, & motum, & ab ea alimentum accipiat.

§. DCLXXVII.

Funiculo] Magna in origine funiculi obscuritas est. Si dicas, ex vermiculo [1] masculino oriri, respondendum est, quomodo ad placenta-

Placenta cruore plena cum fetu fabae magnitudine MAURICEAU *obsf.* 259. Hic sanguis irretit fibrillas ramosas placentaē, molisque efficit NOORTVYK. p. 120.

Aliquando tamen menses prima vice fluere post conceptionem *Stegmündin.* p. 192. *Mauriceau.* *obsf.* 629. 453. 366. & altera vice E. N. C. *Dec. I. ann. 6. 7. obsf.* 63. *Mauriceau.* *obsf.* 168. & aliquoties *Dionis.* p. 163. ad quintum mensem E. N. C. I. c. *Mauriceau.* p. 72. totoque demum tempore *Stegmündin.* I. c. *Dionis.* p. 163. & copiosa exempla prostant, mentium, & stillicidii innoxiorum, in gravidis *Pachlin.* *obsf.* 36. *Cent. I.* E. N. C. *Dec. I. ann. IX. obsf.* 29. *Mauric.* *obsf.* 389. *Dionis. des accouch.* p. 171. *Deventer.* c. 15. &c. ut sunt, quae tunc inprimis, quando utero gerunt, menses patiantur E. N. C. *Dec. I. ann. 3. obsf.* 348. *Cent. 3. obsf.* 75. *Comm. Bonon.* p. 152. In plethoricis gravidis menses abique noxa fluunt *Rousset. Sect. VI. p. 153.* E. N. C. *Cent. I. obsf.* 46. *Dionis*

&c. Alias etiam haemorrhagiae, in gravidis accedentes, neque parium, neque mortem praecipitanti, summa cura adhibita. *Mauriceau.* p. 160. *obsf.* 30. 247. 356. 410. 420. 540. 541. 543. 595. 648. E. N. C. *Cent. X. obsf.* 47. PUZOS ACAD. de CHIR. I. P. II. p. 212. Exiguitas fetus, & debilitas, & eximia plethora priora phaenomena explicant: exiguitas autem partis separatae, & maior latitudo ejus, quae adhaerens remansit, posteriora. Naturaliter tamen a sanguine, post primum mensem effluente, abortus sequitur HIPP. MAURICEAU *obsf.* 336. seuque nimis exigui MAURICEAU I. c.

(14) DCLXXXV.

(1) Nullum dubium est, funiculum pertinere ad id, quod prinævum itamen est animalis. Ita suadet analogia seminum plantarum. PERRAULT *mecan. des anim.* p. 486. tum peritonei in involu-
crum funiculi productio, deinceps origo

ram adhaerit, & quomodo vena ex fetu prodierit, venae enim eunt ad cor, ex corde non veniunt. Si ex placenta velis provenisse, quaeretur, quomodo in abdomen fetus radices agere potuerit, & arterias inferre aortae? Abstrusum certe, quidcunque moliaris, negotium est. Iterum DEI hic digitus est, qui omnia simul fecit, quae possunt per experimenta singulatim addisci, simul autem observari nequeunt, uti simul a CREATORE facta sunt. Eo tamen animus mihi inclinat, ut credam funiculum a prima origine cum fetu adfuisse, viamque esse, per quam primum seminale animalculum irrepsit. Id certum est, fetum secundo jam mense (1) ad placentam suam adfigi per proprium suum funiculum. Is semper eo major est (3), quo fetus tenerior, & propior origini, eo minor

origo arteriarum ex aortae trunco, quae non aperiri potuit, ut ramos faceret, absque exitu fetus; & analogia oviparorum, in quibus utraque membrana vitellii fetui propria est MAITREIAN p. 199. & altera intestinorum membranae continuatur p. 195. Videtur autem arteria, venaque umbilicalis in vermiculo fuisse organum, per quod egressi superflui, resorbant aliquos necessarios humores, ex ipso semina li liquore: tunc autem conceptum secundum esse, quando arteriae umbilicales se in respondentia ovi vascula inmittunt DCLXXII. not. 1. r. Ante id tempus intra abdomen fetus luvuisse credibile est, & ipsa illa actio, qua conceptus perititur, primum erupisse. Ita vicissim non in pullo solum, per MALPIGII observationes, & LANCISI de corde p. 44. sed in dama, & reliquis animalibus viscera paulatim in pectus retrahuntur, quae nuda prius fuerant HARVEI exerc. 69. p. 234. &c. Cl. HEBENSTREIT in proprio Programm. funiculum ad secundas, non ad fetum pertinere maluit. Confer etiam BOURGUETUM *lett. phil.* III. p. 89.

- (1) Dudum ante hoc tempus. In fetu 7. die funiculus BIANCHI f. 5. In embryone octavi diei non majori

grano cumini funiculus, & placenta RUYSCH. *cur. venor.* n. 54. In abortu capite aciculae non majori funiculus ID. ib. n. 143. In funiculo die decimo umbilicus GRAAF. T. XXVI. f. 8. In fetu duodecim dierum mihi grano non majori funiculus umbilicalis, rubra jam distinctus linea SANTORIN. *liber.* n. 5. In fetu formicae multo minore pingit BIANCHI T. 1. f. 5. &c. describit BERGER. p. 459. in fere simili. In fetu cervino dimidio lupino non majori, funiculus LUDOVICI E. N. C. Dec. I. ann. 8. obs. 17. Non male adeo GALENUS, prima omnium vasa umbilicalia oriri de *form. fet.* Sed quatenam sunt duae radices dorsales, quas VAROLIUS ante umbilici funem apparere, dorsoque immittere, eoque apparente in fetu apud mole evanescere scribit p. 103. 104. &c. repetit ex VAROLIO RUPERTUS BESLER obs. p. 10. ? PAVVIUS, pro arteriis umbilicalibus habet obs. 16. sed manifesto distinguit inventor.

- (3) In fetu feminis paeoniae mole RUYSCH. *musf.* p. 170. &c. in altero feminis cucurbitae aequali, funiculus aequalis fetui *Thef.* IV. n. 40. Eadem in seminuiali proportio *Thef.* VI. n. 47. T. 2. f. 5. Crassior etiam funiculus, quem pro hydatide habet IDEM n. 45. T. 2. f. 3.

minor vicissim, quo propius partus abest. Thesaurus RUYSCHIANOS, nunquam non doleo (4), ex interiori Europa in Russiam exportatos nobis perisse. In iis thesauris (5) antropogenia erat, quam nunquam absque admiratione vidi, sed vidi saepe. Fetus humani erant, a grani fabuli magnitudine, ad aetatem novem mensium. Vidi ibi, ovum eo majus (6) esse, pro fetus sui portione, quo fetus propior origini, & vicissim eo minus, quo propior idem partui fuerit. In primis initiis fetus fere vigecuplo minor est ovo: post tres menses ovum abortivum anserini ovi mole majus est, fetus autem pene pollicis. In puero vero recens nato infans triplo ponderosior est conjuncta mole placentae suae, & funiculi, & secundarum. Situs fetus in ovo is est, ut id in verticem

R 2

acu-

f. 3. forte nihil a naturali differt: ipse enim similem vidi bullae verrucosum funiculum, in cujus altero fine punctum rubrum arteriam indicaret. Latum etiam habet BIANCHI f. XI. HEISTER f. 27. DIEMERBROECK, in feru octo septimanarum p. 184. & HARTMAN *Phil. transf.* n. 238. & TREVIUS *Comm. lit.* 1739. f. 9. 10. 11. & in universum primaevi fetus funiculum latum, brevemque esse DIEMERBROECK l. c. & BIANCHI p. 55. Alibi tam gracilem, & longum pingit in aequae parvis fetibus RUYSCHII ib. f. 2. 4. Porro dudum VAROLIUS funiculum brevem esse, quamdiu fetus musca non major est p. 104. Deinde in his omnibus exemplis absque intortu spiris est. Sensim torquetur. Inter tertium, & quartum mensem bis circa collum intortum vidit CHAPMAN. *improv. of. midwifery case* 39. Strangulatum autem funiculo nimis comorto fetum LITRE 1701. p. 218.

- [4] Ipse tamen PRAECEPTOR suaserit, ut amicus thesaurus venderet, non alium facile reperturus Maccenatam, qui triginta flororum millibus offa, & repleta, cera viscera redimeret.

- [5] Enumerantur fere in *Thesuro* VI.

Ab eo tempore novos reparavit fetus, in *Thes.* maximo, & in *curis renovatis* recensitos.

- [6] Verissimum est, & ab ipsa enormi parvitate vermiculi pendet. Vide RUYSCHII *Icones Thes.* VI. f. 1. 2. 3. 4. 5. Ibi fetum minutum pediculi fere magnitudine pingitur ovum vero fescuncem longum. Maximi vero fetus ovum paulo majus est, cum fetus avellana potius major sit. Ita SANTORINUS die 12. fetus mulii grano, ovum pinei putamini aequale vidit l. c. Quando fetus hordei semini aequalis est, ovum columbino non minus est; quando fetus apis magnitudinem habet, ovum gallinae par est VAROLIUS p. 103. Ovum fescuncis diametro, vigesimo primo die fetus exiguus DODART. *bist. de P. Acad.* 1701. p. 24. In puero api non majori ovum gallinae super la MOTTE *obs.* 134. in *resp.* & 338. 381. & duabus tertis palmae *obs.* 304. PINAEUS denique die 12. vel 22. fetum formicae aequali aquarum siliam describit p. 138. Idem confirmat funiculi GRAAFIANI, cum cellulis suis comparati. Et in universum ovi in fetus initiis rationem maximum esse observant HARVEJUS, DODART. l. c.

acutum extenuetur, in eo vertice [7] autem fetus sedeat: uti in embione vidi, qui formica non major erat.

Vasis] Funiculus umbilicalis neque membranaceus (8) est, neque cartilagineus, sed firmior vasis, mollior cartilagine, & quasi *χρυσόειδος*. Ita factum est, ut vasa in situ firma retineat, neque tamen obstit aut flexilitati

(7) Non invenio. Plerique setum in medio pingunt. VATERUS ab initio setum lateri ovi adhaerere scribit *mol. praegn.* n. 6. idoneus auctor. In praegnantis feminae ovo acutus vertex erat, descendens in cervicem: in eo fetus NOORTVYCK p. 104. conf. p. 14. 15.

(8) Funiculus in universum nomini satis respondet, intortus spiritaliter ROUHAULT l. c. f. 1. 6. 8. BIDLOO T. 60. &c. fulcisque notatus per longitudinem BARTHOL. p. 318. &c. cylindricus plerumque, nam etiam inaequalem vidit ROUHAULT, & pro latitudine praelongus, ad duas tertias ulnae & ultra MAURIC. obs. 401. Involutum a peritoneo esse dicitur, manifeste continuato, ROUHAULT *observ.* p. 25. ut etiam herniam viderit ALBINUS, ab intestinis in funiculum illapsis, & similem DOUGLAS *de periton.* n. 28. sed de peritoneo mihi nondum liquet. In opposito fine, utique involutum venit ab amnio HOBCKEN p. 28. & *secund. vetul.* p. 80. subtile, sorte, inseparabile. Sub eo sequitur mucus ille ARANTII p. 27. substantia nempe cellulosa, HOBOKENO fibrosa, membranosa, & humida dicta *anat. secund. hum.* p. 28. 50. & RUYSCHIO nota, qui spongiosam pridem dixit *Thef. l. aff.* 3. n. 7. & BIDLOO, ut ex icono video T. 60. f. 4. uberius autem ROUHAULT, qui *spongiosum corpus* vocavit *Mem. de l'Acad.*

des scienc. 1714. p. 406. f. 9. 10. 7. & in *Off. Fis. Med.* Verae nempe cavernulae sunt, majusculae, continuatae, ut per totam longitudinem insarsi possint, ab ipso fere umbilico ad placentam ulque, aut ad primam certe adhaesionem amnii, & vasorum divisionem ROUHAULT *observ.* p. 26. Haec cellulosa fabrica aquam resorbet, hinc rarefit macerando, & funiculus in aqua turget NOORTVYCK p. 29. Paulo citra umbilicum desinit, quinque fere lineearum ab abdomine distantia. ROUHAULT *Mem. de l'Acad.* 1715. p. 136. Haec cellulae gelatina plenae sunt limpida, sive viscoso succo FABER apud HERMANDEZ, p. 615. ROUHAULT *off.* p. 26. Mucocomparavit BIDLOO ad T. 59. gelatinae VVARTON. p. 243. & DIEMERBROECK p. 221. Exprimi potest in recente RUYSCH. *Thef. l. aff.* 3. n. 7. & sapore est quo amnii liquor, VVARTON. l. c. Hoc est simplicissimum serum, quod umbilico recto stillare vidit VALISNERIUS II. p. 51. neque optime solis ruminantibus tribuit TAUVRY p. 134. Vasa succifera funiculi BIDLOO dicta, & MUNNIKIO p. 28. quorum ostia pingit ille. T. 60. f. 2. 4. negat vero COVVER. ad T. 58. videntur mihi hae ipse cellulae esse, neque alias credo esse papillulas innumerabiles, quas terminare gelatinam funiculi VVARTONUS dixit p. 243. neque demum alia sunt vasa

litati (9) propriae, quam frequentes fetus motus, & subsultus necessarium reddunt, aut sanguinis per venas, & arterias itineri. In hoc funiculo duae arteriae sunt, vena unica, intortae omnes. His vasis praeter arteriam, & venam urachus [10] accensetur, qui ad allantoideam, aut Cl. HALE sacculum, tendit: Vena autem ad sinum portarum fetus fertur. An eo radicatur ex placenta orta (11)? an in placentam se infigit, postquam de corpore profiliit? Utrumque difficile est intellectum.

§. DCLXXVIII.

Crevit] Uteri cavitas nihil, nisi ab ipso utero, ejusque arteriis admittere potest. Idem autem uterus impraegnatus in eadem ratione amplior (1) fit, in qua fetus increvit. Id admiratus est GALENUS [2], quod uterum videret perinde crassitie augeri, uti ambitu crescebat, cum tamen omnes aliae membranae (3) expansae gracilescent. Non ideo dixerim, uterum impraegnatum virgineo crassioresse; id volo, videri crassioresse intuentibus, quia crassities non minuitur, dum ambitus supra modum augetur. Hic autem uterus intus non levis est, sed in quae-

vasa illa lactea DIEMERBROECKII, quae per funiculum ad amnion, & chorion credit ire p. 211. 222. &c. In hoc corpus septa descendunt, dicta CL. NOORTVYCK. p. 24. 30. ad placentam firmiora p. 23. quae figura, & directione variant ib. ut modo parallela sint, modo se ad figuram literae T faciant, modo duos circulos minores de maiori rescindant, quod cum ROUHAULTI icone satis convenit NOORTVYCK. T. 3. f. 5. 6. 7. 8. totamque cellulofam fabricam in tres partes dividunt, quarum quaelibet unum vasorum fetus continet. Venam tamen magis plerumque superficiei esse Rouhault. p. 407. f. 9. 10. In homine funiculus longior est quam in ullo brutorum, triplo & quadruplo ARANTIUS de fetus p. 23. GLEMENS de funic. umbil. ut fetum iniris modis ambiat, & aliquando strangulasse videtur RUYS-

CHIUS *obs.* Chir. XI. RIOLAN. p. 179. COMM. NOR. 1711. *ibid.* 20. MAURICEAU *obs.* post. 132. aut aliquin nodis se contorfit MANNINGHAM p. 7. MAUR. *obs.* 312. 567. *post.* 18.

- (9) Hoc imprimis facit cellulosa fabrica muco plena. ROUHAULT credit idem corpus arterias, & venas comprimere posse p. 34. ita sanguinis motum adjuvari. Id vero a gelatinoso, & mucoso corpore non expecto.
- (10) DCLXXXIV.
- (11) Confer. not. 1.
- (1) Conf. DCLXXV. not. 5.
- (2) Contrariae tamen sententiae auctor, nam uterum sub initia impraegnationis crassescere dixit, deinde iterum ante partum extenuari ib.
- (3) Recte DEVENTER membranas per motus intumescere monet p. 34.

quaedam quasi tubercula (4) intumescit in muliere, ad quae asperae, asperae eminentiae placentae ita congruunt, ut jugis sulci placentae occurrant, tubera vero placentae in uteri convalles, se influunt. Hinc fit, ut, dum auferitur placenta, in utero foveae adpareant, mucos plenae [5], uti tubera placentae in eadem mucos ponuntur. An vasa minima sunt, quae mucus videntur? Non absque frequentibus exemplis est, vasa minima corporis humani muci (6) specie adparere.

Sanguis] Femina impraegnata menstruum sanguinem nullum emittit, is adeo unice utero impenditur, & is solus increscit, dum reliquum totum corpus detumescit.

Fetum

[4] Ex VATERO confer. DCLXXVI. 10. ego vero in duobus gravidis uteris nulla memoria digna vidi. Placentae vero tubera plerumque chorio super fissuras ductolevigantur.

(5) Aut ex brutis habet PRAECEPTOR. aut sinus vult mucosos dictos DCLXIV. Vasa vero exhalantia uteri villorum specie, & floccorum apparent.

(6) Intestinelorum villosa tunica, & cortex cerebri.

(7) *Ipsum sanguinem, in textu*] Initia ovi tota alba sunt, indicio, nullum tunc rubrum sanguinem per vasa uterina in fetum venire. Deinde apparet color ruber. Punctum saliens in viviparis jam apparet, quando fetus adhuc galbae vel carinae similis est HARVEI p. 280. & etiam prius, vigesima quarta hora, sanguis in funiculo apparet, quando in fetu nihil rubri adeit MAITRE-LEAN p. 53. neque cor apparet p. 62. Decimo die, & octavo etiam in funiculo aliquid earneum ex LALAMENTIO lego citari. Decimo die a conceptu in sue sanguineus circulus, & vena rubra ramosa COITER, p. 124. In fetu cervino dimidio lupino non majori nondum figurato, punctum rubrum, & venae D. LUDOVICI E. N. C. Dec. II. ann. obs. 17. In cuniculo ovo nondum

adnato, prius, quam galba adpareat, punctum saliens GRAAF. p. 280. In fetu bruchio non majoris hepatis jam rubrum PLATER in *quaest. phys.* Duodecim die, in cuniculo duo puncta sanguinea GRAAF. p. 311. in cuniculis die XI. duo puncta rubra in fetu COSMOP. p. 50. In catulo die 14. circulatio sanguinis rubri MURALT. *vadem*. p. 122. 193. In homine 12. die rubra linea in funiculo umbilicali SANTORINUS *istor. d' un feto* n. 5. Non ideo volo, eo tempore sanguinem a matre ad fetum venire. Nam etiam in pullo gallinaceo biduo ad incubatione ovi rubedo conspicua fit. Liqueor vasorum umbilicalium ante 48. horas luteus, deinde rubiginosus, denique ruber est LANCISIUS *de corde* p. 42.

(8) Veteres omnes nascens animal per umbilicum nutrirı docuerunt, & ipse DEMOCRITUS apud PLUTARCHUM *de plac. philos.* L. V. c. 16. ARISTOTELES docet fetus radicem umbilicalem esse, & alimentum capere fetum ab utero venis *de gener. anim.* L. II. c. 4. camque comparisonem ornate proponit MONROUS *Edim. soc.* II. p. 217. HIPPOCRATES pariter, uti plantam ex terra, ita fetum ex utero nutriti ait *de nat. puer.* n. 5. 35. & manifestius ibi n. 5.

Fetum mitti) Magna hic inter eruditos viros dubitatio [8] intercedit, an omnino verus, ruber, sanguis ex utero, per fines arteriarum uterinarum, in venas placentae, tunc in venas umbilicales eat, atque adeo

n. s. menstruum sanguinem circumfundi placentae, & in fetu retorberi, tum demum membranas subnasci n. s. Secundarum principium esse arterias vasasque, inosculatas in uteri venas, & arterias GALEN. *de format. fet. it. de diss. vulv. conf. not. 7.* ad DCLXXVI. Hoc etiam nutritum tum unice admittit COLUMBUS p. 250. LAURENTIUS L. VIII. cap. 24. PERRAULT. *mechan. des anim.* p. 485. MERY. *Comm. Par.* 1708. 1709. & VOGLI & alii.

Deinde utraque via, & per umbilicum, & per placentam alimentum advenire HARVEIUS, proposuit, quem sequuntur BARTHOLINUS *anat. renov.* p. 315. GRAAF. p. 291. DRELINCOURT. *Periob.* 35. NEEDHAM. c. 2. DIEMERBROECK. p. 223. TAUVRY. *de la gener.* p. 148. KAAUVV. l. c. CHESELDEN. l. c. *Vater. Mola praegn. Gibson.* in *Edimb. soci. eff. T. I. Schelhammerus* deinceps primis mensibus per solum os, sequentibus per umbilicum, ultimis denique per os nutrir, voluit *exerc. 12.*

Sed priori seculo tota res in controversiam vocata est. Alii fetum quidem per umbilicum nutriti adfecto succo chyloso concesserunt, sanguinem autem ab utero materno ad fetum transire, aut immediatas uteri cum placenta vasorum rubrorum anastomoses esse negaverunt. Princeps est ARANTIUS *de fetu* p. 14. POTIORIO LANUS sanguinem quidem a matre in fetum venire p. 373. ex tubulis, & elicibus uteri in placentam p. 376. sed effundi,

roris ad modum, inde ab arteriis umbilicalibus exiit p. 395. Satis adfuit est SPIGELLI opinio *de form. fet.* c. 9. & FABRICII, qui negatis parulis anastomosis P. l. c. 5. descendit subtiliores, venis placentae quasi in ansulas factis, & contiguis cum uteri cavitatibus ib. & P. ll. c. 4. Anastomoses etiam negant HARVEIUS *exerc. 57.* *Vfbar-tonus* p. 235. 252. &c. *Diemerbroeck* p. 205. 219. Alder l. c. *tu Mangeti bibl. anat.* p. 547. Bohn. p. 25. Brendel. l. c. n. 10. Hofmannus *med. syst.* I. p. 346. Verheyen. l. 2. p. 365. Hobokenus *anat. secund. vital.* p. 108. &c. & Ruysschius, & Tauvry p. 135. (ineonstantior, nam alibi p. 136. in carnivoris succum sanguineum admittit.) & inter recentiores MORRIS *Ess. of. Edimb. soc.* ll. p. 144. &c. Inter eos Hofmannus inprimis, & nuper MORRIS, liquorem nutritium effundi ex uteri vasis, & a chorio retorberi volunt p. 133. vasisque chorii opposita utero hare p. 128. 129. & priores alii aliter.

Videbant nempe cotyledones in ove, & vacca quasi divisas esse, ut pars utero adhaererec. *Vfbarton.* p. 239. *Needham. de form. fet.* c. 2. *Hobok. vital* f. 15. 30. alia pars fetus sit, *Vfbarton.* ib. *Needham.* ib. *Berger.* p. 471. *Hoboken.* l. c. f. 16. & illa ab utero *Casnop.* p. 122. 60. *Berger.* ib. haec a fetu ID. ib. vasa habeat, *Diemerbroeck.* p. 201. in cervæ vero ipsae chorii glandulae dimidia parte sanguineae sint, & ad fetum pertineant, dimidia glauinosae, & facile separabiles

adeo a corde matris, per canales continuos, sanguis ruber per hepar fetus in cor adferatur. An vero potius probabile sit liquida tenuiora sanguine ex sanguineis uteri vasis secedere, atque in placentam transire. Mihi optio non difficilis videtur.

Haemorr.

A. Hafn. vol. II. p. 226. idemque in leporis placenta verum esse *Taury*. p. 100. & parrem albidam uterinam cotyledonis, a parte setui propria rubente separari posse,eductis filis *Graaf*. p. 295. *Tiling. de placent.* p. 43. 103. aut in partu separari *Stalpart. de nutrit. fet.* p. 561 absque ulla sanguinis profusione, *Harder. apiar. obs.* 8. *Langleya Schratro* editus p. 163. E. N. C. Dec. II. ann. I. obs. 154. *Aldet* p. 548. *Vireff. nov. syst.* p. 41. solo stillante de ductis fractisque vasculis serofolacteoque muco, *Harvei* p. 240. 241. *VVarton*. p. 235. *Cosmop.* p. 60. *Charleton*. p. 45. *Hoboken. secund. vital.* p. 32. Porro *Galenus* pulsum arteriarum placenta ab arteriis fetus pendere, hisque ligatis cessare expertus est *de placit. Hipp.* & *Plat. I.* VI. *Harveius* arteriarum matris cum fetus arteriis asynchronon esse observavit p. 290. & *Stalpart.* p. 548. & eas arterias pulsare post matris mortem *Harvei* p. 291. Hinc fetus maturos per semihoram sere a morte matris superesse citat. *Dieffenbach. diss. de exc. fetu.*, per horam autem *Roubault. observ.* p. 52. bis repetitis experimentis, & *la Motte* l. IV. c. 6. *Stalpart.* l. c. p. 556. *Tabor. exerc.* p. 227. *Harvei* p. 290. & duabus horis *Mauric. obs.* 315. & diutius E. N. C. Dec. II. ann. 5. obs. 15. & duodecima hora ib. obs. 137. & altero die *Dieffenbach. l. c.* ex *Dolato*. Vivum etiam ex mortua matre fetum exsectum fuisse *Arantius*

inter *Scholzii Epist.* V. p. 297. *Vetlingius Viardel.*, *Hagendorp.* *Nymman*. p. 35. ex *Hor. Augusti*, E. N. C. Cont. III. obs. 57. *Mauriceau* l. c. neque alios esse illos Romanorum Caesares *Plinius* L. VII. c. 9. Sed etiam viperæ cauti ex matre secti bihorio supervivunt *Severin. Zoot.* p. 360 & canem caelestem vidit *Boyle. exp. phys. mecb.* p. 41. & cuniculum *Harveius* p. 290. *Mochus obs.* 9. & aliquando a morte matris vivi ex utero eruperunt infantes DCLXIV, DCLXXXV. Adeoque satis certum est non a matre, sed a fetu motum sanguinis in fetu pendere *Nymman*. l. c. *Harvei* p. 290. *Berger.* p. 435. *Roubault. off.* IV. passim. Hinc, incisis catellis gravidis praegnantibus, fetus non exsanguis reddi *Falconet* citatus a *VVeissero d. de sang. circulo*. Addebant varii, vasa chorii minora esse, quam quae sanguinem resorbant, ut *MONROO* p. 144. Deinde aquam *Stalpart. de nutrit. fet.* p. 558. liquores coloratos ceramve arteriis uteri impulsam, placentam non subire *Hafman. Pozzi* p. 66. *Monroo* II. p. 145. 142. [etiam de mercurio] *Harder. apiar. obs.* p. 37. si integra fuerit *Stalpart.* l. c. p. 558. neque a fetu in uterum ire, sed per venas umbilicales redire *Hofman. Berger.* p. 474. aut aegre certe per hypogastricas atque exigua vasa fetus repleri *Cl. Gravel de superf.* p. 19. Porro *Monrous* objicit, sinus uteri enormiter magnos, fila secundarum minutissima esse, ut mani-

festo

Hæmorrhagia] Inter mille, quot vidi, abortus vix centum fuerunt exempla [9], in quibus non eo tempore contigerit ea calamitas, quando menses tertia vice recurrere oportuerat, tertio nempe mense gestationis solent seminae percipere fluentem per vaginam sanguinem, quasi menses decederent; tunc continuo, si rerum suarum peritæ fuerint, abortum expectant imminentem. In hoc malo plerumque uteri, quam non potuit consumere intrementum fetus, tenelli hætenus; urget chorii superficiem, adplicatam utero, & dimovet, & effluit. Nunc facile visū est, nisi cum utero placenta communicaret, & nisi prius purus sanguis ad superficiem ovi consuevisset fluere, remota chorio, non purum, quasi mensium, sanguinem fluxurum fuisse.

Partu

festo sibi non respondeant p. 131. &c. consentit experimentum D. Noortvuyt. p. 11. Sed etiam fetus vitales aliquando (*Car. Steph. l. II. c. 3. Muralt. colleg. anat. p. 629. Buchner. misc. 1717. p. 64.*) editos fuisse, cum secundæ corruptæ essent, aut uterus corruptus E. N. C. Dec. I. ann. 8. obs. 69. aut abscessu exelū ib. ann. 2. obs. 180. Denique *Stalpart. l. c. Hoboken. anat. repet. p. 352. & Ruyschius, inventa sua membrana, quæ placenta reteret convexitatem, etiam firmius negaverunt, sanguinem ab utero ad placenta venire Tbes. II. ass. IV. n. 18. addiditque Ruyschius, se eam membranam lapideam vidisse & de musc. uter. p. 10. Conf. Tbes. V. n. 57.*

Alii audaciores, nihil omnino ab utero per umbilicum ad fetum venire volunt. Fuisse enim repertos vivos fetus, qui absque umbilicalibus vasis increverint L. Bourgeois I. p. 43. Cocton in Epbem. Gall. an. 1673. *Stalpart. van der VViel. obs. 32. Cent. II. E. N. C. Dec. II. ann. 7. obs. 209. fufc, & accurate, Ill. Sæperville Phil. trans. n. 456. & natum aliquando maturum puerum,*

cui in ipso matris utero vasa umbilicalia coaluissent *Peyer de uracho n. 12. aut abrupta fuissent Heijser. n. 37. tum lepusculum repertos, in quibus nullum umbilici vestigium fuerit Comm. Lit. 1733. n. 27. & nodum in funiculo umbilicali insignem fuisse, absque impedimento nutritionis Mauriceau p. 222. obs. 567. 312. Petit. Comm. Paris 1718. obs. 2. &c. insignem tumorem Ruysch. Tbes. IX. n. 3. In equa denique, &c. sue omnino nullam placenta receperit, a I. Silvio Fabricio l. c. P. I. c. 3. & Graeco p. 295. & a Needhamo demonstratum esse, sex mensibus integris, in his animalibus, nihil per umbilicum transire c. 2. tum a VVEPFERO E. N. C. Dec. I. ann. 3. obs. 129. Hæc imprimis *Claudii de la Courvee* toto libro *Everhardi sive Cosmopolitas* p. 122. *Entii, Francisci Bayle, utriusque Stalpartii van der VViel. Charletoni, Bergeri p. 476. & Ioffui apud Gibsonum* sententia fuit.*

- [8] IIA MONROUS l. c. p. 214. Abortus sunt mense tertio, & quarto HIPP. 7191 *709100.* &c. secundo &c. tertio MANNINGHAM p. 77. aut primis 40. diebus HIPP 7191

1774

Partu) Quando solum chorion separatur, nihil, nisi aqua effluit. Quando vero placenta secedit, tunc certe eo, quo aufertur momento, undae sanguinis exsiliunt. An ergo probabile est, sanguinem, quem adpareret tanta copia ad placentam appulsum fuisse, non penetrabile placenta? Non videtur. Verum placenta haec ita utero cohaeret, ut raro avellatur illaesa. Si obstetrix placentam vobis obtulerit, facile judicium est, inspicite, si superficies polita fuerit, integra est, & testis chorio. Si vero sanguinem stillaverit, manifestum est obstetricem, dum placentam abstulit, vim intulisse. Adeo vero ruditer trahere solent, ut minime rara exempla sint, inversum uterum cum placenta extractum fuisse, ut nuda aeri exponeretur pars uteri, contigua placenta: in ea tunc ingentia foramina patent, plena puro sanguine. Si tunc placenta absterfa, & mundata fuerit, pressa eadem demonstrabit stigmata sanguinea oblique introrsum penetrantia. Manifestum est adeo, in hac parte vasa uteri arteriosae, & venosa, ita extensa esse, ut sanguis ibi insinuetur in patulas papillas, dictas VATERO, inde vero subeat in venulas obliquas placenta, unde porro ad umbilicalem venam, & cor serus redit.

Gravida) Femina gravida ex laeso utero exsanguis moritur. Si mense septimo [10] gestationis haemorrhagia uteri correpta fuerit, sanguis ex dilatato utero exundabit, donec ne gutta reliqua sit, &

S. 2

&c

παραμυον n. 8. aut tertio mense HOOKNE vveebmats p. 19. HARVEY p. 184. incommoda gravidarum reverii sub menstruas periodos MONROO. Femina, quae circa tertium mensem semper abortiebat E. N. C. Dec. II. ann. I. obs. 184. & III. ann. 7. 8. obs. 31. A plethora certe abortus periculum MONROO p. 235. &c. hinc secunda vena impeditur E. N. C. Dec. I. ann. 6. obs. 204. Schwirg. Embryol. p. 384. MAURICEAU p. 127. obs. 339. Bevervuyck. scbat. der. gezonab. p. 603. maxime in primiparis Panarolus Pentec. II. obs. 23. I. obs. 10. Exemplum talis haemorrhagiae a sanguine per poros chorii placenta instrati stillante, vidit Noortvuyck. p. 28. 29. Placenta ab abortu per aliquot dies retenta, deinde excluda cum magna haemor-

rhagia E. N. C. Dec. II. ann. I. obs. 200.

- (10) Haemorrhagiae cum abortu quatuor, & quinque mensium non lethales, vasa enim ultimis temporibus majora sunt Mauriceau p. 172. 159. sed eae, quae septimo octavo, & nono mense fiunt, omnino funestae, nisi fetus extrahatur Mauriceau p. 118. obs. 158. Manningham p. 69. Puzos Acad. de Chir. I.P. II. p. 209. Exempla funesta habet Mauriceau obs. 17. 55. &c. Summa tamen quiete aliquando malum avertitur BOHN. de offic. med. p. 601. Puzos ib. E. N. C. Dec. III. ann. 3. obs. 130. Alii vero non satis similia narrant. Haemorrhagia gravis a falso germine adhuc albuminoso Mauriceau 69. & ex ovo minori quam gallinae ovum est Mauriceau obs.

207.

& femina nihilo minus palleat, quam fieret, si jugulares venae ipsi sectae forent. Neque potest averti tanta calamitas, nisi continuo totus cum secundis fetus extractus fuerit. Hoc denuo manifestum argumen-

204. la MOTTE *obs.* 332. & ab albuminoso ovo gallinacei mole *Mauriceau obs.* 180. 491. & a bimeltri aut paulo majori minimo fetu la MOTTE *obs.* 387. *Mauriceau obs.* 169. 293. 694. Mors ex abortu quatuor sepi-manarum *Mauriceau obs.* XI. & decem septimanarum, per haemorrhagiam *obs.* 591. & a trimeltri sed falso germine *Mauriceau obs.* 223. 614. atque fetu alio, cujus caput avellana non majus esset *obs.* 154. Exemplum etiam passim reperio haemorrhagiarum gravissimarum, quando post abortum placenta in utero manerat E. N. C. *Dec.* II. ann. I. *obs.* 116. Nempe fetus exigui placenta tenaciter adhaeret, & difficulter eximitur, cum fetus non adsit, qui praecundo viam aperiat PUZOS l. c. p. 204. Parvus abortus, & tamen secundina integro mense educi nequit *Mauriceau obs.* 297. Ergo primis mensibus parvitas placenta, oris angustia incommoda est, ultimis periculosa haemorrhagiae celeritas.

Sed vis argumenti haec est: Haec profluvia oriuntur plerumque a placenta soluta *Manningham* l. c. ruptis adeo vasis, quae faciebant nexum uteri cum fetu. Sed ex illis ruptis vasis sanguis effluit, oportet adeo prius non chylum, sed sanguinem per ea melle.

(11) *Jathra*, in *Textu*) In universum non difficile demonstratu est, fetum aliquam partem alimenti, & aliquam per umbilicum humorum communicationem cum matre habere 1. Agni nati sunt

ore impervio MATTHEIAN. de la form. du poulet. p. 224. *Ruyf. lib. I. obs.* IV. n. 15. *Hist. de l'Acad.* 1715. n. 4. Canis quinque catulos peperit absque ore *Graaf.* p. 292. *Phil. trans.* *abr.* V. p. 338. & n. 304. *Mew. de l'acad.* 1709. p. 22. & 1701. *obs.* 15. & saepe id fieri *Gowey.* p. 94. Collegit etiam exempla *Munro* p. 155. Amnion circa caput fetus adnexum, ut os non appareret, nisi sectione facta E. N. C. *Dec.* II. ann. IX. *obs.* 118. Fetus absque capite *Bianchi* p. 245. Infans ex clauso natus BUCHNER. E. N. C. vol. II. *obs.* 96.

2. Variolas a fratre, cui mater adfederat, concepit ipse *Mauriceau* p. 67. Et variolarum a matre in fetum propagatarum passim exempla leguntur *Schurig. Embryol.* t. 3. c. 1. *Sylleps.* p. 512. *Rhodius obs.* 83. *Cent.* III. *Maur.* p. 600. *Hildanus Cent.* IV. *obs.* 55. 56. & luis & in E. N. C. *Dec.* II. ann. 6. *obs.* 61. & *Dec.* I. ann. I. *obs.* 53. *Schurig.* l. c. p. 194. vel certe pustularum *Mauriceau* p. 81. & morbillorum E. N. C. *Dec.* II. ann. 3. *obs.* 97. & icteri KERKRING. *obs.* 57. Etiam levis morbi materni vestigia in placenta adparere *Mauriceau* p. 227. Croco pasta matre aquae, & catellorum coris lutea HERTOD. *crocoleg.* p. 280. & E. N. C. ann. I. *obs.* 60. & similia video apud HEURNIUM, & van HEERS. A matre leniter ista fetus continuo extinctus *Hildanus Cent.* IV. *obs.* 59. *Sec.*

Sed 3. eam communicationem sanguinis rubri esse demonstrandum est,

gumentum est, rubro sanguini liberum commercium esse ab uteri arteriis in placenta.

Membra.

est, ut ruber verus sanguis ab uteri vasis in chorii vasa transeat. Ita praeter Hipp. & Galenum Fabricius l. c. p. 1. c. 1. 3. 5. C. Bartholinus p. 111. Drelincourt. Peribarb. 37. Mauriceau p. 210. Lieutaud. p. 273. Kaasv. n. 1049. Noortvuyck. p. 99. Celsus. p. 182. & de vigesima parte sanguinis Venarum umbilicalium Roubaud. 1714. p. 188. 1715. p. 132. observ. p. 17. nam reliquum omnem in placenta manere, & praeter sanguinem, chylosam dulcem lympham ab utero ad umbilicales venas venire docet, l. c. & observ. p. 47. In carella sanguine privata pulsi exsangues Denis citatus a Trevvino de chylos. fetus p. 18. In puerpera, ex lapso extingui, levis pariter exsangvis Mery Memoir. de l' Acad. 1708. p. 240. seqq. & Heister. not. 16. & E. N. C. vol. I. obs. 184. & 207. In femina, cui placenta in utero manserat, perpetua & funesta haemorrhagia, cum funiculus non fuisset ligatus la Motte obs. 395 398. & bist. de l' acad. 1721. bist. l. Monroe II. p. 131. hancque rationem dat duplicis nodi, quo vult stringi umbilicem GROESER diff. p. 11. Sed 4. ipsa autopsia plura conficit, COVVERUS ad T. 54. mercurium per arterias hypogastricas matris in venas placentae urit & vicissim repetente experimentum DRACIOL. II. c. 7. ut non videatur merito in dubium revocari a Monroe. Pleussenus mercurium carotidi canis injectum, vidit per venam umbilicalem catelli exiisse apud VOGLI II. p. 173. & apud Manget. Theatr. II. p.

139. Liquor per arteriam hypogastricam matris in placenta penetravit, & vicissim Hoelling. apud Heister. Comp. not. 16. Hummel. apud Hoelling. diff. de off. obs. n. 13. & Schacher. de lab. lepor. n. 13. & Taurvy p. 89. postquam venas hypogastricas ligaverat. Venae umbilicales per hypogastricas insertae PRESTON. Phil. trans. abr. III. p. 210. & SCHACHER l. c. Vascula ex chorio in uterum repleta per arterias matris Noortvuyck. p. 9. & placenta in una parte ruberrima, profunde penetrata, per vasa uteri ex iliacis vasis injecto liquore p. 101. & sinus placentae intra coronam sub cellulosa, omnino sanguinem continent p. 16. [et] in eo experimento communionem immediatam cum utero non viderit, cum verius uterum hi sinus angustiores redderentur. In vivo cane, dum placenta ab utero separatur, sanguis ex vasculis effluit Schacher. l. c. conf. DGLXXVI. 3. 6. 7. 2. 11. & in homine Chirurgus DENYS apud NOORTVUYCK. vidit, placenta plenam vasis sanguiferis, quae sanguinem abrupta destillarent. Ipse denique an. 1738. vidit, ceram injectam arteriis matris in sinus uteri, & per eorum aperta ostia in insertas chorii productiones atque placenta subisse de allan. n. 5.

g. Argumenta priora vero facile diluuntur. Nam vaccarum quidem fabrica ab humana recedit, nostra enim placenta sanguine, uti illa lacteo succo turget. Sed in ipsis denique ovibus, & vaccis tuberculorum chorii cum uterinis connexio valida

Membranula Coelum placentaе exterioris tegitur solida membrana a chorio (12) continuata, quam RUYSCHIIUS [13] invenit, & per eam

illa adparet, dum remouentur *Fabricius* P. I. c. I. *Hoboken*. p. 28. guttaeque sanguineae P. II. c. 3. quas pingit *Hobokenus secundum vitul.* f. 16. & 17. Experimentis ab injectionibus mellora obposita sunt. A morte matris fetus superflus est, quia motum sanguinis a cordis propria efficacia habet. Si aliqui fetus umbilicalibus vasīs cetere caruerunt, non de illis, sed de solita fabrica factis disputamus. Qui funiculi abrupti visi sunt, potuerunt antepartum abrupti fuisse, & cito solidati *MONKROO* II. p. 165. Placentas equae, & sunt non magnas, sed aliquas esse *FABRICIUS* P. II. c. 3. *VVHARTON*. p. 280. faciemque exteriorem chorii in sue granulatam, mollem carnosam, placentaе similem esse *RARIUS sym. quadr.* p. 93. & modicum, sed tamen aliquem nexum *HARTMAN. E. N. C. Dec.* III. ann. 9. obs. 191. De membrana *RUYSCHII* vide not. 22. sub fin.

- (12) Chorion *GALENI de util. part. L. XV. c. 4.* ubi ab allantoide, evidenter separat, & *THEOPHILI* p. 896. Allantois autem *GALENI de semine L. I.* ubi ante agnitionem ait generari ex semine seminino. Allantois *FERNELII Physiol. L. VII. c. 9.* sed & chorion ejusdem. Allantois *COLUMBI* p. 248. Nam dudum observante *HARVEIO* veteres chorion allantoidis nomine passim describere p. 279. tum *TILINGIO* p. 91. Chorion ergo his dicta nominibus membrana est, undique fetum amplexa, etiam tenerum embryonem *RIOL.* p. 372. *HARVEI* p. 184. peculiaris indolis, in recente corpore tota molli, exterius mucosa, visco-

sa, pinguis *HOBOKEN. anat. rep.* p. 34. pulposa, quam cum carneo glutine *FALLOPIUS* comparavit, asperam faciem dixit *VESALIUS* p. 673. fungosam vocat *NOORTVVYCK.* p. 13. 25. Interius chorion firmior est, tenulior inordinate reticulata, uti *HOBOKEN. vocat* p. 114. *anat. rep.* *NOORTVVYCK.* I. c. & T. 2. f. F. nimis, puto, regulariter. Illam fungosam, & hanc reticulatam partem, totidem laminas chorii vocat, qui separavit *Cl. NOORTVVYCK.* p. 25. In spiritu vini vero chorion totum solidiorem, & perfectam membranam abit. Multas autem laminas inter quae vasa decurrant, dictas *Cl. LIEUTAUD.* p. 371. nemo facile demonstraverit, & ego ad mediam refero. Vasa habet ab umbilicalibus, quae in uterum communicare dictum est *DGLXXVI. 6.* nimis nota *VESTERIBUS*, ut *GALENO de util. part. L. XV. c. 5. de fet. form. 2.* ut totam etiam chorion ex vasis fieri adfirmet *IDEM de diff. vitul.* c. 10. Sed is placentaе forte intellexit, nam chorii vasa exigua sunt *ARANTIUS* p. 28. aut vasa chorii viutini *HOB. secundum vitul.* p. 96. non bene in homine negata ab *EODEM anat. rep.* 124. 153. cum etiam vacua albique appareant, & ipsi forte visi *HOBOKENO* p. 34. 113. 224. fig. 3. 4. quae in viutino chorio cum tomentosis suis finibus pinxit per venas facta repletionem, *RUYSCHIIUS* in nihilissima *T. 2. Tab. max.* Habet etiam *NEEDHAM. c. 2. GRAAF* p. 182. & in parte chorii proxima placentaе negat reperiri *RUYSCH. Epist. XIII.* p. 10. Glandulae autem

autem MALPIGHII possib. p. 47. sive folliculi in animalibus conspicui, quas glandulas in hydatides degenerare, & in nonnullis animalibus reperiri auctor est VALISNERI *Opp. I. Vol. II. p. 51.* inque sue veras, & perforatas vidit RAIUS l. c. eae in homine nondum repertae sunt. Cellulosae verae ope chorion cum membrana media cohaeret, inde cum placenta fibrillis, dictis RIOLANO p. 373. & HOBOKENO, quae vera vasa sunt NOORTVVYCK. p. 130. perforantia chorion, ut placenta adeant p. 37. &c. alterius vero cellulosa, sed manifesto valculosa, ope cum utero DCCLXXVI. 6. 7. 8. Totum ovum succingit undique, & in juniore ovo per meas quidem observationes, placenta terminat ex amnio subpascens, nam plerique alii amnio tunc volunt coniungimini, conf. not. 6. ad DCCLXXVI. Etiam tunc crassum vidi, tenue vero GRAAF. p. 122. Adolescente vero ovo adparet, simplicem quidem esse membranam, in parte ovi inferiori, ubi tenuiorem esse recte HARVEIUS observavit p. 124. Ita enim in femina tertio mense gravida reperi, &c. addit ROUHAULT, eo tenuiorem esse, quo a placenta remotior est *Memoir. de l'acad. 1715. p. 135.* In superiori vero ovi parte manifesto finditur, laminaeque una cum amnio partem concavam placenta sublinat RIOLAN. & HOBOKEN. *anat. repet. f. 32.* BLASIUS *anat. bom. p. 165.* (crustae nomine) MAURICEAU p. 217. RUYSCH. *Thef. V. n. 57.* ROUHAULT. *observ. p. 22.* MORGAGN. *epist. T. II. n. XVI. p. 126.* NOORTVVYCK. p. 26. &c. ibi firmissime placenta vasa RIOLAN. l. c. HOBOKEN. *anat. prvor. p. 15.* ARANTIUS

de fet. p. 29. ROUHAULT. 1714. p. 183. MAURICEAU. l. c. & in meis; loca vero libera reperit NOORTVVYCK. p. 27. nexumque unice ad vasa referet ib. tum mediae membranae. HOBOKEN. *anat. rep. p. 25.* & huius ope amnio TILLING. *de plac. p. 95.* tenuior, quam reliqua pars chori NOORTVVYCK. p. 26. 27. &c. BIANCHI p. 54. Magna certe industria EUSTACHIUS chorion ad funiculum utque ab amnio separavit T. XIV. f. 6. & Cl. NOORTVVYCK. p. 190. Pars altera chori super placenta convexitatem se conjicit, mediaeque, uti in meis ovis, ita in adulto fetu, utero placentaque se interponit, continua omnino chorio Noortvvyck. p. 14. p. 14. 76. &c. T. 2. c. Ruyfch. *Thef. V. n. 57.* Roubault. 1716. p. 344. nam prius ad placenta limbum chorion terminari crederat *Mem. de l'ann. 1714. & 1716. p. 343.* Blasius l. c. Santorinus *obs. p. 218.* Ea nunc celeberrima est illa, de qua hic Praeceptor agit, membrana. Ad limbum placenta, chorion ad placenta, & uterum firmius adhaeret, & crassior est Mauriceau. p. 217.

- (13) Nempe Arantius chorion undique placenta ambire, & uterum contingere minime ignoravit p. 5. Hobokenius chori membranam externam vult, ubi reitorem membranam chori utero obduci ait p. 125. 257. tum *anat. rep. p. 349.* ubi tunicam propriam vocat, etiamque, valde porosam, laxamque; hanc novam intelligit chori membranam; utero oppositam. Sed & Blasius nota fuit l. c. & Brendelio n. 19. & Plessenio citato apud Mangetum, qui rufam, tenuem, porosam, membranac pene dissimilem dixit, quae retis modo, aut omen-

eam placenta radículas suas emittit. Nunc quaeritur, quomodo (14) per hanc membranam sanguis sibi possit viam facere. Verum haec obje-

ti esset, atque circa eam vasa repere sanguinea varicosa. Porro *Stalpartius*, aquam in placenta integrum injectam non effluere, ob membranam a chorio, quae in parte convexa eam limitat *describit. fet. p. 558.* Copiosius dicta est *Ruyfchii Thes. II. aff. 4. n. 18. Thes. IV. n. 91. Thes. V. T. I. f. 1. n. 41. Thes. V. n. 57. Thes. VI. n. 24. Thes. X. n. 5. 7. 60. cur. renov. p. 121. & Santorini p. 218. & Roubault* qui & ipsam reticuli modo *oserv. p. 18.* perforari ait, articulis a placenta ad uterum euntibus, quae prius aliquamdiu oblique per huius membranæ crassiem currant *1716. p. 345. & toraminibus in sicca membrana conspicuis observaz. p. 9. Mem. de l'acad. des scienc. 1714. p. 181. 1715. p. 132. 1716. p. 345. 348. & Monroo*, qui fere eadem habet *Edimb. soc. II. p. 128. 129.* Neque multum adinet, quod reticulum potius, quam veram membranam esse velit *Cl. Roubault. Mem. I. c. p. 181.* aut inconstanter *Hobokenus*, qui modo tunicam esse negat, ut *p. 203.* modo adfirmat. Villosam in meis experimentis reperi, uti *Ruyfchius*, qua parte uterum respicit fungulam per macerationem *Noortvuyck. p. 14.* mollescit, enim macerando *Noortvuyck. p. 26.* & reliquae chorii sinuolae redditur. Vasis sit cellulosa pauca connexis *DCLXXVI. 7.* quae raro adprere *Ruyfch. Thes. V. n. 41.* auctor est, fuisse vero describit *Roubault.* Eadem membrana placentaē sulcos tegit, & inter eosdem profunde descendit *Hoboken. anat. rep. p. 349. Noortvuyck. p. 19. Roubault. off. p. 2.* unique lobos placentaē

Id. 1715. p. 133. Hanc ipsam credebatur *Ruyfchius* uterinorum valorum cum vasis fetus anastomosin impedire *Thes. II. I. c. Thes. X. I. c.* Verum cum ipsa villosa sit, instrumentum potius est, huius anastomosos, uti superius dictum est. Nullam veto esse, ut summus *Anatomicus* olim me docuit, non possum consentire, neque enim sanguis effusus est, sed vera & consilans in impraegnatis ovis membrana, nihil diversa a reliquo chorio. Confirmat passim *Cl. NOORTVUYCK. p. 21. 29. 123. T. 2.* Massam equidem sanguineam tamquam crustam placentaē superfundit, *HOBOKENUS* vidit *anat. I. p. 17. 37. f. 9. DD. 10.* & passim alibi. Sed in integerrimo ovo & *Cl. NOORTVUYCK.* & ego bis absque ullo dubio vidi, & in teneriori quidem ovo nihil omnino diversam a reliqua, vulgo notae chorii fabrica. In ipsis demum placentalis brutorum similem continuam membranam, utro obijci *Stalpartius I. c. p. 561.* Chorion *Arantius* olim *p. 26.* a membrana carnosa, & nuper *Heisterus* filius a cellulosa peritoneo circumposita deduxit *Lienstaend. a cellulosa funiculi p. 372.* sed neutra origo satis placet.

- (14) Chorion duplicem esse dixerat *Galenus* & per medium vasa sciri *de util. part. L. XV. c. 3.* intus etiam levem, & lubricam facit *Vesalius*, & *Spigelius I. c. c. 4. Graaf. p. 282.* Sic & *Harveius*, chorion exius viscosam, inaequalem, intus levem dixit *p. 284.* Duas porro chorii lamineas facit *Blasius I. c.* Deinde membrana media innoteit *Needhamo c. 3. in muliere T. IV.*

objectio debilis est. In haemorrhagiis enim sanguis ad mortem usque de utero fluit, neque ideo valis aperti ostium conspici potest

(14)

f. 2. *Diemerbroeckio* p. 205. *Peyero* E. N. C. *Dec.* II. *ann.* 7. *obs.* 204. *Hardero apiar.* p. 38. quando allantoidem dixit atque chorio nexam, vasis destitutam &c. *Bidloo*, quando totum setum cinctum allantoide pingit T. 58. 61. *Hobokeno* p. 217. &c. fig. 20. 17. *DD.* 21. 35. 24. (ubique ad placentae fere sedem tum f. 32.) *Sampsono* E. N. C. *Dec.* I. *ann.* 3. *obs.* 171. *Johanni van Horns in microc.* p. 289 *Littrio* allontoidis nomine *bist. de l'Acad.* 1701. p. 27. *Mem.* p. 817. *Stalpartio* juniori, qui inter chorion, & amnion membranam cellulosa pituitae similem dixit interponi *de nutrit. fet.* p. 541. *Ruysschio Thes.* V. n. 41. pseudoallontoidis nomine *Thes.* V. n. 57. *Verheyeno* L. II. p. 342. *Roubaultio*, qui fuse describit an. 1714. & pingit f. 2. 7. tum a. 1715. & 1716. mediae nomine, & si bi iuventam tribuit *observ.* p. 13. *Fantoni* pariter allontoidis nomine dicta est. Membranam etiam chorii internam, *Brandelio* dictam, huc video pertinere *de nutrit. fet.* n. 9. *Cl. Noortvuyck.* accensuit amnio p. 21. 29. Mihi vel seorsim pro secundo fetus involucri recensenda videtur, uti *Hobokenus* p. 281. & *Littrius* l. c. *Roubault.* 1714. p. 184. &c. vel accensenda chorio, uti *Hobokenus* p. 185. *Verheyen*, *Santorinus*, *Elaeus*, *Roubault.* *off.* p. 18 & *Mem.* 1714. p. 184. cui ope cellulosa fabricae *Brandel Noortvuyck.* p. 13. 23. *Hobokenus* p. 280. 157. 127. secundum concavam placentae partem vero, ubi cellulosa paucio *Noortvuyck.* p. 22. omnino ab amnio

nequit separari *Hobokeno anat.* l. p. 129. & *anat. rep.* p. 334. & *Roubault observ.* p. 22. *Mem.* 1715. p. 136. Inter eam, & chorion interpositur passim mucosa pinguedo *Hoboken.* *anat.* I. f. 9. KK. *anat. rep.* p. 288. 221. 123. 126. 127. f. 3. 4. p. 35. *Noortvuyck.* p. 22. Fibrillas, quibus membranae conjunguntur, tenues, iam *Galenus* habet *de util. part.* l. XV. c. 5. passim vero eas describit *Hobokenus anat. rep.* f. 19. BB. f. 20. ubi monere oportet, ibi non bene dissimulari, chorion inter mediam, & placentam interponi. Alba est *Roubault* 1716. p. 143. opaca absque vasis *Hoboken.* *anat. rep.* p. 128. *Harder, Littrio* 1701. p. 116. concentrica amnio, & eadem cum eis undique extensioe terminatur *Hoboken.* f. 32. non pellucida mihi, aut arachnoidea visa, ut *Claro viro D. Noortvuyck.* p. 29. aut subtilissima, uti *Roubault* p. 22. aut adeo tenera, uti *Hobokenus* velle videtur p. 155. Cellulosa adhaerens, aut chorii male remotae laciniae villosam facient, & inaequalem *Hoboken.* p. 127. quae naturaliter levis est undique. Sub placentae omnino Amnio circumducitur *Noortvuyck.* p. 21. ibique fortiter amnio cohaeret *Roubault.* *observ.* p. 22. 1714. p. 199. &c. 1715. Ab allantoide *Albini*, & foris *Halei* diversissima est, quod illa peculiaris vesica, haec universalis fetus involucrium sit, adeoque non solum *Cl. Newville*, sed meam descriptionem corrigere oportet, quando utramque pene confudi *de allantoide* p. 5. not. 2. nam etiam tum discrimen adverti interesse p. 8. *Haleus* autem, quando alibi

[14*] Ita alibi Britannum [15] vitum excitavit, qui omni mense ingentem copiam sanguinis per digiti cutem amittebat, quae solida tamen regebatur epidermide. Ita mulier illa Amstelædamensis [16] sanguinem menstruum sub sudoris specie per capillatæ cutis capitis poros emisse, nulla adparente via. Integra glans bombardæ exivit per integram cutem [17], & primo tuberculum elevavit, id sensim increvit, & una integumenta eminuerunt, donec exitum inveniit, partibus subjectis sanis, & integris. Sed porro ubique exempla sunt canalium, qui & amplissimi fieri possunt, & angustissimi. Uteri os naturaliter clausum est, in partu vero puerum transmittit. Sphincter ani decem uncias injecti clysteris perfecte retinet, qui tamen per amplis scybalis se aperit. Ergo puto manifestum esse, partem sanguinis arteriosi materni, pulmonum actionem passi, transire in placentam ferus, indeque in hepar, cor, & totum embrionis corpus.

5. DCLXXIX.

Corpus) *Corpus luteum* [1], per quod in ovario liquor nutritius ovum subit, abit in calicem, & placentam demum, quando
ovum

bi ait, semper tres membranas separari posse, etiam in laceris secundis, tunc istam intelligit. A cellulosa Peritonæi (membrana nempe ejus externa) continuari, vasque vaginam dare, & funiculum tegere *Roubault. off. p. 22. 1714. p. 186. 1715. p. 133.*

[14] Nulla obscuritas est, cum chorion, placenta obducta, manifestis villis uterum comingar & adhaerentem habeat, cavis & vasculosis DCLXXVI. 7.

[15] DCLXVII.

[16] Ib.

[17] CCCCLXXXI. not. 3.

[2] Non ita se habere, sed corpus luteum in ovario manere, superius monui DCLXIX. Plerique recentiorum nunc consentiunt, sub initia ovi, chorion & placentam non differre nisi gradus, quod laxior ista, vasa longiora

habeat, densa ista, villisque vasculosis brevibus fiat. Ita *Hobokenus anat. rep. p. 16.* Placentam chorii partem esse primo mense *Riolanus p. 412.* Chorion rariorem factam abire in placenta initia, in bimestri embryone *Euerardus p. 90.* Sparium chorii leve parvum esse, in temero feto sensim augeri, donec placenta superet magnitudine *Riolanus Hartman. E. N. G. Dec. III. ann. IX. X. obs. 191.* Placentæ particulas aliquas membraneas fuisse, apud *Douglasium* vidit *Simson. l. c. p. 115.* Deinde uberius idem *Cl. Simson.*, quamlibet chorii partem omnino posse in placenta abire *of the v. orb. p. 81. Edimb. Ess. IV. p. 95.* eam nempe, quæ utero adhaerescit ibi, quæ plerumque sit superior, quia pars ovi cervici

ovum ad uterum adcrefcit. In eam placentam radicatur funis umbilicalis embrionis, qui cum matre non neſcitur, niſi per placentam, quam olim oportet una cum fetu excuti, eſſi valide cum utero cohaereat, & etiam in cadavere difficulter avellatur. Tria [2] genera placentarum reperiuntur in animalibus

malibus

vici uteri oppoſita vaſcula non emittit ſb. uteri vero fundus ſuperior magis ſpongioſus ſaverimittendis placentaſe flocculis: id in brutis manifeſtum eſſe p. 104. quorum placentaſe in cellulis narae perfectae figuram cellulaſe ſuae expriment p. 105. Diſtinctionem vero chorii & placentaſe ab eo pondere, quod poſt quintum menſem placenta deſignat creſcere, pars vero ovi membrana, prius exigua, quintuplo major fiat p. 103. Eadem Cl. Roubault. ſententia eſt *Mem. de l'Acad. de ſc. 1715. p. 134. L'Éclairciſſ. p. 372.* Non adeo mirum eſt, in equo ſero, & vix unquam in porca placentaſe apparere. His nempe chorion naturam ſuam retinet. Ex meis vero obſervationibus, modo citatis, ſequeretur „ ſemper brevem villoſam membranam chorion brevi villoſae uteri ſuperficie adglutinari, intra hanc membranam vero longa vaſa, ſive veram placentaſe, ſubnaſci, quae totum ab initio ovum occupet, deinde ad ſuperiora magis appareat *Harveſ p. 230.* Inferiorem vero partem vaſorum vix augeri, quod forte ibi villi uteri pauciores, & minus adſiſtentes. Si liceret cum anatomicis pene omnibus contendere, adſcriberem rationes a priori, ex quibus conſicerem, longa ramoſa vaſa, quaſi vulgo dicuntur, ex ovi involucto externo undique erumpere, abique ſummo detritioſis, & effundendi liquidi periculo uteri membranis adſtrictari non poſſe, merito ergo, ut in mura placentaſe certum eſt,

etiam in placentaſe, & ovi denique initiis, villoſam porius membranam, brevibus factam vaſis, ovario primum, deinde utero adhaerentem factam eſſe. Vide contra meam ſententiam, dicentem Cl. Noortvuyck, qui membranam convexae placentaſe ſuperſtratam in maturiori demum fetu naſci credit p. 122. & conſer, rationes.

- [2] *Hippocrates* omnino brutorum fabricam intelligit, quando ait „ abortum fieri ex acetabulis uteri mucosif. factis, & abruptis *Apbor. V. n. 46. Ariſtoteles* vero, qua erat perſpicacia, correxit *Coum*, & edixit animalia utrinque denata nullos cotyledones habere *de gener. anim. L. II. c. 7.* fetum vero vulvae adhaerentem, unidentata autem, ſive ruminantia, cotyledones nata eſſe *biſt. anat. III. c. 1.* Sed & *Soranus* negavit, eſſe in homine cotyledones. Inter recentiores nimis etiam frequens fuit vitium, quod fabricam cotyledonum ad humanam placentaſe tranſulerint. Ita *VVhartonus* etiam humanam placentaſe in partem uterinam, & partem reſpondentem ſecui diſiit, merito reſutatus ab *Hobokeno anat. repet. p. 303.* & *Robaultio Memoir. de l'Acad. 1714. p. 191.* Deinde qui in placentaſe lac ſeparari docuerunt, iterum ad ſetum, ut *VVhartonus p. 254. Graef. p. 297.* & placentaſe mammae officium habere *Harveſ p. 285.* a ruminantium fabrica errorem deſuſerunt, quos *Ruyſchius* corrigi *Eſſ. VI. n. 84.* Sed diverſae omni-

malibus. 1. In homine, & paucis brutorum, innumerabiles cotyledones conpinguntur in unam (3) massam. 2. In bove, ove, capra cotyledones (4) distincte disperguntur per chorion, ex quibus tamen omnibus una (5) vena umbilicalis prodit, duaeque arteriae, & unus urachus, periunde, uti in humano genere. Hae enim cotyledones funt

T 2

omni-

omnino classes sunt placentarum a Needham etiam, & Fabricio P. I. c. 3. constitutae. Unica in homine, & in cane ibi cinguli similis est *Eustach.* T. 15. f. 7. 8. *Fabricius* l. 28. & in lepore, & indico cuniculo. Sed in istis animalibus fabrica dissolubilis est similis cotyledonibus, ut rubra, uterina ab alba, chorio adherente, facile secedat *Charleton. mantiss. anat.* p. 106. *Tauv.* p. 100. *Graaf.* T. 27. F. H. I. Multae vero placentae in omnibus bis sulcis reperiuntur, tunc in equo, ubi ruberula minima chorii loco cotyledonum sunt, habentque, respondentes in utero cavitates *Fabric.* f. 46.

- [3] Pierunique. Septem enim placentas cum duabus venis umbilicibus *Kerkringius* in homine vidit *obs.* 37. Placentulas, duas a primaria separatis *Hobokenius anat. rep.* p. 100. f. 25. Tres etiam placentas vidit *Roubault. Mem. de l'Acad.* 1715. p. 134. cum ic. *off.* p. 6. cum unico funiculo, & valis simplicibus. Placentam secundariam exiguum vidit *Mauriceau obs.* 309. Caeterum placentarum in animalibus ruminantibus, a placentis carnivororum, princeps diversitas est, quod illae succum tenuiorem, hae sanguinem ab utero recipiant *Tauv.* p. 102. 163.

- (4) Cotyledones nullam extremam membranam habent, si *Hobokeno* de secund. vit. p. 25. & *Monroe Edimb. soc.* II. p. 129. fides, nam contraria docet *Stalpartus*. Numerosae sunt, ad octoginta in ove *I. Sylvius*, *Peyer. obs.* 33.

Eust. T. 14. f. 9. 10. *Fabric.* f. 27. & 66. in vacca *Hobokenus secund. vitul.* p. 12. & centum. p. 233. intus foraminulenta *Fabric.* de form. fet. T. 15. 16. & cavitates habent, & granulatas eminentias, *Hoboken.* p. 23. villosas *Fabric.* f. 42. *Hoboken.* in icon. f. 7. 8. in vacca, quibus similes eminentiae in utero respondent *HOBOKEN.* f. 7. 15. 30. membraneo quasi ligamento ad uterum firmatae *HOBOKEN.* f. 14. 16. succumque ab utero recipiunt. Hae cavitates nomen fecerunt cotyledonum, ab ovibus desumptum, quarum glandulae evidenter cavae sunt. Li- quor intus in ove mucosus *Vesal.* p. 669. albuminosus, siccus *Tiling.* p. 319. copiosus, ad co- chlear ex una cotyledone in vac- ca *Tiling.* p. 337. Lac verum. *Vivusenius* vocat nov. var. *syss.* p. 41. Radiculae a chorio in cotyledonis aetate in aqua maceratae evolvuntur, uti humana placenta *Mslp. ep. ad Spon.* p. 29. & liquor in vacca injectus primo in cava acetabula, deinde in substantiam placentulae subit *Aldes* p. 547. sanguinem vero, uti superius dictum not. a. ad DCLXXXVIII nullum continent, *Harvei* p. 128. atque mentum tamen ab utero adactum admittunt. Vide descriptas a *Mslp.* l. c. *postb.* p. 47. *Tilingum* de placent. p. 50. & *Vesalium* p. 665. &c.

- (5) Venae umbilicales in plerisque brutis duae sunt, *Schulze an de lig.* &c. p. 10. *Nicolai de dir.* var. p. 109. ad umbilicum vero conjun-

omnino una placenta, in centum divisa tubercula, qualis in femina perinde reperitur, sed ita vicina, & compacta, ut in unam massam abeant, neque ita arte concreta, quin per artem dissolvi possint. 3. Animalia ovipara habent testam duram, qua pullus defensatur, tum membranas, quae testam subiacunt, porro chorion, amnion, albumen sive alimentum fetus, & placenta sive vitellum, in centro vero vitelli sacculum colliquamenti, in quo fetus est. Ex fetus vero umbilico funiculus prodit, qui per duplicem membranam exit, & in vitello radicatur (6). Hic vitellus calyx ovi fuit, & nunquam consumitur [7], ovum autem ita factum est, ut omne alimentum prius, quam ad fetum veniat, albumina nempe omnia, elaborentur in vitello, tunc demum transmittantur ad alendum pullum, perque funem umbilicalem ad hepar transferantur.

Innumera-

conjunguntur *Peyer. obs. p. 31. Fabric. de form. fet. P. I. c. 2. f. 28. 29. Hoboken. f. 24. 25. p. 85. Ruysch. Thef. IX. n. 20. Ita se habet in bove Aristoteles bist. L. II. c. 8. in ruminantibus Taur. p. 130. in dama Harvey p. 239. & in ipsa balaena Ruysch. Thef. IV. n. 34. & in cane. VVaeffer de circ. fet. Trev. de chylos. p. 14. Tres omnino venae in fele sunt. Radiculae vero tot quot globuli placentaee Needham. T. I. Fabric. f. 27. 28. 29. Eustach. T. 14. f. 9. 10. Hoboken. passim f. 18. &c. multasque olim dixit Aristoteles de gener. anim. L. II. c. 7. Eam vero fabricam, & duas venas coalescentes, vel ante quam umbilicum subeant Fabric. l. c. c. 10. Harvey p. 289. vel postea, ut Galenus de util. part. L. XV. c. 4. male ad genus humanum, transulerunt scriptores, duas enim venas umbilicales ex bove tamquam communem homini fabricam admiserunt Aristoteles bist. L. VII. c. 8. Rufus p. 45. Galenus de diff. vul. c. ult. de util. part. L. XV. c. 4. & de form. fet. Theophilus L. V. c. 19. p. 896. inter recentiores praeter priores Lauremberg. in processu. p. 153.*

Errorem veterem correxerunt I. Carpus p. CCLIX. C. Stephanus p. 257. Varolius p. 106. Laurentius in Quaest. 17. L. VIII. & ipse Aristoteles unidentatis unicam venam tribuit de gener. L. II. c. 7. & in homine unica omnino est, duplo vero major Nicolai l. c. Nonnunquam tamen duplicem visam refert Arantius de fet. p. 19. 20. b. si lamve C. Bartolinus p. 176. Tristidam, sed confluentem ipso funiculo Noortvuyck. p. 17. Duas, sed eum septem placentaee Kerkringius habet obs. 37. Arteria umbilicalis utique, sere semper utrinque unica est *Peyer. l. c.* In vitulo tamen unam ex hypogastrica, alteram ex aorta vidit, cito tamen unitas *Taur. p. 129.* In homine eadem arteria nonnunquam conjuncta primis, deinde separata apparuit *Schulze de vaf. umbil. p. 16.*

(6) Hanc totam rem, quae nimis pro serpo meo fusa est, remitto ad *Menroon*, qui accuratam ovi ovipari descriptionem dedit l. c. p. 204.

[7] Luteum ipsum per umbilicum absumitur, ut omnino a placenta differat, *Aristoteles* auctore de gener. anim. L. III. c. 2. in intesti-

na

Innumerabilibus) Fabricam (8) placentae describere arduum est. RUYSSCHUS toties repleto per funiculum corpore placentae, fecit, ut nullibi discindi posset, quin cera secaretur. Injiciebat ceram in alteram

na reſortum *Harveius de Circul.* p. 144. etiam in crocodilis. *Sebae* vero commemorant, feminas quidam et crocodilos vitellum in abdomen haurire, mares autem extra abdomen retinere, & exlugere (*T. 104. f. 7.*) omni analogiae repugnat. Deinde in pullo duplex est vaſorum umbilicalium genus *Harveius de corde* p. 68. 144. &c. vena nempe ex cava ſuper hepar orta, ad albuminis membranam, & duae a venae portarum in vitellum.

- (7*) Placenta uterina a *Galeno* pro parte chorii videtur habita fuiſſe. Rotundum quaſi viſcus eſt, aut rotunditati certe adſine *Biddoo T. LXI. f. 1. Roubaux. Mem. 1714. p. 180. f. 1. 2.* nam acuminatam etiam vidit *Hoboken. anat. rep. p. 148. f. 18. & Noortwyck. T. 2. aut appendice auctam Hoboken. l. c. f. 26. 36. Mauriceau obſ. poſt. 66.* unaplitibusve, ovalem autem *Idem Hobokenus anat. prior. p. 14. f. 1.* Dimidii pedis latitudo eſt, aut paulo plus, ad octo uncias *Dreſincourt. Perioch. 36. cheſfeld. l. c. & ambitus dimidio ſere ovi ambitui aequalis; craſſities ad unciam pletumque Hobok. anat. rep. p. 155. & aliquando ad duas Cheſfelden. p. 182. nempe in centro ad 14. lineas, in ambitu vero media parte tenuior eſt *Dreſincourt. l. c. Innasituri patti ſuperiori ovi, inter duas chorii lamellas. Facies ſetui obverſa. vaſorum umbilicalium truncus obratetur Hoboken. anat. prior. f. 1. Roubaux. 1714. f. 2. Fabric. de form. ſet. T. 7. f. 16. 20.* eademque levior eſt, & concava*

Hobok. anat. rep. p. 147. ſoveas tamen aliquas habet p. 20. inter vaſa *Roubaux. 1714. p. 183.* Facies convexa *Hoboken. l. c.* uterum reſpiciens colliculoſa eſt not. 10 ad DCLXXVI. ibique rami minores arteriarum umbilicalium, in ſurculos ſemper tenuiores cundo dividuntur. Caro tota, ſive parenchyma mollis eſt, fibroſa, ſanguine pleniffima, ut recens quaſi ſpongiam referat *Hoboken. anat. rep. f. 22. 36. Biddoo F. 57. 61. f. 1. Roubaux. 1714. p. 181. f. 1.* * alieubi tamen aliquantum pinguedinis ſavae, fungoſae, ſub chorio ſparſum habet *Hoboken. anat. prior. p. 18. f. 2. 3. 8.* In centro mollior eſſe ſolet *ROUHAULT. obſ. ſer. p. 5. Mem. de l'Acad. des Scienc. 1715. p. 131. 1716. p. 348.*

- (8) Veteribus receptum fuit, ſanguinem eſſe circa vaſa effuſum *GALLEN. de form. ſet. Fibrilloſam placentam faciebat HOBOKENUS*, fibrasque carneas ex rubro nigraſ nominat *anat. prior. n. 27.* quas *NEEDHAMUS* aiebat vaſa ſanguinea ſpiraliter ambire c. 2. Sed omnino vaſa ſunt, cum eo ſeculo placentam excarnare ſolerent, repletionem autem non uerentur. Hujusmodi excarnatas placentas pinxerunt *Spigelius de form. ſet. T. 6. Fabric. Ab Aquap. f. 18. 19. Kerkring. obſ. 98. Elmer. E. N. C. Dec. I. ann. 1. obſ. 39.* Alibi eandem fibras rete plexuum nervoſum vocat *HOBOKENUS*, quod diſiſiones vaſorum conjungat *anat. rep. p. 26.* Glandulas, & in chorio poſſit. p. 47. ibi a *TAUVRYO* pro re curata admiffas p. 89. & in placenta credi-

alteram arteriarum umbilicalium ; sic replebantur omnes [9] venae : aut vicissim venam replebat , sic turgebant omnes arteriae . Placentam , hoc modo repletam , suspendebat in tepida ; ita vasa quidem superant , quae balsamo cerae a corruptione defenduntur , id omne vero putrescit , quod cera non repletum est : ita fit , ut placenta consistat solis vasculis arteriosis , & venosis , rubram materiam admittentibus , & per aquae teporem dissolutis .

Cerebro) Ex una arteria rami innumeri emittuntur , quos omnes cera lubet , ibi finis est arti positus . Reliqua enim pars placentae , quae praeter vasa adest , nisi dissoluta fuerit , una confusa , rubens , massa est . Si dissolveris , manent vasa sola , & reliquum perit omne , uti in cerebro [10] . Ultimus demum arteriarum placentae ramus

credidit se videre adesse , cum substantiam a vasculis distinctam videret , sibi tamen non satisfecit MALPIGHIUS *ad Spem* . p. 30. Gelatinam glandulosam in humana placenta praeter vasa , & fibras admittit NEEDHAM . c. 1. & acinos glandulotos EYSSON . *epist. ad HOBOKEN.* , & DRELINCOURT . *Periob.* 26. & BRENDELIUS n. 9. quas glandulas deinde omnino , quasi evictas recepit COLLINS p. 631. & BIDLOO , & vasa in cistis ramificata obscurius pinxit T. 61. f. 7. 8. Glandulas etiam ex analogia in placenta dari credidit VALISNERIUS *Opp.* II. p. 53. LITTRIUS , ut solebat , contendit , & glandulas , & ductus , vidisse voluit *Mem. de l'Acad.* 1701. p. 386. Ipse RUYSCHIUS , arterias placentae in globulos divisas memorat , *cat. mus.* p. 156. & vasa albicansia vesicularum forma recensentur in ZOD. GALL. *ann.* III. p. 106. Sed dudum Arantius nullam partem placentae esse dixit , quo venae umbilicales non veniant *de fet.* p. 21. Ruysebius autem omnino solis vasculis constare , per experimenta sua edoctus , adseruit *Thes.* II. *aff.* 4. n. 18. neque ullas inesse glandulas confidenter

repetit *Thes.* III. *aff.* 2. n. 25. *Thes.* VIII. n. 35. *Thes.* X. n. 5. 7. 60. Ipse portio Brendelius actus suos explicari in vasa , subeuntia utriusque vaginulae testis est I. c. Addit Roubault , praeter vasa , trium membranarum continuationes offerv. I. n. 1. p. 20. vaginas nempe , quas secum per totam placentam adducant p. 15. a media vero membrana unice deductas *Mem. de l'Acad.* 1715. p. 231. confer. not. 28. Carneospongiosa peculiaris placentae substantia Stuart . *de secund. salut.* & nociv. pertinet ad veterum parenchyma.

(9) Felliciori nempe injectione. *Hobokenus* enim has anastomoses non invenerat *anat. rep.* p. 16. ut mirer etiam statum eam viam invisisse apud *Duverney Phil. trans. abr.* III. p. 210. & E. N. C. *Dec.* I. *ann.* 6. *obs.* 202. & liquorem apud *Taenryum* p. 439. *Nicholls* p. 47. *Bartholinus* dudum adfirmaverat n. 314. vix , puto , expertus , atque omnino verior *HOBOKENUS* , crassas , & visibiles truncorum anastomoses negat p. 313. 332. *anat. rep.*

(10) Truncos vasulorum placentae elotos totos lanuginosos apparere , obnuptos nempe brevibus ramis , quasi tomentosis *Noortwyck* . p. 20. neque

ramus ubique diffilit in plurimos ramos incredibiliter parvos, uti pili penicilli ex calamo conferti exeunt. Idem in venis verum.

Folliculis) Tenella juvencula pepererat infantem, sic satis sanum, apparuit placenta plena undique folliculis, in quarum cavitate rotundi lapilli erant. Ita RUYSEHIUS placentam vidit mutatam in ampullas, [11] aqua pellucida ad ignem conefcente plenas. Hi folliculi pereunt in

(11) neque repugnat, aut incommoda est, icon *Spigelii* T. 6.
Hydatidum in universum regio uterina fertilis mater est. Sae-
pissime vidi tubae appendas, &
PECHLIN. cent. I. obs. 19. &
etiam GRAAF. p. 259. VESLIN-
GIO observatas p. 71. frequentes
non raro in ovario, RUYSEHIUS
adv. L. n. 2. &c. in utero alii
ZOD. GALL. ann. IV. m. Mart.
&c. VALISNERIUS p. 48. Sed
etiam placentae hydaticae mini-
me raras sunt. C. GEMMA in-
ter species abortuum recenset spe-
ciem quae vitellos quasi ovo-
rum & vesicularum mistas habeat
Cosmocrit. p. 86. f. 1. Ovula cum
setu egesta PANAROLUS habet
obs. 181. *Pentec.* II. Globum
ex bullis compactum MARCEL-
LUS DONATUS p. 461. Apud
CHRIST. a VEGA septingentae
vesicae loco fetus egestae, cum
frustis carnis, & similis apud VA-
LERIOLAM historia existat. Tu-
mor ex uteri ore pendulus ex-
stirpatus, totus plenus cellulis
aquis RUYSCH. *Thef.* VIII. n.
102. Similis tumor in mortua
reperitus adhaerens utero BRESL.
1726. M. Mart. Mola vesiculatis
E. N. C. Dec. II. ann. III. n. 157.
MAURIC. obs. post. 107. ZOD.
GALL. III. p. 74. la MOTTÉ
obs. 15. BRESL. 1723. m. Sept.
BUCHNER. *misc.* 1729. p. 316.
ALLEN. *syn. med.* c. 14. n. 41.
Partus vesicularum numerosissima-
rum, inanum, aut plenarum,
aqua crocea TULPIUS obs. 32.

L. III. Partus bullularum, quae
tres replerent cantharos E. N. C.
Dec. II. ann. IV. obs. 114. & simi-
lis historia ann. VI. obs. 164. Race-
mos vesicularum ab abortivo de-
jectas LANCISIUS ep. ad MU-
LEBANCHER. & similis est hi-
storia MAURICEAU obs. 347.
Aliquot millia hydatidum per uterum
egesta LANZON. obs. 8c
E. N. C. Dec. II. ann. 9. obs. 38.
& similis est historia BIANCHI
de gener. p. 245. Acervus vesicu-
larum septimo mense egestus,
coagulabilis VALISNERI obs.
29. & denuo E. N. C. Cent. IX. obs.
73. cum bona icon: & nune-
rosissimas historias IDEM habet
in *defensione* sua. conf. BRESL.
1724. p. 212. MORGAGNUS
epist. III. n. 14. Schulze de trieb.
p. 85. *Stalpart. van der Vliet.*
Cent. I. obs. 70. novem librarum
pondere bist. de l'Acad. 1715.
obs. 7. Frequenter se huiusmodi
placentas reperite *Ruysebius de-*
musc. ut. passimque recenset *Thef.*
X. n. 63. 64. 65. *Thef. maxim.*
n. 46. iconesque dat obs. 33. cum
Venetto, Riva, & Bidloo *exerc.*
Chir. T. II. Post fetum egestus
hydatidum racemus 4. librarum
Scurig. mulier. p. 289. Carnea
mola cum appendis vesiculis *Scha-*
arschmid berl. nascr. II. p. 352.
Placenta vesicularis filamentis ca-
vis cohaerens, liquore spisso ple-
na, sapido bist. de l'Acad. des
scienc. 1715. p. 8. In vacca etiam
molam vesicularem *Valisnerius* de-
scribit.

(12) in præparata placenta, dum eluitur, neque apparent, nisi in morbis. Satis enim manifestum est, has hydatides esse vasa lymphatica, & forte in decrefcentibus seriebus in placenta omnis generis vasa arteriosa, venosa, lymphatica (13), & fere omnia reliqua vasorum genera.

Membranula) Ut nihil videatur ad placentam posse venire (14) Quando femina perfectissime parit, non fetum excutit, sed sacculum in quo fetus est, undique instar ovi integrum, quale ovum a citharæda

- [12] Peculiarem descriptionem partus 6000. vesicularum, post scetum imperfectum egestarum dedit *Valisnerius oper.* II. p. 32. & ex eo *Lanzonus obs.* 6. tum *Malpighius*, plures ex petiolo proprio ejusque ramis appensas fuisse, mole varia, fibris donatas longitudinalibus, & circularibus, plenas lymphadenia, ipsipida, non coagulabili poss. p. 87. Eas partim ex placenta, partim ex amnio & chorio *Valisnerius* deducit p. 38. 49. &c. Sed *Ruysschius* fuisse, placentas retentas juniores ad mentem quantum in molas carnosas plerumque abire, mense vero septimo, & octavo in hydatides obs. 23. (& ex eo *Bianchi* p. 129.) esse vero vasa ipsa placentæ in hydatides mutata *Tbes.* III. n. 8. in extremitatibus suis *Tbes.* VI. n. 102. 103. *Advers.* I. n. 2. ut tamen alibi a cellulosa vasorum tunica deducat *Tbes.* VI. n. 104. Id certum est, nasci, ubicunque cellulosa fabrica est; & nihil inde in glandulis præsidii esse. Nam rami, quibus appendebantur vesiculæ, cavi undique, ita consentiebant cum hydatidibus, ut vel per rana in vesiculas, vel per illas in ramos aer subiret *Valisnerius* E. N. C. Cent. IX. obs. 73. Hoc experimentum, & per immutata vasa explicari potest, & per cellulosæ membranæ morbum, per glandulas non potest.

- [12*] Calluli in fimbriis tubarum *Graaf.* p. 259. ibique, & in ovarii membrana *hist. de l'Acad.* 1701. n. 3. Lapilli grandis milli similes in ovario hydropico *Petermann.* apud *Schurig. mul.* p. 317. In secundis arenulæ inter vasorum racemos & in placenta venulis E. N. C. Dec. II. ann. IX. obs. 137. Pessus in vagina frustra lapideæ obductus II. Cent. VI. obs. 44.

- [13] Ita recte *Vieussinius* apud *Voglium* II. p. 168. multa vasa placentæ lymphatica esse, licet a *Ruysschio* replicantur eademque *Valisnerius* observatio est *op.* II. p. 51. Hos meatus lymphatico-lacteos placentæ videlicet *Vieussinio* describit, ut ab arteriis recipient mercurium insulsum; qui per eodem exprimi possit apud *Voglium* II. p. 169. An vasatenuiora venas vero lymphaticas vulgares, dictas *VVhartono* p. 270. 244. ex sola omnino theoria, vel certe cum gelatina funiculi confusas, tum *Densington*, & *Diamerbroeckio* repetitas p. 213. 222. & a *Meryo* ostensas in membranis aquarum, la *MOTTIO* teste p. 101. chylososve ductus funiculæ *EVERARDI*, & *PASCOLI* III. p. 86. merito negat se vidisse *HOBOKEN. anat. rep.* p. 325. atque demonstrat particulas, quæ possint pro lymphaticis inponere p. 318.

- [14] DCLXXVIII.

roeda ejectum optime descripsit HIPPOCRATES (15). Hujus ovi exterius involutum duplex est, membranacea chorion, & placenta. Illa, quae exterius est ovi involutum, super ovi ambitum ductum, venit ad placenta limbum, tunc finditur in duas laminas (16). Exterior supra limbum trans placenta scandit, hujus convexam, & uteri concavam partem obducit. Altera, interior pars fissae chorii, inter placenta fetumque subducitur, cumque amnio membrana ibi connectitur, ut chorion omnino in placenta duplicatura sedeat, manifesto argumento, ad fetum eam, non ad matrem pertinere, licet in ipsis embryonis initiis placenta, & totum ovum pars fuerit materni corporis (17). Haec sola placenta nescit cum matre fetum, numquam enim canal is aliquis inventus est, qui inter matrem fetumque communis intercederet.

Funiculum) Corpus nempe, per quod fetus cum placenta communicat, naturae pene cartilagineae, flexilis, ut in quamcunque partem facillime cedat. Perforat autem chorii laminam internam (18), deinde amnion sic ad fetum penetrat.

Arterias) Arteriae iliacae ex magno trunco lumbari aortae oriuntur, inde vero procedentes dant ramum utrinque (19), quem etiam aortam dedisse videtur, qui retrorsum prodeuns, ex suo trunco, venit

[15] DCLXXIV. DCLXXV.

[16] DCLXXVIII.

[17] DCLXXIV. Desit autem pars corporis materni esse, quando ovum, cujus pars placenta fuit, de luteo corpore decersit.

[18] Amnios ad funiculum se insinuat ad pollicis ad minimum distantiam a primo vasorum umbilicalium ad placenta adventu, & a chorii adhaesione. NOORT VVYCK. p. 133. ubi fere vasa incipiunt separari ROUHAULT. 1714. p. 387. HOBOKEN. anat. rep. p. 156. f. 1. B. f. 15. K. f. 19. KUYSCH. adv. anat. II. n. 10. Intra amnion connecta cum amnio media adhaeret funiculo superior Roubaul. observ. p. 22. Mem. 1716. p. 343. Caeterum perforationis funiculi, uti per tres membranas lubi, locum, sed puto, non ad natu-

ram, dat. Hobokenus anat. rep. f. 32.

[19] Originem alibi dixi DCLVI. In funiculo ipso solidae omnino sunt, ut sediones se sustineant, neque ita remes, ut Harvey fecerat p. 188. graciliores autem quam in corpore, constat Hoboken. anat. rep. p. 36. plerumque inter se aequales, ut tamen etiam alteram ampliorem viderim. In certo in funiculo situ ambulant Roubaul. observ. p. 27. conf. Hoboken. anat. prior. f. 12. & repet. p. 188. 17. 36. modo longe simplices, & rectae, modo, & tunc imprimis quando rectissimae, sunt Roubaul. 1714. p. 413. gyrtis praecipitibus ad angulos valde acutos contortae, ut contra se ipsas quasi redeant in anulum paucioribus spiris, & incerto numero Roubaul. observ. p. 38. 1714. p. 412. f. 6. d. d. c. Munroo.

nit utrinque ad umbilicum, sub interiori [20] lamella peritonaei, inde porro ex fetus corpore exit; & subit funiculum umbilicalem, quae ultimo in centrum placentae implantatur. Hae arteriae repletae di-

Monroo l. c. p. 160. T. 1. f. 5. & fere *Hobok. anat. repet.* f. 11. 12. Venam plerumque mediam continent *Monroo* l. c. *Hoboken. repet.* f. 6. 31. ut pulsu sanguinem venosum urgent *Roubault. off.* IV. p. 513. *bist. de F Acad.* 1718. p. 15. Arteriae, quam venae longiores sunt, quod saepius gyrentur *Roubault.* p. 28. *Hobok. anat. prior.* p. 29. Inrus in arteriis *Hobokenus* operose describit nodos, quorum prius aliqua memoria fuerat *Carpo* p. CGLXIII. C. *Gemmae* p. 85. *Fabricio* f. 20. 16. *Riolano* p. 337. *Rolancio de fetu, Courveo* p. 200. valvularum nomine, & aliis. Hi passim picti *Hoboken. anat. repet.* f. 1. 2. f. 1. 2. 5. 9. 15. 16. 31. *Roubault.* 1715. f. 1. 2. 1714. T. XI. f. 7. 3. latitudines sunt arteriae majoris *Hoboken. repet.* p. 141. f. 38. 39. *Bidloo* T. 16. f. 3. *Vieussens* apud *Vogli*, rotundae *Hoboken. repet.* c. 1. art. 8. f. 5. aut piriformes, versus placentam angustatae *rep.* p. 325. extus macula designatae *anat. prior.* f. 5. 6. 7. *repet.* f. 27. c. 1. art. 4. minori, quam in venarum nodis *rep.* p. 343. exigua plica membranae internae duplicis *anat. prior.* p. 44. 45. a reliqua simplici cylindro arteriae distinctae *rep.* c. 1. art. 8. p. 316. f. 39. constantes p. 134. 236. *anat. prior.* p. 57. *Roubault.* 1714. p. 409. ab extensione suis non evanescentes *Hobok. repet.* p. 296. 340. in quibus membranae arteriae tenuiores sunt p. 235. & laxiores *anat. prior.* f. 5. 6. 7. & ipsa membrana funiculi tenuior *repet.* p. 346. Eos nodos

credit *Hobokenus* sanguinis iter morari, si retrocedere vellet versus jecur *repet.* p. 141. 233. 750. c. 2. art. 4. etiam experimento usus p. 141. quale *Rudbeckius* etiam habet apud *Hemsterbus* p. 327. Plicas similiter internas, quae mercurium in globulos dividerent, *Ruysschius* habet *cat. Mus.* p. 156. Recentiores autem his nodis parum tribuunt, valvulaeque esse negant *Verbeijen.* 11. p. 344. *Roubault. off.* p. 33. & 1714. p. 400. & *Eyffonius* in *epist.* ad *Hobokenum*, non dissente *Hobokeno* p. 241. cum prius omnino pro valvulis ex duplici membrana interna dedisset *anat. prior.* p. 37. Varices vocat *Brendelius de matr. fet. n. 7.* Violentiae demum obstricticum tribuit *Roubault.* p. 34. gyris autem *Mauriceau* p. 239. Et certum est, ceram facillime viam per arterias ad placentam relegere *Roubault.* l. c. impletamve cera, vel inflatam *Roubault.* 1714. p. 711. arteriam omnino cylindricam apparere. *Roubault.* in partibus rectoribus arteriae, nodos magis repositi observat *off.* p. 38. Porro prope adhaesionem annui, ad funiculum, ramo intermedio arteriae umbilicales dicuntur uniti *Roubault.* 1714. p. 187. *observ.* p. 29. *Vieussens* apud *Voglium* II. p. 220. *Hale* in *Phil. trans.* f. 1. N. in ruminantibus vero *Taunry* p. 129. *Fabric.* f. 38. *Hobokenus secund. vitul.* f. 23. 24.

(20) Exteriores accumbunt peritonaeo, perque cellulosam repunt.

distendunt (21) totam placenta. Nullum vero dubium est, quin a fetu ad placenta eant, id dubium esse potest, an sanguis quem advehunt, in placenta maneat. De ea quaestione, nunc dicendum est, Canales omnes, qui recta ab origine sua procedunt, faciunt, ut illae liquidi sui particulae recta progrediantur, quae motus sui tenaciores sunt. Si sclopetum oneraveris [22] fragmentis plumbi, quod metallorum, post aurum, ponderosissimum est, tum cupri, ferri, ligni-

V 2. f. 217. Art. 2. que

[21] Ubi ad placenta venerunt trunci majores, pellucunt per amnion & mediam *Hoboken. repet.* p. 188. *Bidloo T. 61.* f. 1. radiorum more si funiculus centralis fuerit, aut majores ad partem maiorem placenta, si eccentricus *Roubault. 1716.* p. 346. Ita per superficiem cavam placenta, inter chorion & mediam eunt *Roubault. observ.* p. 17. neque aliter intelligo ejus scriptoris, duplicaturam mediae p. 29. uti eo refero voces *Hoboken.* quando per mediam alit. repere p. 322. & consentit *Cl. Noortwyck.* p. 26. media nempe ipsi amnion est. Per cellulofam adeo chorion, & mediae interpositam *Noortwyck.* p. 25. 27. longe repunt arteriae, & ad limbum paulatim extenuantur. Hae arteriae inter se invicem communicant, & venae perinde *Galen. de util. part. L. XV. c. 4.* Vide porro *Bidloo T. 60.* f. 1. Ab eorum fundamentali *Noortwyck.* p. 19. rami exeunt ubique, qui vel prope lumbum, vel citius *Noortwyck.* p. 27. mediam primo *Roubault. 1714.* p. 188. f. 3. 1715. p. 132. *observ.* p. 17. *Hoboken. repet.* f. 19. C. deinde chorion perforant *Hob. rep.* p. 43. aut secum vaginae specie adducunt *Roubault. observ.* p. 23. 1715. l. c. 1716. p. 346. *Noortwyck.* p. 152. Hae ipsae arteriae chorion placenta neclunt, quia perforant *Noortwyck.* p. 27. Hi porro trunculi in carnem placenta ad perpendicularum demerunt conf. *Hoboken. rep.* f. 21.

f. 20. 22. bh. ubi observandum, mediam apud *Roubault.* & *Hobokenum* plerumque cum chorio conjunctam, pro una haberi membrana, ubi chorion cavam partem placenta sublinat. Eundo rami extenuantur, efficiuntque hemisphaeria placenta, superius dicta *Roubault. 1715.* p. 133. 1716. p. 348. tenues & lymphaticorum similes *Ruyseb. Adv.* II. n. 10. hinc in placenta minime, uti in umbilico pulsantes *Nymman.* p. 27. finibus tomentosis *Hoboken. anat. repet.* f. 41. Donec ultimae fibrillae arterioae partim per villosam chorii lamellam exeant *Roubault. 1716.* p. 347. & utero obponantur *Roubault. observ.* p. 26. partim in venae umbilicalis ramos continuitate canalis insectantur not. 9. A limbo placenta conspicua vasa chorion adeunt *Needham c. 4. Roubault. 1716.* & *off.* l. c. quae longe per eam membranam repunt, partimque in ea terminantur, partim aperiuntur in uterum, partim ramulos capillares spargunt ad amnion, & mediam *Roubault.* l. c. qui plures inter chorion & mediam, pauciores inter istam, & amnion apparent *1714.* p. 198.

[22] Conf. *OCLIII.* not. 2. & de umbilicali *Bollinger. of the nutrit.* &c. p. 76. Huic diversitati aliquid tribuo. Nam angulus, quem procedentes cum trunco umbilicales intercipient, acutus satis *Parsons of the bladder T. V. f. 2. Trevv. de differ.* f. 71. sensimque

que, & explosis sclopetum in loco ita disposito, ut locus observari queat, in quem globuli delapsi sunt, invenietur, plumbeos globulos longissime progressos fuisse, ligneos autem sclopeto jacere proximos. Ita sanguis, qui per Aortam descendit, incurrit in arterias Iliacas, invenit laterales, & retrogradas arterias umbilicales, ea ergo subit eas pars sanguinis, quae ex legibus hydraulicis morui suo continuando ineptissima est; haec pars tenacissima, & seculenta sanguinis fetus, aufertur per arterias umbilicales, redditur placentae. Sed placenta refert ad fetum eum sanguinem, qui vel per arterias umbilicales advenit, vel ab arteriis illis tenuissimis uterinis in venas placentae refunditur: uterque sanguis confluit in venam umbilicalem, tum ille, tum iste, subtilissimus, & defaecatissimus, quem mater remisit fœui. Plerique nunc etiam sapientes viri docent, sanguinem dimissum ex fetus arteriis, ferri in placenta, ibi, tamquam in pulmone (23) mutari, cum eo tempore verus pulmo [24] in fetu oriatur, uti in homine respirante sanguis ex pulmonis actione mutatur. Hinc in placenta ferri, quod in sanguine fetus faeculentis.

que retrogradus est, & vidi ceram in unam umbilicalem impuliam, per alteram non rediisse, manifeste argumento, hoc iter paulo difficilius esse directo itinere.

- [23] Ita *Needhamus* & *F. Hofmannus* p. 348. chylum nempe cum sanguine miscere. Sed etiam *Aranzius*, & *Riolanus* p. 373. sanguinem volebant in placenta depurari. Aerem vero, a matre accipere fetum per umbilicum *Hippocrates de natur. puer. n. 5. 37.* ipsumque dudum semen a matre spiritum habere n. 1. renovante *Mayovius opp. p. 272.* & *Meryus auctent. mem. X. p. 273.* etiam experimento addito de la *circal. p. 55.* & *P. Corn. van. det VViel. & Duvvernoy Comm. Paris. 1699. p. 321.* & *Palinuro Giorn. de letter. suppl. 3. p. 116.* & *Cheseldenio L. IV. c. 3.* His ita credo, si talem aerem velint, qualis in sanguine materno est, nullo elatere praeditum, neque adeo pulmonis officium suppleturum GCI.

- (24) Non desunt, qui fetum, in medijs aquis velint respirare. Frustra opponitur aeris impossibilem accessum per ovum integrum, aquas circumfusas undique, & pelionem ponderosum, certissime fundum petentem, quem aeris accessus continuo cogit innatare. Audacior contra it *Maximus* toto libello, post *Claudium la Courvois* P. III. c. IX. *Everhardum* p. m. 252. *Vestlingium*, *Charletonum* p. 165. aliosque, dictos *Tilingio* p. 347. & *Meryum* apud du *HAMEL* p. 302. Utiur autem *Maximus* argumento a suctione fetus diss. 3. Praeterea adferunt vagitus uterinos, quales *Maximus* compilat diss. II. p. 8. 1099. & *Bertholinus* bist. I. cont. I. & ex alijs, & ex adfirmatione feminae. Haet etiam similes historias vagituum *Libavii*, *Nymman. de vit. fet. p. 44.* *Guiffart. p. 103.* *Densingius, Schurvig. sialogr. p. 396.* *Tiling. de placent. p. 412.* *Bobn. de infanticid. p. 176.* *Fantonus, Needham. c. 3. E. N. C. Dec. I. ann. 3. abs.*

lentissimum est, ut per fabricam placentaë satis tenuis reddatur, qui ad fetum redire, valaque ejus percurrere possit: certum enim est, sanguinem in vena umbilicali tenuiorem, & fluidiorem (24*) esse, quam in arteria. Ego vero credo, hoc in matre potius fieri. Non nego sanguinem omnino etiam in fetu parari, ex liquore nardum sanguineo, uti pullus in ovo omnino sanguinem suum ipse facit, qui nihil a matre accipere potest: hunc suum sanguinem projicit fetus per duos canales arteriosos excretorios, adeo amplos, ut fetus intra pau-

obs. 164. Dec. II. ann. V. obs. 194. ann. 7. obs. 41. pro re certissima ann. VIII. obs. 196. ann. X. obs. 135. Dec. III. ann. 5. 6. obs. 113. Cont. I. obs. 50. Lanzaoni obs. 16. sed ex auditu, & nuper tuse confirmatas dedit Derham. Phil. trans. n. 124. & Cappellerius, eruditissimus Lucernensium medicus Brest. 1719. m. Aug. p. 516. repetitas a Schurigio embryol. S. II. c. 4. in brutis denique variis adfertur, muribus E. N. C. Dec. II. ann. X. obs. 122. catellis ann. IX. obs. 157. Singultum denique fetus humani habent in E. N. C. Dec. II. ann. VI. obs. 15. Tum huc referunt pipitum anatum, & gallinarum in ovis decimo octavo die exaudium HARVEIO de gener. p. 39. 69. 70. 72. & FABRO apud HERNANDES p. 771. decimo vero MALPIGHIO de inemb. p. 10. nuper etiam DERHAMO teste REAUMURIO Mem. &c. II. p. 33. & A. MAITRE-IBAN. p. 279. & MONROO Edimb. soc. II. p. 224. & olim ARISTOTELE hist. VI. c. 3. Porro cavitates aëreas inter humores, & vasa NEEDHAMO digestas c. 3. bullas aëreas in sanguine fetus MORGAGNO visas ep. XX. n. 58. aërem vero in difficili partu ex secti fetus abdomine erumpentem MAZ. diff. II. p. 13. Denique necessitatem æquilibrationis contra aërem externum ad-

legat MAZINUS p. 17. Mensuras etiam, & pondera decrecentis in pulmonibus ponderis specifici, adducit Idem in diff. VI. ut demonstret, non aliam, nisi aeris accessionem, hujus specificæ levitatis causam esse posse.

Sed vagitus uterinos, plerumque ex ignarorum relatione a medicis admissio, recte negare videntur Diemerbroeck. p. 216. & Valisnerius in 2. dialogo, & Brendavens. 8. vers. p. 1879. & Brendolus de nat. fet. n. 13. qui enim sonum edat fetus in mediis aquis? quod ne adultus quidem potest. Pullorum pipitus in ovo integro negat expertissimus Valisnerius, tribuitque rimis ovi, & in fetu tum demum possibile esse concedit, quando membranae ruptae sunt Giorn. de letter. suppl. 3. p. 143. uti corticem rupit videri, cum pullus pipitet Faber l. c. In putredine vero aer utique evoluitur, & aëret elasticus, idemque forte Mazino inposuit. Pulmonem porro in adultiore fetu minus compactum esse, aëre crediderim, & minus credo scriptori, qui de industria hypothesein ornat. In fetu denique pulmo non inflatur, quando in vacuum dimittitur Hofman.

(24*) Tenuiorem LITTE Mem. de l'Acad. 1701. p. 386. Boridiorem HOFMAN. l. c.

paucissima horae minuta exsanguis (25) pereat, quando obstetrix funiculum ligare oblita est: hic enim tristissimus calus, ante tres annos Leidae accidit: multum adeo sanguinis a fetu accipiunt; Eo abit is sanguis, ea copia, quae faciliorem viam, sive resistantiam minorem, in placenta, quam in corpore invenit. In placenta sanguis iste in venas transit, directa fere via, cum ceracea materies inpulla in arteriam umbilicalem, per venam redeat. Verum praeter hanc portionem, quae ad fetum redit, videtur omnino aliqua pars arteriosi sanguinis ab ultimis placenta arteriis in minimas uteri (26) materni venulas venire, inque matris venas, pulmonem & cor: ut sanguis, qui in fetu nullam pulmonis operam expertus, iners est, in matrem refundatur, in huius pulmone elaborandus: matris vero sanguinem in suo pulmone perfectum, per arteriolas uteri, videtur reddi venulis placenta; ut tantumdem praeparati sanguinis mater fectui restituat, quantum crudi, & imperfecti sanguinis accepit a fetu. Neque credo placenta pulmonis vices obire posse: oxiolus enim pulmo, & aere destitutus, nihil agit: sed placenta aerem nullum habet, neque agitur, & videtur potius circulationem sanguinis difficilem reddere, quam expeditam. Et sanguis, qui per compactam, resistentem placenta massam transire potuit, multo facilius per corpus fetus minus resistens circulationem absolvere poterit.

Vaginae (27) Placenta constat ex vasis sanguineis, serosis, & lymphaticis, & cellulosa membrana, quam demonstrant hydatides, in quas placenta mutari visa est, manifesto argumento, loculos inter vasa inanes esse.

Vena

- [25] Conf. DCLXXXII.
 [25] Ita DRELINCOURT. *Periœcho* 17. seqq. MAUROCORDAT. MAURICEAU p. 130. ROUHAU. 1714. p. 415. & de vigesima parte sanguinis arteriarum umbilicalium. IDEM ROUHAULT. 1715. 132. Mihi valde probabile videtur, & videtur requirere experimentum, quo constat, vasa uterina, quae opponuntur placenta, venosa esse. Solent confirmare magnitudine venae umbilicalis, sed ea arteriis suis non majori ratione amplior est, quam est jugularis in adulto ad Carotidem. Negabat totam rem TAUVRY. p. 137.
 (27) Carnem albam vasa investire in placenta FABRICIUS viderat l. c. P. I. c. 1. & materiem, qualis

in umbilicali fune est, arterias & venas, obliquis tamen, instar capsulae investire VVHARTON. p. 244. CL. BRENDÉLIUS Internam chorii laminam vasa comitari dixit l. c. n. p. Sed disertius ROUHAULT. arterias venasque à cava superficie amni, per mediam membranam viam, sibi facere, & ab ea vaginam accipere *Mém. de l'Acad.* 1715. p. 131. 1716. p. 346. neque ulibi vasa nuda ire *observ.* p. 15. 16. suamque singulae vaginae arteriam esse venamque *observ.* p. 14. easque vaginas eundo adnumerari 1715. p. 135. Porro CL. NOORTVVYCK. cellulosa funiculus; perinde uti VVAERTONUS, continuari vidit in ter

Vena) Venae ex omni visibili placentae puncto exteriori [28], aut interiori, oriuntur suis radiculis; eae dispersae paulatim coeunt, & in unicum denique truncum [29] conflunt, qui, cum valvulis destituitur (30), repletus arte Ruyschiana, totum corpus placentae aequabiliter cera replet. Ubi ea vena ad funiculum umbilicalem venit, pergit ad

ter mediam (quam amnion vocat) & chorion, inque ea vasa repere p. 26. 148, ut etiam inflando funem amnios a chorio secedat p. 142. hanc ergo subterni placentae, & comitari vasa p. 148.

- (28) Venae placentae oriuntur, aliae quidem ab arteriis, quod demonstrat injectio not 9. aliae ab uteri vasis chorio continuatis DCLXXVIII. aliae a parvis venis superficiali placentae, oppositis uterinis sinibus, qui partem, quam Cl. Roubault, vigesimam credit esse sanguinis placentae, reddunt ferui. Paulo majorem tamen esse, quam est exportatio arteriarum, demonstrat incrementum fetus. Inde conflunt aliae quidem venae in sinus venosos, molles, subitratos superficiei convexae placentae, NOORVVYCKIO dictos p. 26. aliae in trunculos venosos sunt, qui contra arterias comites eunt, & pariter chorion perforant, mediamque, ROUHAULT, 1714. f. 13. tuncque faciunt rete in cava placentae facie, simile arterioso, & crassius, cum venae majores sint HOBOKEN, anat. rep. p. 17. & plures p. 173. 279. contra contrariam HARVEI non bonam, affirmationem p. 239. & TILINGII p. 306.

- [29] Vena umbilicalis unica in funiculo fere est, arteriis multo amplior, ut ego venae lumen repererim 500. cum arteriarum juncturum lumen esset fere 392. quadruplum vero lumen in junctura arteriae ROUHAULT. off.

p. 40. 1714. p. 413. & rarum exemplum sit, quando venam, altera arteria non majorem vidit Noortwyck. d. 29. sed & ibi paulo ulterius naturalem magnitudinem recuperavit Conf. ic. Trevv. Comm. 1733. T. 1. f. 2. Tenuior arteriis & collapsa est, alter, quam vidit Noortwyck. p. 25. Rectior in universum est arteriis Hoboken, anat. prior. p. 29. Menniceau p. 228. ut mirer magis capreolatam dici Arantio p. 20. & profundior, & copiosiore cellulosa cincta Noortwyck. p. 25. alibi tamen pariter superficialis est, atque gyratur. Ad placentam ampliorem esse Hobokenus anat. rep. p. 54. 55.

- (30) Plicam obcuram, valvulae similem, ad divisionem trunci, ubi funiculus placentae committitur, posuit Hobokenus reper. p. 29. 193. f. 7. 29. veras autem valvulas in ramis primariis p. 32. Deinde nodos venosos, pridem tactos Carpo p. CCLXIII. & Riolano p. 377. qui sanguini tribunt in gyris retento, & varicorum nomine citatos apud Harveium p. 289. dictos etiam C. Bartholino in anat. p. 176. Laurembergio in proceffu. p. 153. T. Bartholino anat. p. 111. bist. 61. Cent. I. & Eyssenio, & macularum nomine a Spigelio de form. fet. c. 9. extus maculis distinctos Hoboken. rep. p. 343. Roubault. off. p. 32. arteriosis majores, olivares anat. reper. f. 32. p. 343. pro frequentibus etiam, habitos a D. la Motte obs. 211. fufe describit Hobokenus. Minus veros nodos esse fateatur tamen p. 138.

ad centrum gravitatis fetus, nempe umbilicum. Ibi epidermis (31), quae totum corpus fetus ambit, non pertunditur, sed erigitur circa funiculum umbilicalem, & fit prima ejus vagina, quae super funiculum adurgit. Idem & reticulum Malpighii facit. Deinde cutis eodem modo non perforatur, sed in cavam cylindrum funiculi ascendit, & fit secunda vagina. Porro cellulosa membrana pariter ascendit, ambitque funem. Denique subest peritoneum, nam muscoli utrinque secedunt; id constat duabus distinctis laminis (32), separatis, teste LOBO a MEKKEN, inter quas viginti aquae librae recipi possunt, uti per experimenta certum est. Quando nunc funiculus umbilicalis ad anteriorem peritonaei laminam venit, eam ingreditur, & circumdatam accipit, anteriorem vero non perforat, sed exit inter utramque lamellam peritonaei ad fissuram hepatis anteriorem: ibi, peritoneum secedit, & vena sola pergit, suoque tubo insinuat in venam portarum.

(33)

p. 138. 190. sed laxitates sinusque dilatatae venae p. 138. 144. 358. f. 28. 30. 31. 42. 43. Inprimis, analogas valvulis p. 139. ubi vena rugulis intus transversis inscribitur p. 358. f. 44. His credidit *Hobokenus* effici, ut sanguis difficulter contra naturale iter a fetu ad placentam relabatur p. 43. 28. & valvulas etiam vocat VERNETTE p. 275. Verum reputant certe experimenta, & injectio contra iter sanguinis facile succedit. Refutat etiam has valvulas VIEUSSENS, & BLASIUS *anat. bom.* p. 164. & auctores *AG. Mar.* Balth. 1699. p. 19. & *Mauriceau* p. 230. *Harveius* crediderat moderari sanguinis impetum p. 229. In cervae fetu omnino sanguis ex fetu in funiculum nolui redire I. M. Hofman. E. N. C. Cent. X. app. obs. 46. Valvulam vero, aut plicam, ad venae umbilicalis cum sinu venae portarum conjunctionem, pene circulearem TREVIUS habet de differ. inter. nat. & non. nat. T. I. f. 1. f. aliaque valvulas, & ad venosi ductus utrumque finem, tum ad sinum TREVI. T. I. f. 6. 8. 18. 19. & f. 64.

TAUVRY. p. 180. ib. in vacca visam MORGAGNO *adv. anat.* I. p. 21. tum ad cavam TREVV. T. I. f. 1. TAURY I. C. CROESER p. 14. nondum manifestum vidi, neque ipse multum tribuit. TREVV. p. 44.

[11] De hoc anulo nondum certa experimenta habeo. Id interim video, peritoneum in sede funiculi integrum esse, tum cutem circa orientem, & quasi articulatum funiculum caeco anulo protrudere, deinde funiculum anulo quodam a cute & peritoneo TAUVRY p. 238. & intertextis fibris obliquo circumdari. Conf. FABRIC. f. 17.

[12] Externe circumposita cellulosa, & membrana vera. Vena vero, perinde uti arteriae umbilicales & urachus, nullibi internam membranam subiit, quam his vasis remota integram superesse manifestum est HENSING. in *utilissima diff. de periton.* n. 13. & inprimis n. 44. ut omnino plicae peritonaei VVINSLOVVI, & CASSEMBOHMI de viscera. f. 56. 57. quae urachum & arterias umbilicales sustentent, nihil obscuriores sint. Vaginam

NOVA.

(33). Haec vena sanguini vehendo destinata est, qui a visceribus chylopoieticis fetus redit. Accedit nunc sanguis a placenta, adeoque plus

nova SCHULZIANA, & TREVVIANA *Comm.* 1737. *bebd.* 13. mihi videtur in fetu & homine nuper nato, pulpola, quasi a funiculo continuata substantia esse, neque ad peritoneum pertinere. Haec carnosa pulpa est, quam in exortu arteriarum umbilicalium vidit DREINCOURTIUS, apud PECHLINUM *de purg.* p. 479.

- (33) Vena umbilicalis ab umbilico satis longe ascendit retrorsum, sustentata a ligamento suspensorio hepatis, quo continetur; tunc fissuram invenit, quae hepatis findit in lobum dextrum & sinistram CCCXXXVIII. not. 5. fere directe retrorsum eunt. Per eam subit vena, & in itinere saepe portione carnea hepatis tamquam ponte protegitur TREVV *f. 73. p. 42. & Comm. Nor.* 1733. T. 3. f. 2. ARANTIUS p. 18. aliquando vero duabus, donec ad fissuram hepatis transversam veniat, ibique accedat ad sinem sinistram MORGAGN. *Adv.* 3. p. 21. rami sinistri venae portarum, quem solent *sinum Portarum* vocare CCCXXXIX. not. 5. conf. TREVV l. c. f. 1. ad i. i. f. 22. 23. major eo sinu, CHESELDEN *anat. of. hum. bod.* T. XXXIV. ut non debuerit propagine ejus haberi ab ARANTIO l. c. Cum eo sinu, inflexa, & obvia, & angulo antrorsum obverso, ita conjungitur umbilicalis, TREVV *Comm. Nor.* 1735. f. 2. ut utrumque dici possit, duos ramos principes edere, quorum alter cavae, alter (nempe sinus) venae portarum inferatur, uti SPIGELIUS p. 11. *Riolanus* not. *de motu cord.* p. 123. & *de fetu* p. 177. post *Arantium* *de fit.* p. 40. conf. TREVV *f. 74.* Sed ex toto itinere, etiam ubi hepatica carne te-

gitur, priusque quam sinum subeat *Coeselden.* l. c. & ad eam inprimis conjunctionem, *Fabric.* f. 17. 18. 19. TREVV l. c. f. 1. 22. 23. 55. 56. numerosissimos ad hepatis ramos edit, dictos etiam *Hardenberg* in *aplar.* n. 8. & ab *Haberkano* pictos *secund. f. vitul.* f. 27. neque parvos, ut volebat *Bellinger* p. 60. sed tales, quales in iisdem locis adalorum vena portarum edit, male negatos a TAUVRYO p. 130. & NEEDHAMO, a quibus ramis in fetu tota fere hujus visceris caro conficitur. Cl. vero TREVVIVS p. 44. & HEBENSTREITIVS in *progr.* nullos ad sinum usque, multos ultra eum ponunt, multique refutant eos, qui venae umbilicalis ramos aliquos faciunt: sed ea, quae saepe vidi, & nunc video, descripsi. In ea enim aetate vena portarum adeo exigua est, ut se habeat ad venam umbilicalem :: 400. 900. & :: 400. 729. consentiente Trevvius p. 45. Horum ramorum hepaticorum venae umbilicalis unus pene & directo hujus venae, magis tamen dexterio *Giffon de hep.* T. A. C. 33. *Heister* E. N. C. Cent. VI. obs. 27. TREVV l. c. *Comm.* 1733. T. 3. f. 2. & paulum sinistrorsum inclinatus est *Fabric.* f. 10. *Giffon* l. c. *Heister* l. c. & *Comm. nostr.* CCCXXXVIII. not. 3. quem non bene penitus & directo trunci euntem pingit *Fabricius* f. 17. 18. 19. & plerique. Hic ramus sulcum hepatis posteriorem relegit, retrorsum eundo, inter lobulum *Spigelii* & lobum hepatis sinistram, nullis, mihi visis, ramis exhibit, & terminatur vel in trunco Cavae, ut TREVV. in omnibus figuris, vel in ramo aliquo Cavae hepatico, ut nunc video.

X

Tom. IV. Pars II.

plus sanguinis offertur hepati, quam potest admittere. Ergo ex sinu venae portarum, & ex extremo sine opposito venae umbilicalis, tubulus prodit, qui recta via in cavam venam ducit, quae sanguinem a partibus inferioribus in cor revehit. Neque ea cava nimio sanguine oncratur, non enim omnem sanguinem refert, quem aorta ex corde abduxit in iliacas, sed diminutum ea copia, quam arteriae umbilicales receperunt: ita fit, ut cavae truncus inferior minus recipiat, quam per aortam exiit, & hunc defectum perfecte supplet sanguis, qui per venam umbilicalem advenit. Si vero ex quacunque causa fiat, ut sanguinis motus per venam cavam acceleretur, & resistat adeo sanguini, qui per venam umbilicalem advenit, poterit sanguis venae umbilicalis per hepar (34) ire, quoties hepar minus, quam cava, resistit. Quo-

- (34) *Ductus iste venosus* ll. in maxima ratione minor est vena umbilicali, hanc enim reperio lumen habere 900. & alias 729. istum 156. & alias 121. Ad sinum vero portarum ratio erat 121. 400. ut recte quantae parti sinus aequallem faciat *Ridley obs. anat. pract.* p. 200. Ita etiam pingitur in iconibus *Heisteri Comp.* f. 12. & in *E. N. C.* l. c. *Trevv* p. 40. f. 22. 23. *Comm.* Nov. 1733. f. 2. &c. male vero potius majorem delineat *Fabricius* f. VI. aut aequallem *T.* 7. nimum etiam *Palfyn* post *tr. de monstr.* T. IV. f. 1. Exigua adeo pars sanguinis venae umbilicalis per eundem ductum naturaliter ad cavam fertur, maior autem per ipsum hepar necessario & perpetuo transit, atque ramis hepaticis cavae reforescit: *RIDLEY* l. c. *TREVV* p. 46. *CHESELDEN*. Adnoscit aliquam *CL. TREVVIUS* de *chylos.* fetus p. 44. & *LEMLERY* illius, sed non bene minorem vocat *Comm. Paris.* 1739. p. 155. neque mirum est, statum hepar subire per venam umbilicalem *Diemerbroeckio* observante p. 217. Recte adeo umbilicalem venam, magnam hepatis venam vocat *Galenus de form. fet.* & hepar facere addit, esseque radicem venarum, & jecoris parenchyma circa hanc venam ad-

nasci *Hervei* p. 62. Haec causa est tantae molis, quantum in hepate fetus videmus. Praeter sanguinem enim viscerum chylopoeticorum, sanguinis nique placentae longe maximam partem accipit. Hinc hepar fetus maximum *Galen.* de *util. part.* L. XV. c. 6. *Plater quaeft. physiol.* p. 154. *Diemerbr.* p. 227. *Cosmopol.* p. 105. *Salzman de differ. fet. nat.* p. 35. *Verbeey.* ll. p. 377. *Couper.* T. 62. *Aldes* l. c. p. 547. & ad umbilicum fere descendit, & infra umbilicum in fetu trimestri *Riol.* p. 411. aequae ab altera parte heni adhaeret *D. de Marchettis* p. 55. utrumque replet *hypochondrium Riolanus* p. 409. totumque pene in junioribus ventrem p. 411. Paulatim autem minuitur ad quintum annum usque *Couper* l. c. & in adulto margine costarum continetur. An ad augendam bilis copiam? Ita *Trevv* p. 59. sed bilis in fetus vesicula dulcis est, & iners. In aliis animalibus alia vena folio loco, alia cavae super iliacas inferiur *Trevv de chylos.* p. 14. Cum duae in homine essent, altera ad venam mesaraicam abiit *Kerkr. obs.* 37.

- (35) Praeter arterias venasque, ab utero materno ad placentam comes, aliquibus persuadetur, nervos etiam per funiculum venire ad fetum, cum

Quoties autem cavæ resistentia minor quam venæ portarum, & hepatis est, sanguis a vena umbilicali recta via eo venit. Si æquabilis, & cavæ & hepatis resistentia fuerit, tunc æqualis etiam portio per hepar, & æqualis alia per ductum venosum ad Cavæ truncum venit. Et hæc omnino causa fuisse videtur, quare natura sanguinem venæ umbilicalis maluerit in sinum venæ portarum, quam immediate in cavam ire. Utcunque fuerit, mediate, aut immediate, semper utique sanguis venæ umbilicalis redditur cavæ.

§. DCLXXX.

Sinum Venosum) Ubi hepar cavæ venæ nectitur, ibi continuo diaphragma cavæ adhaeret, eamque ad valvulae modum constringit. Quamprimum vero supra septum venit Cava, jam sinus est amplius [1], in quem sanguis venæ sine pari, venæ cavæ superioris & venæ cavæ inferioris effunditur.

Una parte] A superiori vena Cava sanguis omnis in dextrum sinum fertur. Per inferiorem autem adfertur, præter sanguinem ab universo fetu corpore reducem, sanguis venarum umbilicalium ea copia, quam arteriæ umbilicales ex aorta fetus ad placentam avexerant [2]. Nam pone, unico momento temporis omnia quiescere: cum in eo statu arteriæ quidem venæque plenæ sint (3) sanguine suo. Nunc ponetur incipere moveri & intra minutum horæ v. g. unam sanguinis unciam ex iliacis per arterias ad placentam abductam fuisse. Ita, si ve-

X 2

nac

tum inter vetustiores, tum *A. Pa-*
sculi III. p. 26. Ex nervis vero utri
succum nerveum in placentiam
deponi *V. Kartonnus* credebatur, &
HOBOKENUS repet. p. 485. &
per hanc observationem *Fun-*
is explicat similitudinem fetus
cum matre, & alia phaenomena
nov. Syst. vas. p. 68. Non ignoro,
nervos in funiculo vaccino de
monstratos fuisse *Clement de funic.*
unibil. p. 11. & ego vidi ex he-
par cum vena advenientes. Sed
li ad fetum pertinent, in interio-
ri vero facie uteri, quæ respon-
det placenta, nemo facile ner-
vum demonstraverit, quem vas-
culus exhalantibus minorem esse
oportet. Recte adeo ab utero ad
placentiam nervos advenire negat

GALENUS de Hipp. & Plat. de-
cr. L. VI. c. 6. & *MANNINGHAM*
p. 7. & plerique alii. Umbilicus
nullo sensu præditus est *SPIGE-*
LIVS p. 8.

(1) CXXXV.

(2) Et paulo plus, quam avexerunt um-
bilicales DCLXXXIX. Hæc ipsa
sanguinis portio inprimis ad fora-
men ovale venit *Verbeijen. Litt.*
anat. p. 49. *Groefse de circ. sang.*
in sit. p. 16. *Chefelden* apud *Dar-*
bam L. IV. c. 7. superioris enim
cavæ sanguinem tumens isthmus
averit, & ad aurem dextram de-
rivat.

[1] Aliquando funiculus ita distensus
reperitur, ut etiam ligatura facta
hemorrhagiæ periculum vix ave-
ratur *MANNINGHAM* p. 7.

nae umbilicales unciam etiam sanguinis ad fetus cavam venam revere-
runt, fetus utique sanguine aequabiliter plenus manebit, & corpus fe-
tus idem; si vero majorem copiam advexerint, plethora in fetu fe-
fectur, cito lethalis futura. Si minor copia fuerit sanguinis ad fetum
redeuntis, syncopæ succedet ex defectu sanguinis. Superest, ut vena
cava in statu secundum naturam tantundem adferat, quantum aorta,
& ad corpus fetus, & ad placentam avexerat. Nunc cor in fetu quidem
agit [4], pulmo vero quiescit (5). Ergo cor dextrum expellit sangui-
nem, tunc sinus dexter, & auris, sanguine plena, sanguinem suum qua
data porta, expellunt. Verum sinus venosi dextri lateri adsidet & adhae-
ret sinus venae pulmonalis, & membrana, quae utrumque sinum sepa-
rat, ita resecta est, ut foramen ovale [6] inter utrumque sinum medium
relin-

- (4) Veteres credebant, cor in fetu quie-
scere. Recte HARVEIUS, utique
agere pag. 63. Demonstrat enim
punctum saliens, & experimen-
tum in fetibus brutorum ex ma-
tre excisis &c. in aquis natantibus
NYMMAN *de fet.* p. 31. pulmo-
nibus eo tempore non motis RIO-
LAN *resp. ad exp. nov. anat.* p. 195.
& *de fetu* p. 391. ubi etiam DEL-
LONII in camelo experimentum
citatur, tum FABER HERNAND.
p. 609. Et in ovis anguino serpen-
ti vivo cor pulsavit A. HAFN. II.
obs. 10. Ipse denique ARISTOTE-
LES ex pullo didicit, cor in ipsis
initius constituti animalis pulsare
de spiritu c. 4. Imo plus quam in
adulto agit, habet enim appen-
dem circulationis, placentam, &
tamen multo celerius, quam in
adultis, partes solidas dilatat, ut
velociora faciat incrementa.

- [5] DCLXXXI. not. 1.
[6] In pariete intergerino posterioris &
dextri finis dextri sinus sinisque
sinistri dextro pariter &c. anteriori
finis, vestigium leniter cavum est,
omnino ovale. Hujus margo plus
quam dimidius, superior, eminen-
te tumore carnen cingitur, quem
pro tuberculo habuisse videtur Lo-
wverus (*Chefeld.* T. XXX.V.)
Vieussensus *ostium dicitur du coeur*
et de l'oreille p. 17. T. IV. f. 1.

Meryus sphincterem de circulo p. 37.
39. f. 4. D. habet etiam Trevv f. 8.
K. f. 10. a &c. Fibrae earneae
sunt, in columnas perpendicu-
lares, dextram & sinistram colle-
ctae Roubault *off.* p. 66. *reponse*
p. 8. testae membrana sinus dex-
tri. Infima pars vestigii ovalis
fevis est, & absque eminente lim-
bo, eademque cum sinus sine in-
feriori continuatur pari convexo
sibi arcu. Ex ea ima parte adien-
dit adhaerens ibi Gal. I. c. mem-
brana tenera, duplex tamen,
Roubault *off.* p. 67. *reponse* p. 9.
ut etiam fibrae earneae mediae inter
duas membranas ambulent,
Mery de la circulo p. 22. *Roub.*
reponse p. 9. *observ.* I. c. *dissect.*
p. 24. quas credit posse constri-
gere valvulam p. 25. & *reponse*
p. 141. 74. consentiente Duver-
ney 1725. p. 38. dupliet ordine dis-
positae Duverney 1725. p. 15. Haec
membrana in fetu pellucet, Car-
cano observante, ac valvularum
similis est, & dissimilima fabri-
cae sinuum, longa satis, ut fora-
men elaudat Tanvry *reflex.* p. 16.
Harvei, I. c. Duverney 1725. p. 33.
36. ne Carcano quidem diffidente
apud Trevvium p. 10. &c. confir-
mante Trevvio p. 71. ovalis, sed
emarginata Mery *ic.* III. IV. VI. VII.
PALFYN I. c. & totum vestigium
ovale

relinquat. In eo foramine pendet membrana versus pulmones mobilis, fixa versus cavam. Si nunc in sinistro sinu minor pressio fuerit, quam in dextro, tunc cava vena, sanguine plena, tantum sanguinis dabit venae pulmonali, donec resiliencia in vena pulmonali aequae magna sit, quam

ovale in adulto occupat TREVV f. 21. 40. 41. tum in fetu si obducta fuerit TREVV f. 60. Ubique ponitur, in ima parte anterior, in suprema posterior TREVV f. 10. Ea pars suprema, isthmo posterior, in lumina concavo arcus isthmi adhaeret. Hacc est valvula GALENO dicta *de usult.* l. XV. c. VI. VIDO p. 188. ARANTIO *obs.* 33. & *de fetu* p. 38. HARVEIO *de corde* p. 60. FOLIO f. 1. C. VVALAE *epist.* v. p. 129 RIOLANO contra PECQUETUM p. 192. & reliquis. Non bene semicircularem fecit SALZMAN *obs.* p. 13. & satis recte pinxit FABRICIUS f. 14. Retractam TREVVIVUS delineat f. 11. 12. 13. 14. integram vero f. 10. 20. & (optime), PALFYNIUS etiam iconem dedit post *monstr.* T. IV. f. 2. In fetu ergo foramen verum reperitur; inter isthmi cavum arcum, summamque partem membranae liberae, ovale, GALENO cognitum, & a BOTALLO non bene depictum f. 2. a, & a FABRICIO f. 14. 24. iusto amplius factum, non male a *Laurentio* sculptum l. c. f. 8. tum a SPIGELIO *de form. fet.* c. 12. MERYO ic. 3. 4. 6. 7. sed ubique nimis magnum, & a TREVVIVUS, sed siccandam auctum. f. 13. 14. naturale vero f. 20. In superiori a leoparte pendula membrana fluitat GALENUS l. c. RIOLANUS contra PECQUETUM p. 162. Hoc foramen in universum retundum est, & minuitur, quando liquor a sinistra sede premit, vel extenditur sinus ROUHAULT *response* p. 83. augetur, quando a dextra vis urget, aut sibi relinquitur ROUHAULT ib.

Quantum video, diameter eius transversa major $\frac{11}{100}$ pollicis est,

perpendicularis vero $\frac{11}{100}$ in fetu adulto. ROUHAULT. utramque diametrum duarum linearum facit *response* p. 103. Valvulae vero ovalis totius diametri reperio 36. 20. ut non omnino tertiam partem totius vestigii ovalis foramen occupet. Cum enim ellipsis sit aequalis circulo, cujus diametrum media proportionalis est inter axes, erunt lumina, in circulum mutata, foraminis & vestigii ovalis 1: 1729. 196, quam proxime. An vero in primis initiis fetus multo majus & tertiae parti trunci aortae aequale sit, ut LEMERYUS 4739. p. 147. aut totius, quod enorme, aortae, ut MERY *de la circul.* p. 15. 121. SALZMAN *de fet. circul.* n. IX. in maturo vero fetu minatur, quod etiam ROUHAULT observavit p. 72. & *response* p. 18. & MERY *de la circul.* p. 14. & CYPRIANUS apud SYLVESTRE p. 80. ex meis non possum definire. In maturo certe fetu est ad aortam diameter major 1: 15. 39.

Porro valvulae ovalis zonam musculosam infra meatum positam, dictam LANCISIO *de corde* p. 76. nunquam vidi, neque unquam ab inferiori parte apertum foramen, aut superius clausum vidi, ut RIDLEY p. 181. 183. f. 12. Neque possum cum ullis meis observationibus eas conciliare, per quas persuasus, docet, foramen illud primo in parte inferiori fuisse, inde sensim adicendere. Vide TREVVIVUM. in omnibus figuris.

in dextra aure, neque quidquam ultra eam quantitatem dabit, adeoque eam portionem, qua copia sanguinis sinus venosi dextri, sanguinis sinus sinistri copiam superavit. Cum enim utraque vena aequae magnae sit (*), utique inter utramque aequilibrium erit, quando eandem copiam sanguinis receperunt. Quod reliquum est de toto sanguine venae cavae, id in aurem, & cor dextrum fluit [7]. Nunc dicendum est, quare minus

(6*) Conf. not. 8.

[7] Haec his nostris temporibus ex celeberrimis est, Nempe *Galenus* equidem vias peculiares fetus probe cognovit, iuchus *Bosallo*, a quo *Gallii* foramen ovale nominavit, cujus admodum obscura descriptio est opp. p. 66. seqq. *Galeni* adeo & inter antiquiores posteriorum plerorumque de foramine ovali sententia a nostra non diverfa fuit, cum perinde sanguinem a dextro sinu in sinistram ire sentierint. In ductu arterioso disserunt, quem sanguinem ferre ajunt ab aorta in pulmones *Fallopini* in *obs. Carcanus* apud C. B. p. 237. *Carolus* pag. 108. *A. Laurentius* L. VIII. *Quaest.* 23. *H. Fabricius* P. II. c. 8. *Riolanus de fetu* & notat. de mot. cord. p. 91. *Rup. Besler obs. anat.* p. 19. & reliqui. *Harveius*, ut universam circulationem sanguinis in ordinem redegit, ita in fetu demonstravit, eam, quam *Præceptor* sequitur, legem de *circul. sangu.* *Exerc.* I. p. 60. seqq. Recentiores omnes HARVEIUM secuti sunt *Pecquet* c. IV. *HIGHMOR* p. 156. *Drelincourt Perioche* 40. seqq. *Lowervus* & quidquid fuit recentiorum. Donec *Meryus* circa ann. 1691. consideravit arteriae pulmonalis magnitudinem, qua omnino aortam superat in fetu, apud du HAMMEL p. 156. & *anciens mem. de l'Acad.* Vol. X. p. 60. (cum in adulto arteria pulmonalis potius minor sit *Ridley* p. 194.) & *phoca*, qui fetus vitam vivit *Schebhamer* in *phocae anatome* apud

Valentinum II. p. 91. Comparavit etiam cor testudinis, & ex utroque argumento novam thesiam deduxit. Vanam agebat esse HARVEII opinionem, nam ex ea sequi, ut origo arteriae pulmonalis una tertia minor esse debeat origine arteriae aortae, cum una tertia parte minus sanguinis habeat, nempe ea parte, quae per foramen ovale in sinistram sinum, insalutato pulmone transitit *Com.* 1699. p. 32. Atqui arteria pulmonalem etiam altero tanto majorem esse quam aorta 1699. p. 32. de la *circul.* p. 9. 49. Hinc argumento ferre solo nititur, addit tamen directionem venarum pulmonalium directe respondere valvulae ovali de la *circul.* p. 31. 40. 123. & passim etiam sinistram sinum tertia parte, ventriculorum dimidia parte minores esse dextro sinu & ventriculo 1703. p. 505. & de la *circul.* p. 10. 113. 138. 141. *Mem. de l'Acad.* 1703. pag. 495. & venas pulmonales simul summas minores esse duabus cavis de la *circ.* p. 167. manifestello argumento, sinistram aurem minus sanguinis accipere, contra HARVEIUM. Ergo in *anciens mem. de l'Acad.* T. X. p. 65. seqq. additavit, contrario modo potius sanguinem transire ex sinistram sinu in dextrum. Valvulam autem unice factam esse, ut paries praesto sit, quo possit in adulto foramen obduci, quod video etiam *Vesalius* in *exam. obs. Fall.* & C. *Hofmannum* dixisse de *thor.* p. 57. & repetit *Vinslov* 17. 7. p. 290. In arteria pulmonali novamuta-

nus sanguinis sit in vena pulmonali, quam in cava. Lumen equidem in utra-

mutabat *Herveyi* sententiam apud *du Hamel* p. 353. *Comm.* 1699. p. 28. seqq. &c. *Academici* apud *du Hamel* l. c. &c. 1699. p. 33. &c. apud *D. Sylvestre* p. 2. &c. *Littrius* maxime *bist.* 1701. in *Meryi* opinionem haud obscure animum inclinabant. Addit rationibus *Meryi* *Littrius*, in adulto, cui foramen ovale apertum fuerat, cor dextrum auremque dextram maiorem fuisse 1699. p. 47. (sed id in omni corpore, clausissimo foramine ovali, verum est), tubulum denique a parte vcnæ pulmonali latiore fuisse, quod contra *Morgagni* observationes est. Sed contra *Meryum* steterunt *Duverney*, & *Tanvry* in propriis thesibus & in toto libello *de la generation*. Inter exteros vix ququam *Meryum* secutus est, & contra eum dixerunt *Verbeymus* in propria epistola & in fine l. II. *anatomies* & *Sylvestre*, & *Buffaire*, uterque in *Progres de la Medicine* editi Paris. 1698. & *Hartsoecker* in *sute dei conj. phys.* pag. 122. & *Salzman de circulo sang. in fetu* n. 21. & *Morgagnus* in l. & v. *Adv.* & *Cbeselden* in nupera anat. edit. p. 85. seqq. & *Niebolts comp. anat.* p. 48. & III. *Trevvius de differ. voi. nat. & non nat.* p. 57. seqq. & *Lemery* in *Comm. Paris.* 1739. Unicus discipulus *MERYI ROUHAULT*, pro nova sententia novas protulit rationes in *discours sur la circ.* &c. *Torini* edito, & in *observ. V.* & in responsione ad eriticam *VVINSLOVI* recensione *Turini* an. 1728. edita. Nempe pro fundamentis ponit dimensiones dextri cordis minores, easdem, quas *MERYUS*, ventriculum nempe duplo, suum triplo maiorem *reponse* p. 4. 9. Deinde novo modo adfirmant, aures & sinus penitus

repleri in cordis systole, tunc enim sanguinem, qui sub oram ostiorum venosorum descendit, ab expansionis valvulis venosis in saccos aurium trudi, eosque penitus replere *dist.* p. 8. *reponse* p. 34. 83. 138. 143. denique ventriculum sinistram triplo maiorem esse *rep.* p. 10. & saccum ipsum robustiorem dextro *observ.* p. 65. 84. *dist.* p. 30. *reponse* p. 7. Ergo contractum cor utrumque sanguinem in sinus suos projicere *reponse* p. 11. extendere autem utramque, in sinu vero, dum extenditur, foramen ovale aperiri *reponse* p. 39. quod mechanice demonstratur, uti vicissim in contracto sinu clauditur *reponse* p. 23. *observ.* p. 89. Vincere vero sanguinem sinistri lateris, tum ob robur sinus minus extensilis, tum ob ventriculi firmitatem triplo maiorem *dist.* p. 30. *observ.* p. 68. 83. &c. *reponse* p. 35. 144. adeoque sanguinem a sinu sinistro in dextrum fluere. Et hanc ipsam rationem fuisse, quare natura foramen ovale fecerit, ne rumperetur nempe sinus sinister, sed sanguis exiens ex corde validiori effugium haberet: neque adeo compendium quaesivisse circulationis *reponse* p. 22. &c. In ductu vero arterioso duorum ventriculorum robur uniri (HARVEIO praeunte *de corda* p. 65.) ad propellendum aortae sanguinem, quod eum extra corpus propellere oporteat *observat.* p. 73. &c. Denique *VVINSLO.* *VVUS* in *Comm.* 1717. pag. 88. seqq. & 1725. p. 41. seqq. & obsequens *VVINSLOVVO D. NICOLAII de dir. vis.* p. 54. 55., omnino aurem in fetu unicam habendam esse, & sanguinem promiscue a sinistro sinu ad dextrum, a dextro ad sinistram tamquam in commune receptaculum confluere docuit.

utraque vena aequale est (8) : sed ratio diversitatis in pulmone est , per quem eo tempore non transit quidquam sanguinis , nisi pro portione magnitudinis hujus visceris , decima nempe pars massae sanguineae , si pulmo decimae parti totius corporis aequalis fuerit ; nunc , si pulmo (9) decimam tantum partem sanguinis admittit , decimam ergo tantum accipit sinus venae pulmonalis : decuplo ergo minus sanguinis est in eo sinu , quam in dextro . Ergo in sinistrum sinum irruet sanguis venae caevae , ex vi majoris impetus , donec aequilibrium nascatur : & vicissim , si fieri posset , quod fieri nequit , ut major in sinistro sinu sanguinis copia [10] foret , quam in dextro , tunc certe ex sinistro in dextrum sinum sanguis fluere , donec fieret inter utrumque sinum aequilibrium . Ergo iter naturale sanguinis est , ex toto fetu , per venam eavam , partim in cor dextrum , partim per foramen ovale in sinum pulmonalem . Haec sola certe consideratio MERYUM (11) convincere potuisset , nisi praecudata

(8) MERYUS & ROUHAULT & ipse VVINSLOVV. dissentiant , qui omnes sinistrum & sinum & ventriculum minorem faciunt . Merito , nam deest sinistro cordi sanguis ductus arteriosi , nempe plus , quam dimidia pars sanguinis , quam dexter ventriculus recipit .

(9) Conf. DCLXXXI. not. 4.

(10) Sed non recipiebat MERYUS , persusius sanguinem neque in pulmone fetus retardari *de la circul.* p. 136. neque ullibi in corpore ibid. p. 126. neque denum sanguinis per vas aliquod fluentis copiam , aut a robore vasis , aut a resistentiis , sed unice a diametro pendere p. 164.

(11) Primumque moneo , de exigua parte sanguinis unice quaeri , DCLXXXI. not. 4. quam multo majoris momenti omnes anatomici fecerunt . Deinde ex descriptione recipio „ valvulam satis magnam esse , quae possit obduci foramini ovali toti , & iter ab uno ad alterum sinum integre intercipere , toto enim foramine major est , *Hervei* p. 60. *Lancet de corde* p. 67. Nunc haec valvula inter duo fluentia sanguinis media ponitur . Quaeritur , cui fluente cedere debeat ? Hic

pro *Hervei* grave argumentum est , quod prociit *Præceptor* , & olim *Taurey* *objectiones & respons.* p. 70. & *Sylvester* in *epistola anat.* Sint duo tubi , medio communicantes canale , aut foramine , procul dubio per foramen irrumperet ejus tubi liquor , in quo fluendum fuit majori impetu . Sed impossibile est in fetu fluentum esse , aut velocitate majori , aut massa quam in cava , quae omnem sanguinem habet . Nam etiam ex *Meryi* confessione plus sanguinis in dextro sinu est , per admissam minorem capacitatem sinus . Deinde neque major velocitas sinistri sanguinis est . Nam fetus pulmo non respirat , nihilque adeo differt a viscere quolibet , & in omnibus extremis vasis corporis humani sanguis retardatur per frictiones , CCXV. eandem ergo in pulmonis minimis vasis tarditatem adquiret , quam in hepatis vasis , aut capitis , aut corporis reliqui . Nam liquor injectus per pulmonem non inflatur aut aeque difficulter , aut difficilior ab arteria in venam transit , quam in capite , hepate , liene , rene , aut alia quacunque parte . Conf. *Taurey* *problem.*

cata mente DUVERNEYUM adpexisset, & dubiis ACADEMIAE PARISI-
NAE finem inponere, quando inter DUVERNEYUM, & chirurgum ME-
RYUM haesitabat.

Porta membranacea) Ea situ suo, & falcatis cornubus, & fibris ad-
positis demonstrat, facilius ipsam a sinu dextro & sinistro sanguinem
dimittere, quam a sinistro in dextrum. Sed eadem sequuntur, etiam,
quando adiaaphora ponitur.

§. DCLXXXI.

Sed ex paritate rationis, pulmo de sanguine cordis dexteri recipit
tantum eandem decimam massae rotius, quae magnitudini pulmonis
respondet, reliquum omne, quod accepit ex corde dextro arteria pul-
mona-

*problem. anat. p. 34. & CCLX.
CCLXI.* Verum sufficit nobis cer-
te sanguinem in pulmone non ac-
celerari, neque celerius sedire,
quam cauae sanguis. Nam in si-
nu dextro accessoria celeritas est,
cum qua sanguis ex materno ute-
ro ad placentam adveoit, tum
ea, quam in placenta acquirit,
pressa a diaphragmate materno.
Ergo & massa, & velocitas, in
sanguine sinus dexteri majores sunt.
Addit Lemeryus, haec omnia in
tenaciore seu etiam majora esse,
cum enim ibi maior sit placenta,
etiam quantitatem sanguinis ma-
jorem esse, quae inde ad fetum
redeat p. 136. & fatetur Meryus
& Roubaux, etiam majorem esse
sinu dexteri ad sinistram rationem,
quando seius tenacior est.

2. Porro cum VVINSLOVVS 1725.
p. 44. & perfracte Meryus neget
valvulam ullam adesse in forami-
ne ovali, animadverto, supremam
oram ejus retro tumeantem isth-
mum recondi not. 4. Salzman de
fet. circ. n. IX. totam denique
valvulam, & magis posteriorem
esse Salzman l. c. Sylvestro p. 44.
Tauvry p. 884. & a parte pulmo-
nalis sius latiorum Trevv. p. 72.
Porro adeo fluente a parte dex-

tra, sanguis cunei modo inter
isthmum valvulaeque se insinua-
bit, ut aequae sinistram, quam de-
xtrum ventriculorum subeat Verbe-
yen *lettres anat. p. 32.* Si a sinistro
vero sinu sanguis advenerit, ad-
primet valvulam tumeenti isthmo,
viamque occludet. Id etiam Ga-
leno de util. part. L. XV. c. 6.
& Vidio p. 288. & Harveio no-
tum fuit de corde p. 61. & in vi-
tulo Fabio p. 605. & vidit Mor-
gagnus adv. l. p. 23. nu. 20. &
Verginon apud du Hamel p. 356.
& Verbeijen *lettres anat. p. 28.* &
Salzman de circ. sang. in fet. n. 33.
& nuper Morbini diss. l. p. 14.
& Cl. Hebenstreit in progr. ad
anat. mul. Deinde naturaliter et-
iam, aperto sinu dextro & libere
sustentato, valvulam velius sinum
sinistram depressam reperio. Id
vidit D. Buffiero, [*lett. anat.*
p. 62.] ut etiam statum nonnun-
quam retineat valvula Lieutaut
p. 375. TAUVRV p. 190 DU-
VERNOY 1725. p. 36. CROE-
SER de transf. per for. ov. Deoi-
que in dilatato sinu valvulam aper-
turam tegere VVINSLOVVS
fatetur 1725. p. 381. & ROU-
HAULT p. 39. 40. *responsions.*
Non ideo foramen ovale nullum
omnino.

Tom. IV. Pars II.

Y

omnino aerem a sinistro latere ad dextrum transmissit, uti neque aliae valvulae omnino iter elaudunt: & in eo verus est MERYUS apud du HAMEL p. 355. & Academiæ apud MERYUM *de la circul.* p. 15. & DUVERNEY lib. p. 24. & MERY denuo p. 54. & 1703. p. 493. & VERHEYEN l.c. & VVINSLOVV 1717. p. 286. Male tamen negat MERYUS, anembranam eam omnino operire posse foramen ovale, ib. p. 21. quod adeo facile visu est, compresso tantum sinistro, aut demisso, faciente ROUHAULTIO, dextro sinu, neque detracto ut aperiantur. Exsiccationem etiam MERYANAM foramen amplius fecisse & VVINSLOVVUS fateatur 1725. p. 385. 380. & ROUHAULT *response* p. 76. inconstanter idem, nam p. 67. foramen per siccitatem etiam minus reddi dixerat. Porro in adulto fossa foraminis ovalis nunquam non depressa est ab ea parte, qua cor dextrum respicit, manifesto argumento, ab ea sede impulsum sanguinis praevalere VERHEYEN L. II. p. 375. Idemque in fetibus vitulinis vidit, foramen ovale diutius a parte dextra apertum manere L. II. p. 375. *Trevvius* vero p. 28. f. 41. in homine, tuncque insigniter latius ad venam Cavam, angustius ad pulmonalem esse VERH. *lettre anat.* p. 16. Idque in vitulis adultioribus adhuc conspicui posse p. 25. Sed & MORGAGN. tubulos, a foramine ovali superflites DCXCI. ita obliquos esse vidit, ut a cava, ubi latiores sunt, ad venam pulmonalem, ubi angustiores, manifestio ducant *Advers. anat.* V. p. 24. f. 4. & TREVV p. 73. eandemque MORGAGN. fabricam vidit: Cf. VVEITBRECHT *ass. petr.* IV. p. 264. Sed & chordulas reperiri aliquando addit Morgagn. l. c. & *Epist.* XV.

n. 46. quae ad anteriorem partem venae pulmonalis valvulam relinquit, etiam TAUVRYO dictae p. 194. & RIDLEYO p. 181. Veram denique valvulam esse, de qua negat MERYUS, & perinde uti aliae valvulae aliquando in fibras dissolutam Morgagnus monet ibidem. Neque non verum est EUSTACHII valvulam ita se interponere auri dextrae, venaeque cavae inferiori, ut sanguinis ex vena Cava fluctum magis contra foramen ovale determineatur.

Tertio loco argumentum a pulmonibus petendum est, pariter, puto, demonstrationi simile DCXC. not. 1. Ergo per eos pulmones adeo resistentes, sanguis omnis debet transire, ex MERYI systemate, qui per venam cavam reddit in cor, nam, ex ejus theoria, foraminis ovalis sanguis compensat eum, qui per ductum arteriosum abiit. Verum per experimeta CC. not. 11. & DCXVIII. in homine sanguinis ea copia transire non potest, nisi respiret, & necesse est retineri in pulmone, & congeri, & vasa rumpere.

Inde nunc non solum sequitur, nullum tempus in fetu esse posse, in quo tantum sanguinis in vena pulmonali sit, quantum in cava est, adeoque illam vinci & morsa, & celeritate; sed praeterea imprimis apparet, HARVELL systema respondere necessitati naturae, nempe liberare inferiem & resistentem pulmonem copia sanguinis nimia, & noxia tutora: MERYANAM vero hypothefin inutiliter pulmonem onerare, cum praeter cavae sanguinem, adhuc sanguinis sinus sinistri partem demum accipiat per foramen ovale, quem petuisset utique aorta avere, nullam denique veram rationem dare, quare a sinistris ad dexteram sanguis revehatur. Vide idem obicientem VERHEYEN. *lettre anat.* p. 34. & LEMER. l. c.

l. c. p. 43. inutilem nempe & ab-
lique scopo esse MERYANAM cir-
culationem, neque video, quo-
modo MERYUS SYLVESTRIO
respondeat, qui objicit *novu. let-
tre anat.* p. 6. in adulto necessi-
tatem foraminis ovalis ex MERYI
systemate etiam augeri. Sed etiam
casus nobis faver. Vidit VIEUS-
SENIUS *du coeur* p. 35. fetum,
cui nullum foramen ovale erat:
ei ventriculus dexter maximus,
& arteria & vasa demum pul-
monis amplissima fuerunt. Vidit
LIEUTAUD in fetu maturo nul-
lam valvulam foraminis ovalis
adfulse, hinc obstrutum ventricu-
lum dextrum, & mortem secu-
tam p. 375. manifesto argumen-
to, in illo quidem casu sinum
dextrum, cum per foramen ova-
le se sanguinis portione nulla li-
beraret, cum corde & pulmonibus
obstrutum fuisse MERYANUM,
in quo manifestae fuerint orae
falsi systematis, & sanguinis a si-
nistro sinu in dextrum irruentis.

Nunc superest ut respondeam
objectionibus. Princeps illa ME-
RYANA est, arteriam pulmona-
lem aorta in fetu majorem esse.
Ita non MERYUS solus, & RO-
UHAULT reperit: sed *Morga-
gnus etiam adv. l. n. 10.* & RID-
LEY *obj. anat. pract.* p. 189. &
TREVV *l. c. l. 3. 4. 69.* Duplam
tamen aortae esse, ut MERY
apud du HAMEL p. 156. & 1699.
p. 31. & VERHEYEN *l. p. 380.*
non reperio, uti neque minorem
unquam vidi, quod testatur se vi-
dide BUSSIÈRE *lett. anat.* p. 67.
& in vitulis demonstrasse se co-
ram Academicis adfirmat TAU-
VRYUS *obj. & repons.* p. 71.
reflexions sur les faits &c. p. 16.
& *acad. des Sc.* 1699. p. 33. non
suis repugnante *Meryo de la cir-
cul.* p. 139. & ex homine exci-
tat *Taavry ib.* p. 4. aut aequalem
denique utramque arteriam *ib.*
p. 17. Invenio ergo rationes dia-

metrorum fere 15. 13. & 11. 10.
Lumen autem aortae contra Me-
ryum p. 120. & ROUHAULT
omnino junctis duobus ramis ar-
teriae pulmonalis majus est, nem-
pe 1: 1600. 1341. Hoc phenome-
non varie explicaverunt varii:
TAUVRYUS densiori & resistenti
pulmoni tribuebat 1699. p. 33.
obj. & repons. p. 77. & RID-
LEY p. 192. SYLVESTER vero
p. 80. & VEREYEN *lettre p. 4.*
& *l. l. p. 419.* & BUSSIÈRE
lettre anat. p. 65. majori celeri-
tati sanguinis per aortam fluen-
tis, & compenlantis minorem di-
ameterum hujus arteriae. DIONIS
dextro ostio cordis majori tribuit
p. 475. LEMERYUS pulmonis
compressioni pariter rem acceptam
refert, sed quam septum faceret
sursum pulsus & thymus incen-
dens 1739. Ego vero valde miror
neminem vidisse, quam facilis
solutio sit. Foramen ovale equi-
dem demit aliquid de sanguine
cordis dextri, ut minuatur arte-
riae pulmonalis diameter. Sed fo-
ramen ovale insigniter & enor-
miter minus est ductu arterioso
DCLXXXI. 4. Hujus autem du-
ctus sanguinem recipit arteria pul-
monalis, non recipit aorta. Non
mirum adeo pene dimidio majus
tem esse pulmonalem.

Altera obiectio MERYI a sinu
& ventriculo sinistro majori, a
CHELSDENIO recte soluta est
l. c. p. 284. Multo plus enim au-
fert de sanguine sinistri cordis ar-
teriosus ductus, quam addit ille,
quem foramen ovale transmittit.

Tertia a testudine ducta, nihil
ad nos facit. Huic enim animall
fabrica a nostra alienissima est
Bushera Phil. trans abr. V. p. 356.

ROUHAULTI hypothesis enor-
mes subponit positiones, v. g. au-
ticulas semper plenas esse, quod
manifesto repugnat experimentis
dictis ad CLIX. 8. & a venis re-
pleri, quando costringuntur ipsae

Y 2

repon-

reponit p. 138. & minus accipere a maximis venis, quam a tantilla illa copia, quae potest inter ambitum valvularum venosarum & earum tendineas fibras recipi, neque, dum expanditur valvula, inter eos tendines dilabi. Id iam VVINSLOVVIUS objicit 1715 p. 357.

Ierum neque id certum est, ventriculorum sinistrum fetui adeo aut crassiusculum esse aut maiorem. Ego contrario modo habere reperi, & SPIGELIUS, de form. fet. c. 12. & RIOLANUS p. 409. & HARVEIUS (in fetu quadrimestri) p. 185. & MERYUS ipse de la circul. p. 106. & Tautvy reflex. p. 5. ut etiam post aliquot menses diversitatem non maximam reperiunt. Neque hic quidquam in fetu est, quod non perinde habeat adultus moenente VERHEYENIO p. 414. contra Meryi opinionem, qui in adulto ventriculos & aures aequales esse credebat de circ. p. 13. 110. cuius adeo sanguis, ex corde sinistro pulsus, perinde ex Meryi opinione diverticulo egeret.

- (1) Pulmo fetus, quam in adulto, multo minor est, DCXC. not. 6. Deinde, cum aerem nullum recipiat, compacta carne est, ruberque GALEN. de util. part. L. XV. c. 6. THRUSTON de respir. p. 85. Ridley p. 203. & hepatis similibus RIOL. p. 409. aut solidior p. 411. & specifice gravior aqua, ne MAZINO quidem repugnante, cuius se erat pulmoni specificum pondus diminueret. Idem tamen facitur, perpetuo majus esse, majeri ratione in teneriori fetu [1: 450. 434.] sed etiam in maturioris matris 3002. 2927. (diff. VI. p. 67. &c.)

Ergo ab omni tempore notum

fuit, pulmonem in homine, qui respiravit, marare, in fetu fundum petere SPIGEL. de form. fet. p. 10. THRUSTON. ALDES p. 547. DRELLINCOURT peric. 55. MURALT. l. c. pag. 417. E. N. C. Dec. I. ann. 6. 7. obs. 202. RUYSCHE Cat. mus. p. 171. Ridley l. c. p. 180. MOEBIUS diff. l. c. BOHN. de infantic. p. 179. & in canibus BERGER p. 481. E. N. C. Dec. III. ann. 5. 6. obs. 256. Et caesareo partu editi castruli, concisum strangulati, pulmones habent fundum petentes BOHN. de offic. p. 668. Non ignoro ZELLERUM, cuius opusculo careo, & CAMERARIUM de usu anti. pneum. p. 21. 22. & scepticum aliquot BOHNIIUM, & HLL. HEISTERUM, nolle ita admittere talem experimenti perpetuitatem, ut legali responsioni sufficiat. Adducunt ergo exempla fetuum maturorum, sed qui nunquam respiraverint, quibus innataverit pulmo DIEMERBROECK p. 307. maxime si putredo accesserit BUESL. 1722. M. O. HEISTER de fallac. pulm. exper. pag. 21. E. N. C. Vol. 1. obs. 182. ERNDL. It. p. 90. ALBERTI de pulm. subident. p. 12. quod non reculo, cum videam integros minutos fetus putredine accedente marare. Addunt, aliorum fetuum, qui vivi editi, & aliquamdiu superfuites fuerunt, languidi tamen, pulmones habuisse qui subiderent SCHUCHMAN E. N. C. Dec. III. ann. 1. obs. 104. HEISTER l. c. pag. 15. BOHN p. 181. & de offic. med. p. 664. MAUCHART E. N. C. Cent. I. obs. 121. & in fetu in cloacam continuo a partu lapsu VALENTINUS, & ZELLER ibid. In adultis porro aliquando pulmones sepius fuisse, qui fundum petierint,

est, hepatis similis, & continuo fundum petit, in aquam projectus. Sed neque in cor potest redire sanguis, quem arteria pulmonalis accipit, intercedunt valvulae arteriae pulmonalis. Nunc in fetu arteria pulmonalis, ubi aortae accumbit, habet canalem (2) intermedium, qui utram-

tierint, vel post peripneumoniam & intarctum sanguinis BRESLAV. 1722. *M. ed.* p. 465. ALBERTI p. 25. vel a scirrhis VALENTIN. in PANDECT. MED. LEG. AUL. MUST. XXVII. A. SUEVIC. 1721. p. 124. HEISTER l. c. n. 8. Et in eodem denique pulmone aliam particulam innatam, aliam fundum petuisse E. N. C. *Cont.* VI. *obs.* 90. *Selest. Francof.* II. p. 171. Verum contraria experientia reperio: & quidem in fetu pulmones etiam post summam putredinem, tamen fundum petisse apud von HORNE A. *Suec.* l. c. & in *epist. propr.* III. TEICHMEYERUM *de modo leg.* p. 238. seqq. COMM. NOR. 1736. *bibb.* 1. in idem BOHNIG teste p. 175 & VATERO *de signis infant. viv. & mort.* p. 20. Adultorum vero etiam scirrholos pulmones innatasse MOEB. *obs.* 5. & perpetuo innatare, si vel semel & paululum aeris infans duxerit SVVAMMERDAM *de respit. Thes.* 12. BOHN l. c. p. 174. *de offe.* p. 663. CHESOLDEN. p. 176. *Cont. DCVII.* not. 7. ZELLERI experientia video L. SCHROECKIO non penitus placuisse, in morbis scirrhi vitulis E. N. C. *Dec.* III. *ann.* I. *obs.* 104. Verum sufficit ad finem meum adversarios consentus, qui fetui mortui nati pulmones tunc demum natare concedunt, quando ruptis membranis in vagina aerem hausit HEISTER *de medic. util. in Jurisprud.* p. 24 & *diff.* c. p. 23. ERNDL l. c. ALBERTI *diff.* c. p. 18. Tale exemplar exstat apud Cl. *Bolten hamb. bibl.* p. 718. Pulmonem au-

tem fetui ponderosorem esse, & compactiorem, & minorem, nemo negat.

- (2) *Ductus arteriosus* pariter notus GALENO l. c. *Arantio de fet.* p. 39. BOTALLO f. 2. *Fabricio l. c.* I. c. 10. f. 15. A. *Laurentio* p. 205. f. 1. 2. *Carcano*, tener totus, & similior arteriae pulmonalis (venae comparat *Roubault reponse* p. 13. 64. & *Duverney* ib.) continuus est in fetu truncus arteriae pulmonalis *Cbeselden T.* 38. *Trevv.* f. 57. *Glaft. de circul.* *Ridley f.* 5. *Mery de circ.* ic. 1. 2. qui tamen ductum nimis rectum plangunt. Haec nempe arteria sursum, retrorsum, sinistrolum inclinata, deinde parum mutata directione, magis tamen sursum, minus retrorsum, denique pene perfecte retrorsum ad angulum & in fetu & in adulto sursum acutum, ita in aortam se immittit (*Trevv.* f. 23. f. 24. b. flexionem vero habet f. 57. tum *Verheyen L.* II. T. 6. f. 5. & *Agricola l. c.*) ut perinde a Pulmonali, uti ab Aorta continua via sit in truncum descendens aortae, ab aorta vero arteria nulla via in arteriam pulmonalem superstit, nisi causa ponatur, quae sanguinem impediat, ne libeat truncum descendentem, & cogat, ut in pulmonalem arteriam regurgitet. Rarus vero arteriae pulmonalis dexter primus ex tronco oritur, paulo ulterius sinister: quae causa est, cur arteriosum ductum ex sinistro ramo arteriae pulmonalis deducam *Fabricius* scire in icone 25. *Garengeot splanchn.* II. p. 153. *Kulmus T.* XIV. Tres autem ramos arte-

utramque arteriam perforat, ita ut inferior pars canalis ad pulmonalem arteriam pertineat, superior ad aortam. Adeoque de sanguine arteriae pulmonalis pars ea ad pulmonem feretur, quae respondet magnitudini pulmonis: sed in arteriosum canalem ibit ea tota portio sanguinis, quam non capit collapsus pulmo, & quae majorem in pulmone quam in aorta resistentiam invenit, eademque tota in aortam demittetur (3). Sic pulmo quidem sanguinis minorem in fetu portionem accipit & congruo moli suae, cum in adulto totum sanguinem cavae utriusque, in fetu vero eam copiam habeat, diminutam [4] sanguine,

arteriae pulmonalis facit *Salaman* de circ. sang. in fet. num. 15. & olim *C. Bartolinus* p. 216. & *C. Babuinus* p. 236. sed isti male ductum arteriosum minorem faciunt reliquis ramis, cum utique ob directionem ductus arteriosi, cum trunco continuam, ramus sinister potius ramus ductus arteriosi dici debeat.

Valvulam ad ductus arteriosi ostium pulmonale dictam *Carcano* l. c. & *Comm. Nov.* 1735, T. 1 f. 3. & nuper *Garengeotus spitham.* p. 395. & *Trevvius* f. 30. 66. refutat *Harveius* p. 62. Alteram in ostio arteriosi ductus aortico ponit *Trevvius* 2. f. 15. 38. 61. p. 67. 28. dictam *Agricolae*, & circuli modo depictam *Comm. lit.* 1735. T. 1. f. 3. Mihi nihil videntur, nisi necessariae plicae, quae in nullo arteriosi rami ostio desunt, neque multum ipse tribuit *Trevvius* p. 77.

[1] Hoc, si quis negaret, facile demonstrareretur & diametris vasorum. Nam arteria aorta datis magnis ramis habet $\frac{276}{1000}$ ductus arteriosus 1024. aorta descendens 1225. quae vix major ex corde prodit *Kanabaut reponso* p. 13. 103. Sed truncum non majorem 526. partibus generare ramos duos, singulum duplo trunco majorem, enorme esset & absque exemplo. Egrege vero olim ductum arte-

riosum alteram aortae radicem vocavit *Harveius* p. 61. Deinde ductus arteriosus manifeste conicus est *Needham* c. 5. *Nicol.* p. 57. & vidi prope truncum fuisse 43. prope aortam 36. Ex anatome comparata etiam huc pertinet, quod in cornice ex ventriculo dextro via in aortam sic *PEYER observ.* p. 44. loco ductus arteriosi, eademque fabrica in homine visa sit *Alb. Hafn. ann.* 1. *observ.* 110. eoque in corpore arteria pulmonalis minor, quam aorta fuerit.

(4) Foramen ovale multo minorem, quam sextam partem sanguinis Cavae transmittit. Utraque enim singulatim cava vestigio ovali amplicor est, cujus tertia parte pars sanguinem transmittit, duae veto tertiae solidae sunt. Quattae comparat *Ridley* p. 190. tertiam vero partem sanguinis venae cavae inferioris per hoc foramen transmittit credit *Verheyenius* II. p. 415. Verum ego lumen huius inferioris cavae, distantiae, reperio 1025. cum lumen distracti paruli foraminis ovalis esset 196. aut paulo ultra. Cavae vero superioris lumen erat 561. ut in eo maturo fetu, minima omnino pars sanguinis per foramen ovale transmissa fuerit. Ductus vero arteriosus majorem quam dimidiam partem sanguinis cordis dextri in sinistra vasa devehit: Omnino enim utrovis ramo pulmonali major est

ne, qui per ovale foramen, & sanguine, qui per ductum arteriosum abiit. Sinistrum tamen cor & aorta eandem copiam sanguinis habet. Circulatio vero sanguinis perinde, uti in adulto, aequalis est. Reliquus etiam sanguinis motus nihil differt, nisi quod sanguinis magna portio ab arteria aorta per umbilicales ad placentam feratur.

§. DCLXXXII.

Vasculis (1) Quorum ne vestigia adsunt, extra gravitatem. Haec vascula uteri mole augentur a primo tempusculo graviditatis, ad ultimum: uterus enim in latum extenditur, & sicut uteri moles increfcit, ita etiam vascula in utero distenduntur. Hinc fit, ut uterus, mire crassus in virgine, in femina gravida enormiter auctus volumine, crassitiem (2) tamen eandem conservet: neque enim haec crassities est a novis valis additis ad priora, neque ab auglo partium solidarum numero, sed in ipsa cavitate vasorum uteri, quam major liquorum copia distendit. Uti vero uteri pori distenduntur, ita necesse est etiam chorii (3) poros distendi.

Præparatur) Incredibilis vis humorum est, quae per uterum fertur: verum motus eorum humorum lentus (4) est, & videtur calore, qualis incubationis est, foveri, & mutari. Hi humores sanguis fere sunt, tum chylus, quod apparet, tum is ipse liquor, qui in uterum fluit, etiam ad mammas altero die (5) post partum veniat, ubi chyli simillimus est. Pergunt adeo moveri & mutari humores isti, donec in naturam nutritii humoris, chylo simillimi, mutati fuerint, qui delatus ad internam superficiem uteri, ubi uterus placentae cohaeret, placentae

jor est *Mery de la circul.* p. 11. *Taverny* p. 179. & ejus lumen reperi 1600. eum lumina ramorum arteriae pulmonalis essent 1568. iterumque ductum arteriolum 1849. cum isti essent 1341. *Roubaux* minorem aliquando fuisse alterutro ramo scribit *disforsi.* p. 6. quod nunquam vidi. *Verbeijen* ductum arteriosum dimidiae parti pulmonalis arteriae comparat L. II. p. 172. conf. *Trevu* p. 69. sed major est. Aortae vero vel aequalis est, vel paulo major, uti recte *Mery* p. 50. *Ridley* p. 186. & *Roubaux* off. p. 74. *reponse* p. 12. Ergo pulmo in fetu minorem tertiam partem sangui-

nis totius accipit, quam non facile crediderim excedere $\frac{1}{16}$ totius. In juniori vero aetate fetus haec portio dicitur major esse, tunc enim & ovale foramen amplius est not. 6. ad DCLXXX. & ductus arteriosus *Sylvestre* p. 30. ex *Cypriano*. De ea re experimenta propria non habeo.

(1) DCLXIV.

(2) DCLXXV. not. 13.

(3) DCLXXVI. not. 11.

(4) Ob arteriarum laxitatem, & duritatem atque parvitatem venarum DCLXI. not. 1.

(5) DCLXXXVI. it.

tac tradatur, iturus ad fœtum per venulas, quae in umbilicalem truncum conflunt. Verum auctores fidiſſimi obſervatum reliquerunt, chorion, in ea parte, qua placentam non ambit, contiguam eſſe reliquae parti uteri (6), pariter a placenta liberae, ut omnino nulla inter uterum concavum & connexum ovum, diſtancia reliqua ſit, & tota ſuperficies ovi totam uteri ſuperficiem undique contingat. Nam, ſi vel minima aquae portio media interfluere, neceſſe eſſet abortum ſequi. Deinde etiam placenta chorio (7) obducitur, ergo & in ea parte neceſſe eſt, per chorion venire ex utero humores omnes, qui a matre ad fœtum ibunt. Nunc eo tempore, quo primum concipiebatur, fœtus minima particula fuit, quae intra hos novem meſes majori ratione increvit, quam fere credi poſſit: hoc incrementum omne venit ab utero, adeoque per chorion. Maniſteſtum adeo eſt, chorion membranam eſſe poris inſtruſtam, qui ſimilibus in utero poris (8) reſpondeant, neque enim aliud machinamentum notum eſt, quo humores transfundi poſſint. Non ideo velim docere artificium, quo haec membrana operatur, id enim mihi ignotum eſt, neque quidquam docent etiam ea microſcopia, quae optima ſunt: ſed certum eſt tamen, per chorion ſuccum albibilem ad fœtum venire, quocunque demum id fiat modo. Duplex autem per chorion via eſt, altera in placentam, altera in eam partem ovi, in qua nulla placenta eſt, diximus enim nullam uteri particulam eſſe, quam chorion non obducatur intus. Sed neque ſpatium inter uterum & chorion medium ſuper eſt, hinc ſuperfetatio, quam adferunt, ut demonſtrent chorion alicubi liberum eſſe, ſi unquam, rariſſime certe contingit (9). Succus ergo pulpaе uteri venit etiam in chorii partem, ubi placenta nulla eſt, & immediate ſub eſt amnios (10). Duplex adeo ſuccus ab utero per

(6) DCLXXVI. not. 5.

(7) DCLXXXVIII. not. 13.

(8) DCCLXXVIII. not. 8. ſeqq.

(9) DCXCIV.

(10) Amnios verum & proprium fœtus involuſum eſt, multo chorio ſtremior, & mediae etiam membranae robur ſuperat. GALENO probe nota ſuit *de util. part. L. XV. c. 4.* ex quo THEOPHILUS habet p. 896. Tota pellucet aquoſa SPIGEL *de form. fœt. T. V. l. 1. r.* intus leviſſima, extus ob cellulofam, quae mediae neſſitur, ſubſtancia VESALIUS p. 673. ROUHAULT *Mém. de l'Acad. 1714. p. 187.* Sub placenta leviter fu-

goſa eſt, NOORTVYCK p. 17. ubi vix a reliquis membranis ſeparabilis HOBOKEN *anat. rep. p. 215.* A funiculi externo involuſo oritur, a quo ad aliquam ab animo diſtantiā ſecedit. DCLXXVI. not. 8. etiam trium aliquando digitorum HOBOKENo notante, ut, ſtatu ſub involuſum funiculi inmiſſo, bulla adpareat inter placentam & funiculum. Duplicem eſſe membranam Fabricius auctores *eſt de form. fœt. P. II. c. 6.* & nuper Cl. Noortvyeck. Sed iſte mediam pro amnii lamina accipit. An veras glandulas in brutis habeat, non diximus.

ro per chorion transudat, sanguineus alter, qui per placentae corpus ad fœtum venit, alter amnii liquor, qui ex utero [11] in chorion, ex chorio

rim. Corpuscula certe albida, copiosa, in superficie interiori amnii vaccini vidit Cl. ALDES apud MANGET p. 547. & N. STENONIS de gland. & mife. p. 43. & HOBOKEN anat. secund. vitul. p. 58. f. 6. f. 22. f. 38. (etiam in funiculo similes f. 6.) ; & HARDER apiar. obs. 8. & ZELLER de vita ex funic. pend. & COVPER ad T. 55. Fistulosas vero appendices in ioterna superficie amni, quae per inhiolos poros liquorem fundant. MALPIGHIUS addit possib. p. 47. In homine certe glandulae nondum visae sunt: neque huc trahi debet unicum glandulosum granum amnii humani, semel ab HOBOKENO visum, quod forte grandio aliqua morboſa fuit. Lactea vero, aut lymphatica, in amnio vitulino ex suspitione ptoposita a BARTHO LINO p. 315. tum a MERYO apud la MÔTTE obs. 24. nemo accuratiorum vidit, & refutat HOBOKEN anat. rep. p. 152. Nam etiam rubra vasa in homine non solum parva habet, ut Vesal. p. 673. Arantius de fetu p. 28. Spigel. de for. fet. p. 5. sed omnino nulla HOBOKEN secund. hum. p. 21. anat. rep. p. 118. RUYSCH. epist. XIII. p. 10. NOORTVYCK p. 14. Fita tamen sanguinea vidit Hoboken anat. rep. p. 152. In brutis vasa habet, ut in vacca Hoboken l. c. p. 58. f. 3. 10. 13. 22. DREINCOURT de amnio n. 4. HARDER apiar. obs. 8. RUYSCH Theſ. VI. n. 57. Inde nata sunt illa vasa amnii, quae ex umbilicalibus dicunt oriri HARVEIUS ex. 57. GRAAF p. 284. & COVPER ad T. 59. & venae illae, quas inter laminas amnii repero dicit Fabricius l. c.

Tom. IV. Pars II.

[11] De fontibus liquoris amnii omnia obscura sunt. Veteres solebant pro sudore fetus habere. Ita Rufus p. 45. & Galeus de util. part. l. XV. c. 5. ubi quasi sudorem vocat, tum Vesalius p. 674. Fabricius l. II. c. 7. Spigel. p. 5. inter recentiores vero Mauriceau p. 220. & Vicusſen p. 23. Pro urina & sudore Riolanus p. 367. 375. Verum huic sententiae nimis repugnat: quod & ante fœtum in ovum receptum liquor amnii jam reperitur, ut ex ovo subventaneo Malpighius auctor est de form. pull. app. p. 2. & in secundo ovo, sed cui fœtus nondum inest visibilis; HARVEI p. 281. Graaf pag. 286. quod porro fœtu destructo ova humana vacua cum superſtite huiusmodi liquoris passim reperiuntur DCLXXV. not. 1. quod denique in primis initis fœtus maxima vis liquidi sit, HARVEI p. 196. & centies major toto coſpiculo. Ita in ovo illo PINNAEANO DCLXXV. not. 1. enormis aquae copia fuit. In ovo quadragesimo die unciae tres, & quatuor, cum fœtus formica non major eſſet Riolan. p. 388. In vitulo undecim drachmarum pondere ſequilibram humores amni reperiit Verboven II. pag. 362. Tunc vero minuitur, quando fœtus grandior eſt HARVEI ex. 65. Graaf. l. c. Taverny p. 149. Ita in vitulo tenero copioſior eſt, quam urina, in maturo vigies paucior Alder p. 546. & in cuniculis paulo ante partum pene nullus Graaf c. 15. Id autem valde repugnat analogiae. Honor enim pericardii & pectus & ventriculorum cerebri &c. ſemper propriam rationem, & multo minorem obſervat ad viſcera, ex quibus exhalat. Scilicet praeterea totius

Z

fetus.

chorio venit in amnion, excludat in cavitatem ovi, & ea aqua est, in qua medius fetus natus.

Chylum) Liquor amnii nunquam deficit, ergo perpetuo suppeditatur,

fetus proprio mucō oblitam cutem habet, *Vesalio* jam observante p. 674. & *Arantio* p. 29. tum pro nova re nomine nōctuosi albi pinguis excrementi proposito a *Fabricio* P. I. c. 1. P. II. c. 17. & *Spigelio* I. c. p. 6. repetito a *Dresincourtio Perrochio* 54. *Harveio* p. 514. *Mauriceau* p. 458. quem mirum ignotum fuisse Cl. *Gutermanno Comm. Nor.* 1731. *bebē* 32. Is mucus huic abundantī secretioni non faveat. Quia glandulas amnii admittunt, non aliam scaturigenam volunt liquoris, ut *Hoboken* *avat. secund. vit.* p. 175. *Zeller* I. c. *Kell* p. 111. & *Covvper* *jud* T. 55. pro parte. A saliva fetus *Listerius* deducit de humor. c. 48. Ex amnii fetus, lacte seroso turgentibus *Bobnius* p. 29. partem vero derivat inde *Covvper* in *Introd.* Repugnant, quae contra sudorem dicta sunt. A saliva & marium mucō & urina fetus *Dresincourtius Perrochio* 42. de agnina n. 38. Ex urina denique *Arantius* c. 28. & *Carpus* pag. CCLXI. 8. sed, praeter perfectam obstructionem urethrae DCLXXXIV. repugnant experimenta. „ In fetu penis obstrictus, ut etiam faceret in vesica urina, & tamen multus liquor amnii la *Motte* L. I. c. 24. Ex vasis amnii repetit praestantissimus *Monroux*, idque injecta aqua demonstrari credit *Edimb. Soc.* II. p. 147. tum *Vogelii*, p. 219. A lymphaticis amnii la *Motte* *obser.* 24. vel a gelatina funiculi *VVbarton* p. 246. per papillas funiculi p. 256. minimas, longitudinem funiculi ambeantes stillare p. 243. Verum succus colliquamenti etiam ibi reperitur, ubi nulla in funiculo gelatina est.

Ex ductibus succiferis funiculi simili fere modo deducit *Mianiki* p. 88. nondum certe demonstratis. A chorii glandulis, vasis connexis *Malpigh. possib.* p. 47. 88. Ab utero denique per chorion, in amnion, uti *Præceptor*, repetit la *Courvoisier* p. 151. & *Everardus*, *Taurinus* p. 156. & *Needham* c. 2. & *Verbeijen* L. II. p. 462. Ex coryleodonibus autem, quod in felibus manifestum esse dicit, *N. Stenonis* I. c. Ab utero, transsudatione aliqua, tum ab umbilicalibus etiam arteriis *Graaf* p. 288.

In re dubia respondere difficilimum videtur. Nulla quidem vascula pellucida demonstrantur, quae a chorio, per mediam, in amnion veniant. A vasis amnii separari, perinde conjectura est, & repugnant saeculi colloquamentum liquore pleni, qui in ovis subventaneis reperiuntur, repugnat liquor amnii in ovis humanis vacuis, & proportio demum contraria magnitudini fetus, & tempora, quibus ovum, haecenus liberum, non a fetu nimis exiguo, sed ab utero, per poros bibulos chorii liquorem traxit omnem, excepta portiuncula, quam ab ovario habet. Haec ipsa ratio est, quare omnino inclinem in *Præceptoris* sententiam, fistulas nempe minimas a chorio in amnion venire, & istas persotatas liquorem exhalare, quem ab utero imprimis habebant. Talia vasa *Roubaultus* rubra vidit, pellucida adfuisse nihil repugnat. Pars autem, quam ovum ab ovario adtulit, & a femine muliebri repetit *Riolanus*, p. 388. ea utique exigua est.

tur, nunquam faciet (12), ergo semper recens advenit: estque verus nutritius humor, qui a maternis arteriis, per earum propriam fabricam elaboratus recipitur in bibulas fistulas chorii, amnii; in cavum ovi; ut in eo ipso humore fetus natus. Sapor [13] ejus blandus, dulcis, subfalsus est; in cochleare igni expositus concrevit: lentius tamen, quam albumen ovi, aut sanguinis seram, cui proxime accedit, aut albumini, cum aqua concussa. Duplex ipsi utilitas est, continere fetum, & alere (14). Fetus omnis, etiam in utero, si obstetricis digitum pre-

Z 2 hende.

(12) Inde dudum *Cyprianus* concludit, debere aliquem circulum obire, ne corrumpatur p. 52.

(13) Subfalsus in vacca *Aldes* p. 547. *Hoboken* p. 711. *Peyer* obs. 31. & pullo *Schrader* p. 120. odore & sapore grato *Everard* p. 159. *Bartholinus* p. 302. subdulcis *Viesfens* nov. syst. p. 22. hydrogalae more, acceptus matribus *Harvii* p. 195. pellucidus *Hobok* p. 71. in maturo fetu viscidior *Aldes* l. c. *Morvos* p. 174. *Maitre-jean* p. 219. (de coeliquamenti liquore), & acrior *Bobn*, p. 31. *Cörsfelden*, p. 280. glutinosus in fetu humano emarcido, diu in utero retento *Cyprian*. glutinosus denique non raro etiam in abortibus humanis minoribus, toties repertiente *D. Mauriceau* & *Muralto* p. 623. coll. anat. de gelatinæ similis *Needham*. c. 2. *Gibsonus* autem in maturo fetu tenuiorem & salum facit *Etlimb. soc.* l. p. 200. A spiritu nitri in-erassatur & candescit *Langley* p. 166. ab alumine inspissatur *Taury* p. 148. in igne non cogitur *Needham Taury* ib. *Lyster de humor.* p. 440. *Sbragii sceps.* ll. p. 415. *Beilinger*. p. 45. Subinde coagula in hoc liquore nant, quæ frequentia ait esse *Needham*, ratiorea, fere adhaerentia faciei internæ, & sorte glandulas *Hoboken anat. fac. vit.* p. 73. 235. Mihi omnino in fetu humano amnii liquor similissimus videtur humoris, qui in pericardio,

Rist. p. 409. (copiosior *Taury* p. 153.) pe.lore, abdomine *Verheyen* ll. p. 379. fetus, copiose reperitur. Rubet certe quem vidi, tenuis est, exhalat pelliculæ scissis strigmentis, [quæ in brutorum liquore pericardiaci etiam *Cl. Aldes* vidit p. 548.] ab alcohole vero assulso albescit.

(14) Cogi dixerat *Viesfens* p. 23. & *Bobn*. p. 23. ita tamen, ut in maturo fetu minus cogeretur. Sed omnino plerumque non cogitur: uti ex *Ruysschii* præparatis ovibus demonstratur: hæc eni in liquorem amnii continent pellucentem, uti passim innotet *Tösch.* XI. nu. 122. neque mihi similia denunt.

(14*) An fetus per os alatur, celeberrima quaestio est, quam aditgi DCLXXVIII. not. 8. Ergo hunc succum alibilem esse, post *Democritum*, qui apud *Plutarchum* legitur docuisse, fetum per os ali, *Harveius* auctor est *exorc.* 58. & per os solum, post prima initia, quibus per umbilicalem alebatur pag. 199. & in pullo pariter colliquamentum deglutiri: cum prius omnes scriptores humores fetus inter excrementa numerassent. Porro huc pertinent, *Harveii* experimentis usus, sed ratiocinator, *Claudius* ipsa *Conrose de nutrit. fer.* l. toto, & *Needham* c. 3. tom *VPharion*, *Dietmarbroeck* pag. 212: *Bartholinus* p. 315. *Hoboken anat. repet.* p. 444. *vitul.* p. 190. *Graaf* p. 287. 291. *Bobn.*

hendere potuerit, fugit (15) illico. Infans recens natus, si continuo a morte apertus fuerit, ventriculū plenum habet caseosis (16) strigmentis, quasi albumine ovi victitasset, intestina vero tenuia massa cibaria

[17] va-

Bobn. pag. 31. *Taury* pag. 165. *Cosuper* introd. *Lister* c. 48. (certe deglutiti adfirmat) *Verheyen* II. p. 362. *Keil* p. 211. *HEISTER* p. 110. *Trevu de Chylis* fet. & de differ. fet. p. 110. *Kaauw* n. 2049. *Gibson.* *Edinb. soc.* I. Aliquid etiam subire per os admittit *Cyprian.* p. 49. aliquid autem per cutem recipi *Kaauw* nu. 1049. post vetustissimas *Alcmaeonis* conjecturas, & recentiores *Diemerbroeckii* p. 221. & *Vieussanii* nov. syst. p. 24. Ultimis tamen temporibus amnii liquorem inusilem esse & acrem, & per umbilicum solum secum ali *HARVEIUS*, *Needham*, *Bobnii* & *Gibsonus* concedunt.

(15) Vide consentientem *Præceptorum Galeni* de util. L. XV. c. 7. & *Harveium* p. 193. fetum nempe in ipso partu versantem, digitum adprehendere & fugere. Dudum *Hippocrates de carnibus* n. 8. & *Dioles*, carunculas fetum fugere, dixerant, sed rudiori modo, ut crederent cotyledones uteri exsugl.

(16) Ex principibus argumentis est. Li-
quor nempe, qualis in amnio, etiam in ventriculo & intestinis fetuum reperitur, similis colore, sapore, glutinositate, experimentis cum chemicis reagentibus factis. Ita invenerunt *Fabricius* P. I. c. 10. *Harvei* p. 238. 243. *VVherston* p. 247. *Everhard* p. 62. 94. 136. 137. *Needham* c. 3. *Bartol.* ad *HORST.* p. 69. *Aldes* p. 547. *Verheyen* II. p. 362. *Brendel* de nutr. fet. B. 11. *Brunner* de pancre. p. 146. *HOBOKEN* secund. vidul. p. 24. *N. Stenonis* *Alb. Hofm.* II. p. 228. *Graaf.* p. 287. *Taury* p. 150. *Tiling.* de plac. p. 135.

Manerocord. p. 98. *I. M. Hofman* E. N. C. Cent. X. opp. obs. 46. *Trevu de diff.* fet. p. 110. *Harvei* exerc. 21. & in pullo gallinaceo *Densing* apud *Maitrejean* p. 216. *Harvei* p. 68. 197. & in infante *Heister* de fall. exper. p. 14. *Marsali* vadem p. 425. [qui subacidum, facile coagulabilem fuisse dicit.] Sero lactis vero comparat in damis *Harveius* p. 238. & lacti coacto in avibus *Harvei* p. 68. 69. 197. & *Schrader* p. 179. *Tiling* pag. 135. & *Eysionius* apud *Schook* de signatur. fetus pag. 44. lacti denique *Malpighius* de form. fet. p. 21. *Harveius* p. 68. 69. acidumque in ove fuisse lego in E. N. C. Dec. I. obs. 154. & in monstro mortuo nato *Faber* apud *Hernandez* p. 603. Ego, ut plerique, gelatinam rubellam reperio, hila trahentem, qualis humanæ amnii liquor est. Neque liquor solum, sed concretiones pingues similes, & in ventriculo, & amnio natantes reperit *Aldes* p. 546. *Rudbeck* obs. 9. Denique hunc liquorem amnii continuo ductu per os & fauces & ventriculū congelatum reperit *Trevu de chyl.* fet. n. 26. & *Il.* *Heyster* not. 37. Denique ipsos pilos cutis vituli, qui certe non potuerunt, nisi per os in colon fetu venire, in crassis reperit intestinis *Aldes* p. 548. & faeces proprias raro casu excretas *Needham* c. V. & *N. Stenonis* l. c. in ave vero iterum proprium in ingluvie *Densing* p. 371. apud *TILINGIUM*. Vicissim in quinquæ catulis, ore destitutis, ventriculū inanem reperit *GRAAF* p. 202.

[17] vasâ demum lactea (18) chylo repleta sunt, certissime omnia. Hic, Leidæ, fetus fuit a matre hætenus sana natus, cui mala arte obstetricis, ruptis involucris, abdomen apertum fuit [19], ut intestina pendula per tenuissimam cutem adparerent, & poterat oculis usurpari motus chyli, ex tenuibus intestinis, per lactea fluentis, cum tamen fetus nihîl quidquam alimentorum unquam admisisset. Ergo ventriculus, & tenuia intestina, in fetu eodem, quo in adulto, funguntur officio [20]: jussitque hæc organa DEUS assuescere ei muneri, cui post natiuitatem erant inservitura. Hæc materies alibilis humor est, qui per duas membranas transfundat, uti in ovo gallinaceo vitellus albumen omne recipit, idque per amnion tradit in colligamenti sacculum. Ergo fetus ex antiqua HIPPOCRATIS doctrina nutritur & sanguine, adveniente per venas umbilicales, & liquore amnii, quem per os accipit: Ratio duplicis alimentis hæc est. Animal non potest generare (21) rubrum sanguinem nisi pulmonis ope, vel branchiarum, si ex piscium genere fuerit. Verum pulmo nihil agit in fetu, branchiæ non adsunt. Ergo chylus quidem, & reliqui humores præparari possunt, sanguis præparari nequit, cum pulmo non operetur. Et tamen fetus nihilo secus, quam adultus homo, verum rubrum sanguinem habet. Videatur adeo, partem sanguinis, quæ in corpore fetus destituitur, & eget actione pulmonis, per umbilicales arterias amandari versus uterum & pulmonis materio reddi, ut ibi fruatur pulmonis effectu (22). Tunc vero de sanguine materno per placentam, & venam umbilicalem, tantum redire in fetum sanguinis, elaborati in matris pulmonibus, quantum sanguinis in pulmone non elaborati, per arterias ex fetu in matrem iverat; atque adeo fetum per venam umbilicalem non proprie nutrirî, sed accipere id beneficium, quod sanguini ex actione pulmonum accedit. Vera autem nutritio fetus fit humore per os, & nares (23) accepto, nam os naresque in fetu eo hu-

more

[17] Puer statim a partu, nullo cibo assumo vomuit LANZON animad. 33. liquorem lacti similem DIE-MERBROECK p. 224.

[18] Ex fetu vasâ lactea omnino depinxit VESLING c. VIII. T. 2. f. 1. Ductus thoracicus in fetu facile reperitur, sed rubella lymphâ plenus, uti fere in adulto.

[19] Hujusmodi calamitates RUYSCHIUS describit obs. 72. 73.

[20] Cum & scybalâ præparetur 683. & chylum.

[21] Possè utique vide, DCLXXVIII. 7.

[22] DCLXXXIX. not. 24.

[23] Non ignoro, quæ contra hanc nutritionem dixit Monrous, & si millima demonstrationi credit CL. NOORTVYCK: & quæ passim apud scriptores reperitur, qui veterum doctrinâ renovata humorem amnii nutritum esse negant, Mauriceau, F. Hofman p. 451. Stöhl, p. 51. F. Bellinger of the nutrition of the fetus 101a libello, Cheshelden, Mery in Comm. Reg. 1709. Gabriel E. N. C. Dec. II. ann. 10. obs. 4. Rouhaud 1714. p. 195. Nenter &c. Nempé 1. Liquorem non alibilem esse, cum

more replentur in recens nato, qui in duodeno, bile & pancreatico succo adfusis elaboratur, in vasa lactea fetus recipitur, & per thoracicum ductum, venit in cavam venam fetus, & cor dextrum, inde partim per pulmones, partim per foramen ovale ductumque arteriosum in aortam transit, hinc in omnes arterias venit; & porro de eo sanguine ex aorta sanguis ineptissimus venit per arterias umbilicales in placentam, & matris sanguinem, quae tantum boni sanguinis fetui reddit per umbilicales venas, quantum ab eo deterioris cruoris accepit. Et uno verbo chyliificatio in fetu ipso perficitur, sanguificatio vero ex majori parte ope materni pulmonis peragitur.

§. DCLXXXIII.

cum non sit coagulabilis *Mauriceau* p. 221. & ex ipsis fetus vasculis licentiam *Monroo* p. 179. 2. Fetus non posse deglutire, quod os elatum habeat, praevalente robore quicquid temporarium *Monroo* p. 292. & ita in fetu humano reperiri *NOORTVYCK* p. 16. atque linguam palato applicatam, & pharyngem clausam, ut nihil liquoris subiret *Monroo* ibi, etiam in pullo *Mastrosian* p. 221. qualia etiam habet *D. Bollinger* p. 48. Addi solet abique respiratione nullam in homine deglutitionem esse, neque adeo, etiam aperto ore, descensurum amni succum, donec aeris usura libera fuerit *Nenter physiol.* p. 338. *Roubaux* l. c. Hinc pullos fatetur *Monroo* os aperire, deglutire negat p. 219. & testatur se hac in amnion vituli infudisse, nihil tamen in ventriculo reperisse p. 195. 3. Repertos esse fetus abique ore *Chefelden* pag. 279. *Littre Mem. de l'Acad.* 1701. p. 120. conf. *DCLXXVII.* 11. acrophalos demum, non rarissimo exemplo; & unam eandem quinque abique ore catulos genuisse facibus tamen alvi non destitutos *Graaf* pag. 292. & in agno, cui os inperivum esset, tamen gelatinam in ventriculo, meconium in intestinalis, repertum fuisse *Hist. de l'Acad.* 1715. *obs.* 7. 4. Liquorem, qui in pulorum ven-

triculis reperitur, mucum esse *Riolanus* p. 410. *Monroo* p. 153. etiam in avibus *ID.* p. 214. diversum ab amni liquore, hunc enim in amnio viscidum, fuscum, in ventriculo vero pallidum & aliter diversum se reperisse *ID.* p. 182. & *Bollinger* p. 45. qui viscidum semper in ventriculo, tenuem & evaporabilem in amnio sub fines gestationis reperit; & *Gabriel* p. qui acidos dicit esse vomitus, neque rubicundos, ut amni aqua *E. N. C. Dec. II. ann. 10. obs.* 4. Ergo malum humorem amni fecerim a glandulis oris *Mary Mem. de l'Acad.* 1709. p. 21. oesophagi & ventriculi *Bernhardi d. de nutrit. fet. n.* 14. Addi posset, legi exempla, ubi ruptis membranis fetus diu supervixerit. Fetus manum existerat, deinde retraxit & ad maturitatem gestatus est *L. Bourgeois L. II. p. 6. Hollerius. E. N. C. Dec. II. ann. 5. obs.* 13. Abortus ruptis membranis repositus & retentus est, si fides *Bartholino hist.* 57. Cent. IV. Inde videtur sequi, si quorem amni non esse necessarium alimentum. Credit adeo *Cl. Monroo* vaporem esse, exhalantem ab arteriis amni, & subinde per venas reabsorbium p. 148. qui repleat vacuum amnion, ut fetus mobilis, & tamen a compressionibus externis tutus conservetur.

fervetur p. 182. Copiosum esse sub initia fetus, uti in languidis aegris aquae passim congeruntur, quod exhalantibus vasis satis roboris superit, reformationi in debilitate fere quiescant. *Idem* flavuit p. 112. neque adhuc certum esse, ante partum consumi p. 184. Inservire porro dilatando utero, ita ut minus doceat, quam a figurato fetu *Cyprianus* p. 47. & faciliori gestationi cum minori matris incommodo *Galen* L. XV. c. 5. demum partum faciliorem reddere *Galenus* jam observante de util. part. L. XV. c. 5. & *Lisero* p. 444. & aliis.

Verum ne *Præceptorum* defecant, multa faciunt. Non coagulari aliquando, in calore tanto, quantus arctiōsi uteri incubatio est, non miror. Nam etiam uteri vasa lymphatica in brōtis liquorem habent, qui perspirat totus *Malpighius* possib. p. 46. & secundi ovi albumen ab incubatione omnino fluidius sit *Gahrleip* l. c. idemque modo concrevit, modo minime *Monro* sarente p. 209. Nam hora 330. liquor colligamentum induratur in servida *Mairesjoen* p. 208. & die 14. *Malp. incub.* p. 9. Sed die nono, negat coire hunc liquorem idem p. 181. 182. & negat unquam coire *Belinus* de motu cord. pag. 34. & *Schrader*. Ut omnino inconstancia in experimentis videatur pendere a majori & minori gradu incalescentiae & incipientis quasi putredinis in hoc liquore. Denique non sanguis quidem in fetu, uti in adulto cogitur, manifesto argumento, etiam alibiles humores in ea ætate tenuiores esse. Porro fetum omnino deglutire certum est, neque difficitur *Cl. NOORTVYCK* p. 199. Nam fetus humani os quidem a morte clausum etiam reperio, uti in aliis respirantibus cadaveribus frequens est. Sed alii aliter reperiunt.

Cuniculo 14. dierum *Graaf* p. 312. & trimestri fetui os hiat & labra diducta sunt *Everard* p. 94. *Langley* os apertum a. mente vidit p. 165. & in mortuis vitulis lingua super maxillas, eminet *Strapart van der VViel Cent.* II. observ. 32. neque potest os non hiare, cum in fetu humano labra nulla, rictus insignissimus sit *Harvey* p. 239. *Riolan.* p. 411. *KERKING* & *Bianchi* in figuris. In fetu pollicis magnitudine os amplissime fissum *Vanette* p. 266. conf. *Gibson* l. p. 182. Verum etiam vivos fetus in amnio hiantes citavi ex *Platero*. Pullus die 7. rostrum aperit *Harvei* p. 62. 197. & undecimo *Schrader*. Ore aperto lingua exserta natat *Bartholinus* vidit ad *Horsium* p. 69. & *bjf.* II. n. 82. *Cornelius Consetinus* p. 260. & alii. Movere denum linguam & deglutire omnino vidit *Schacher de deglut.* p. 15. & liquorem, uti dixi, ex amnio per os, & oesophagum, in ventriculū continuo hilo subsistere frigote contractum *Trevv.* & *Heister*. Ipse demum *Monro* sateat in vitulis p. 190. os hiat. Sed hiant ore liquore a pressione atmosphaeræ in vacuum determinata omnino absque motu deglutitorio subit in catellorum mortuorum ventriculū, dum os vero clausum est, nullo atmosphaeræ pondere subit *Staselin Spec. anat. bot.* 1731. nu. 10. Si ergo os apertum est in fetu, & in liquore natat, & liquor copiosus similisque in ventriculo reperitur, & demonstratum est pressum subire, quidni is liquor sit ex amnio? & si ventriculū subit, quid aliud facit, nisi nutrit? Mucum autem ventriculi esse nemo crediderit. Nam in vitulo maturo ad triginta & quadraginta uncias reperit *Aldes* p. 547. super omnem mucum aut exhalantis liquoris proportionem. Deinde omnino tempus

Faeces) [1] Fetus tertio (2) jam mense in crassis intestinis faeces habet, eo plures (3) continuo (4) quo propior nono mense fuerit. Quando prius exstinguitur, quam aerem hauserit, tunc ab ano sursum totum colon intestinum, ejus tres sigmoideos flexus, caecum, appendicem

tempus fuit, quo fetus vix nisi per os ali posuit: dum nempe vermiculi specie vixit, quem plus quam probabile est, omnium aquatulum animalculorum more, per os alimentum sumsisse. Iterum dum ovum liberum fuit neque villos exteruit, credibile est ipsam lympham ovi fetum aluisse *Drelincourt. parerg. de ovi num. 4. Berger p. 470.* uti pridem *Galenus* semen muliebree pro primo fetus alimento habuit *de util. part. L. XIV. c. 11.* & nuper *Diemerbroeck pag. 177.* Sed maximum etiam analogiae robur est, quae demonstrat, omnium insectorum & piscum plerorumque fetus de ea materia unice vivere, quae in ovo est, cum umbilico destituantur *Rai synopsis quadr. p. 48.* Denique fetus illi umbilico nullo, & animalia quibus aut nulla, aut obcurissima placenta est *DCLXXVIII. not. 8.* per os fuisse nutrita necesse est. Facile tamen crediderim ex ipsa comparata multitudine liquoris ampii plus in initiis, minus sub finem per os adsumi, & forte ante partum mora, atque calore ita acrem reddi, ut ex causis sit, quae partum irritando faciunt.

- (1) Solent vulgo hae faeces adduci inter argumenta cibi per os adsumti, eoque scopo *Præceptor* adfert. Verum alii contra mere a mucro & liquore glandularum oesophagi &c. esse statuunt. *Montroo*

L. c. Bernard de nutrit. n. 14. &c. Nenter p. 138. Agnum ore impervio habuisse & gelatinam in ventriculo &c. in crassis meconium *bist. de l'Acad. 1715. n. 4.* Mihi videtur utrumque liquorem concurrere. Fame enim eneata animalia, quibus saliva & bilis, & reliqua adjunt, nullas in intestinis faeces habent. Ita *Graafius* vidit aliquas sed paucas faeces, in caulis absque ore natis *p. 192.*

- [2] Tertio, & quarto mense sterlus flavescens in crassis est *Everard. p. 137.* Hoc sorsim album meconium est, dictum *Aristoteli bist. anim. L. VII. c. 13.* Quarto mense meconium *Harvei p. 185.* In cuniculis die 25. a conceptu sterora in crassis *Everard. p. 137.* tum in pullo gallinaceo *Harvei p. 69. Tiling. p. 135.*

- (3) Rite autem copiosum vocat *Arantius de fet. p. 37.* cum crassa omnia aequabiliter, in cylindri speciem, & tenuium non minimam partem repleant, & viridi fusca, mollia, & saponis nigri similia. Amaram fuisse faecem in recens nato, lego in *E. N. C. Dec. I. an. 6. obs. 282.* quod miror, nam bilis ipsa eo tempore inspida est.

- (4) Hinc forte est, quod intestina fetus: aliquanto longiora sint *D. de Marchettis p. 55. Hirschel de diff. fet. n. 13.* septies nempe superant corporis proprii longitudinem *Pess. ling. c. 8.*

dicoem (5) vermiformem, & alii (6) ultimam partem plenam habes stercore, quod a nigro colore, consistentia, tenacitate, & pinguitudine peculiari *μακρὸν* dixerat *L. papaverculum*, quae voce latinissimus Celsus usus est. Ex hoc phaenomeno certi concludimus, fetum jam tertio mense gestationis chylum digessim, & ex reliquis suoci nutritii confectis se facies, quae non abeunt in maternam alvum, & in apotheca propria reconduntur. Inde adeo plena faece, appendicula vermiformis fetum. Neque enim sphincter (7) ani exire sinit faeces, quem homo absque aeris adminiculo nequit superare. Eo vero temporis momento, quo fetus prima vice aerem adducit, eodem etiam alvum deponit. Quoties ergo in partu faeces egeruntur, certum est, fetum jam hausisse aerem, & in praesentissimam vias periculo versari. Nisi enim eo ipso tempore extrahatur, suffocatus est. In utero demum stercus nemo reperit.

Μύκον. Fetus totus turgescit mucosum. Namque, cavitas, & membrana, quam late patet, Schneideri, mucosus [8] undique replentur. *Salivum*. Adipos copiosa, fetui adhaeret, ut perpetuo deglutiat, juvenatura *χολοκίνησις*. Ita pancreaticum [-9] succum maxima copia fecerunt pro-

[5] Veteres solebant intestinum eacum (nempe appendicem), pro quadam a potheca meconii habere, hinc in seu pro portione grandius dixerunt esse *Parotus* p. 112. *Spi-gelius* l. c. c. 18. *Marchetti* p. 55. *Molinetti* p. 335. *Bartholin* p. 256. (8 cum tempore minui *Everard* p. 185.), facibusque repleri *Linden* p. 53. utroque succo *Molinetti* l. c. abusi illa nimia amplitudine cacci animalium. Res ipsa modice vera est. Paulo quidem majus est caecum, quam pro adulti corporis portione *Morg. op. XIV.* n. 39. video enim dimidio ileo aequale esse: absolute vero majus esse, recte negat *Riolanus* p. 387. Alia etiam directione, manifestissime continuatur directionem coli, atque ex eo conicum continuatur *Trevu. de diff. l. 77. 78.* Sed faecibus distentum nondum vidi. In caeco nullum meconium fuisse (nempe appendicula) *Har-vi* p. 185. *E. N. C. Dec. II. an. 4. obs. 115. Al. Baltb. 1699. p. 20.* Caeterum vide CIX. not. 1.

(6) In ileo flavum stercus *Marc. l. c. Tom. IV. Pars II.*

Barthol. l. c. Verum etiam viride genium meconium in ileo & caeco vidi, & *Drelincourt Pa-trob. 47.* In ventriculum demum nonnuquam ascendere, demonstrat meconii a partu vomitus *Mau-riceau obs. 300.*

(7) Reperio tamen passim, certe in animalibus, faeces alvi in amnion integram effusas. In subis *N. Stenonis* l. c. & in apris *Redi lettere Vol. V. p. 172.* In vitulo *Cl. VVeist. Comm. Nor. 1735. n. 1742.* In dama *Harvi* p. 218. In ove *Harvi* p. 241. *E. N. C. Dec. II. an. I. obs. 154 Graaf. p. 287.* In homine denique *Carpus* p. CCLVII. CCLXI. b. *Harvi* p. 198. *Potsche obs. anat. n. 9. & l. Bourgois II. p. 68.* Adeo manifestum videatur, non accuratissime eo tempore sphincterem officio suavi, neque plenam esse necessitatem respirationis.

(8) Omnisio, cumque recens natus ex ore naribusque efficit rubicundum, spumofum.

[9] Nam pancreas fetui majus est *Hirschol l. c. p. 36.*

A 2

ni probabile videtur. Cum enim in fetu glandulae mesentericae [10] multo, quam in adulto majores sint, & thymus [11] & mammae [12], quam seminae lactenti magis turguant; simili ratione majorubique glandularum [13] ad reliquum totum corpus ratio est. Hi humores omnes equidem puri generantur, sed in quiete & stagnatione faeces producunt; quae cum purgamentis liquoris amnii efficiant materiam meconii: huic demum copiosior [14] bilis colorem ex viridi fuscum conciliat.

§. DCLXXXIV.

Majoresque] Etiam sextuplo (1), pro reliqui corporis ratione.

Aggregati] Quo propior suae origini fetus est, eo magis renes (2) distinctis constant reniculis; quo maturior fetus est, eo magis conpinguntur in unam massam hi reniculi: EUSTACHIUS tamen etiam in adulto corpore, post macerationem, renem in duodecim corpora pyramidalia discepsit. Verum, si renes fetui & majores sunt, & laxiores, superest (3), ut plurimam perinde aquam fecernant.

Blau

(10) D. de Marchettis p. 56. & lacte plenae Harvii p. 186.

(11) Notissimum est, magnum, multilobum, lacte plenum esse Harvii exere. 55. CCLVII. not. 2. Sed fecerunt liquorem, quem seius ore resorbeat, non finit credere perfecta caecitas hujus glandulae, quae utcumque pressa, nulla directione, aut lacteum succum dimittit, aut prodit ductum excretorium.

(12) Observante etiam Harvii l. c. conf. DCLXXXVII.

(13) *Lister de humor.* p. 7. Fetus nervi maximi, vasa magna, & viscera, & glandulae, parvi musculi, & ossa parva. Illis semper eget, his nondum utitur.

(14) Ita etiam Trevvius, sed iners est, rubra, viscosa, bilis tota dissimilis Estmuller & VVideman. de corpul. nim. Collig. Amstel. p. 11. conf. CCCXXXII. a.

(1) Majores omnino reperio Hirschel de diff. fet. tum iuprimis capsulas renales, quod etiam Vastlingius vidit, & Everard. p. 165. & Muralt p. 426. & Couper T. 63.

& in E. N. C. Dec. I. ann. 6. obs. 202. & Morgagn. epist. XX. nu. 49. ut in ea aetate renibus paulo minores sint. conf. not. 11. ad CCCLXIV.

(2) not. 31. ad CCCLII. & Spigel. de form. fet. p. 21. Harvii p. 186. Marchett. p. 56. Moinsst. p. 136. Bidloo T. LXIII. l. 1. Everard. p. 165. Verheyen L. II. p. 378. T. 6. l. 2. Non solum adeo ad tertium menssem renes lobulosi sunt, ut Riolanus p. 410.

(3) An cerium? Magna quidem semper vesica in fetu est, teste Varolio p. 113. Spigelio l. c. & longior Hister comp. p. 112. & conica Bidloo l. c. & T. 62. & se ad umbilicum ascendit Hister ib. Trevv. Comm. 1737. bebd. 13. T. I. de diff. l. 47. non tamen ideo triplo major ventriculo, ut Varolius volebat, & Riolanus p. 410. & nunquam admodum distenta lotio. Vacuum vidi Hildanus Cent. II. obs. 59. Plenam urinam esse dicit in maturo fetu Everardus p. 167. sed iste humani non cadavere vix unquam vitio. Fetus

Blandae) Urina non olet (4) in sano fetu, non salsa est, neque amara, & oculo vix ullum dolorem infert instillata. Assiduo fecernitur eadem, nam pelvis semper humore plena est, semper madent papillae.

Respirationis) Nemo, etiam sanissimus, vel urinam absque nixu inspiratorio (5) excernere potest, vel liberare alvum: requiritur omnino nixus respirationis, ut laxetur urina, nisi partes solidae paralytis, aut morbus aliquis violaverit. Verum fetus quarto (5^a) jam mense urinam habet, & pergit fecernere quinque consequentibus mensibus, parce quidem, sed assiduo. Neque haec urina in amnion effluit: ea enim aqua, quae hac membrana continetur [6], eo parcius, quo partus fetus propior est, urina vero eo majori copia reperitur, quo fetus ad exclusionem

A a 2 magis

Fetus recens in lucem editus non continuo mingit *Bohn*. p. 31. & frequens est in illis homuncionibus urinae difficultas *E. N. C. Diss.* III. ar. 3. *obs.* 69. nodum fauci appetitis viis.

- [4] Certissimum est, & in renibus, & in vesica (*Dreline. Perocb.* 50. 51. *Aldes* p. 546.) fetus urinam naturaliter inspidam & inodoram esse, & lu recens nato blandam pariter & aequam reperiri *Lifter* p. 440. Per morbos aliquando faciet *la Motte* l. c. 24. In brutis animalibus liquor allantoideus pellucidus, subalbus, in cervæ ductis *Stemonis A. Hafs.* ann. II. *obs.* 217. inspidus *Aldes* p. 547. in vitulo dicitur reperiri, neque salis, quam amnii serum (*Peyer obs.* 31.) neque urinae similis *Courves* pag. 208. hinc in amnii locum succedere consuetum ejus liquore *Courves* credidit p. 147. & nutritium esse *Harverius & Rai* p. 95. Sed omnino falsum & urinosum esse *Hobokenus* testatur *secund. vit.* p. 69. 189. & *Kerboyn* L. II. p. 347. *Vicuff.* l. c. p. 22. & in aere turbari *Hoboken* p. 68. flavumque esse *Galen. de diff. vulv. c. ult.* Causa diversae historiae procul dubio in diversa aetate fetus est: Teneriori enim blandior urina, acrior in maturiori esse videtur *Needham* l. c. c. 3. 5. In eo liquorestant

coagula peculiaria, crassa, viscosa *Hoboken secund. vit.* l. 19. 20. 21. 37. p. 64. *anat. repet.* p. 474. *obs.* 31. *N. Stemonis l. c. Needham* c. 3.

- [5] Ita etiam *Cl. Hæb.* Sed demonstratum est, etiam scyphala aliquando in fetu expulsa fuisse *DCLXXXII.* not. 7. Urina in urethra constituta gelu, habetur apud *Cl. Bernhardi diff.* cit. n. 14. Et persuasus his rationibus *Cl. Noortwyck* credit, non repugnare, urinam in amnion exire, non repugnante sphinctere p. 197.
- (5^a) Quinto reperit *HALE*, sed etiam in teneriori adesse recte credit.
- (6) *DCLXXXI.* not. 11. In tenero vitulo liquor allantoideus paucior, quam amnii, uti *Galenus* viderat *de vulv. c. ult.* Mense primo humor amnii tres pintas habet, allantoideus *ebopinam* (nempe tertiam, puto, parte minus) *I. Sylvius*. In septimestri vituli liquoris amnii libras duas, in allantoide vero libras septem reperit *Faber in Hortens.* p. 613. In maturo vitulo amnii liquor ne viginti parti liquoris amnii aequalis, cum allantoideis lotium viginti librarum esset *Aldes* p. 546. & quadraginta librarum *Verboyn* l. c. Centuplo majorem in eborio (nempe allantoideae) copiam, quam in amnio esse, in ove vidit *HARVEI* p. 333.

magis accedit; & urina nunquam ad ignem cogitur, quod in fuoco ambii (7) succedere videmus.

Vesicam] Urachus (8) venit ex vesicae fundo, pergit ad umbilicum, & funi.

(7) Contraria vide not. 14. 23. ad DCLXXXII. Is allantoide evaporabilis Aldus p. 549.

(8) Urachus in brutis laevis, & tener canalis est, omnino cavus RUFUS p. 45. PEYER l. c. HOBOKEN *sec. vit.* p. 90. NEEDHAM c. 3. etiam urethraizator GALEN. *de util. part.* L. XV. c. 5. & aperitur etiam in vitulis *Amst.* p. 11. & in tauris adultis VVEFFER E. N. C. Dec. I. ann. 3. *obs.* 167. & arietibus IB. Is a fundo vesicae RUFUS L. I. p. 44. HOBOKEN *secund. vit.* l. 24. 25. GALEN. l. 1. & *de form. fet.* per funiculum umbilicalem HOBOKEN. l. 45. venit, investitur amnio HOBOKEN. *secund. vit.* p. 29. & in mediam fere, ID. l. 9. 13. longissimam ID. c. 3. super amnion expansam HOBOKEN. f. 9. 10. 13. cylindricam vesicam, sed inaequalem GRAAF p. 113. HOBOKEN. f. 10. 13. FABRIC. f. 30. annii satis similem, pauciflumis vasis praeditam HARDER *aplar. obs.* 8. (quae etiam FABRICIUS habet P. I. c. 8.) aut nullis, ut HOBOKENUS cap. 3. implantatur, HOBOKEN f. 13. 25. & GALEN. *de form. fas.* c. V. Hanc vesicam allantoideam vocant GAL. ib. & eo urachus urinam omnino advehit GAL. l. c. RUFUS l. c. Neque crediderim solidum urachum esse in canibus, ut EVERARDUS p. 165. aut damis, ut HARVEI p. 218. aut cuniculis, ut EVERARDUS l. c. & p. 62. GRAAF p. 284. aut in universum in monocorylesionibus, ut TAUVRY p. 114. cum HARVEIUS in ove solum & cervo pervium se invenisse dicat p. 378. Nam in canepulium invenit Carpus p. CCLX. & MOEBIUS *obs.* 13. & PEYER

exerc. p. 199. & nuper ipse in caecella duodecimo a paria die apertum reperi, idemque PEYER in scle, in cervo vero *Strenonis* l. c. & in tursione ipso *Bartholinus bist.* 25. Cent. II. & in avium pullis *Malspigh. de vutub.* p. 10. Uti vicissim cavos illex urachos humanos a I. Sylvio inflatos & praeparatos *catum. depuls.* p. 156. *Isagog.* p. 69. ad bruta animalia opinor merito relegari.

Sed in homine simile equidem aliquid urachio ex vesicae exit *Trevu Comm.* 1717. *bibb.* 13. T. I. *de differ.* f. 47. 70. ex vertice summum, *Trevu ib. Spigel. T. VII. Fabricius de form. fet.* f. 121. &c sed antcrius *VVeitbrecht syndesm.* p. 227. CCCLXVI. not. 2. idque cavum esse veteres crediderunt, & *Munnik* p. 87. aut certe destillare lente & guttatim aquam reformatam, ut *Ridley* l. c. p. 202. & *HALE* l. c. atque urinoso liquore semper turgere, quod *idem* repetit, uti fere *Fabricius* P. I. c. 7. aut quocunque modo urinam vehere, ut *Hobokenus anat. repet.* p. 470. aut urinam denique per gelatinam funiculi percolari, ut credebatur *Diemerbroeck* p. 221. Verum ego omnino continuum urachum sepeo, substantiae, qualis vesicae est *Lientaud.* p. 374. *Trevu de differ.* p. 104. & fibris fieri longitudinalibus & sursum in conicam naturam adtenuari *Fabricius* f. 123. *Spigel. T. 7.* 8. *Lieur.* p. 374. *Trevu de differ.* p. 104. *Sculze de vas. umbil.* p. 16. solitudinque esse. Ita *Carpus; Arantius* p. 31. *Pareus* p. 109. *Pavv. obs.* l. 16. 3. *Arnsaunt* & *Hildanus Epist.* 45. 26. *Needham, Riolaus* p. 379. *Faber apud Hernandez* p. 616. *Bartholinus bist.* 14. Cent. I.

& funiculum [9], inde deferit vasa reliqua, & centrum petit placenta-

tac,

Cent. I. biff. 25. Cent. III. Molinetti
p. 334. *Salzmannus* scuior cassim.
D. de Marchett. p. 52. & apud
Rai. Phil. trans. abr. IV. p. 7.
VVagner alt. mar. Balb. 1699.
p. 29. *Bartholinus anat. renov.*
p. 320. *E. N. C. Dec. II. ann. 7.*
obs. 204. Maugett. theatr. II. p. 57.
98. VVeibrecht l. c. ut etiam mer-
curium ex vesica impulsu refu-
tes Cl. Hebenstreit progr. ad anat.
mul. aut aquam, etiam ligato pe-
ne Corpus l. c. Cl. Bartholin. L. I.
c. 36. Harvei p. 186. la Courvois
p. 33. I. von Horne p. 139. Mau-
riceau p. 129. Gayant ib. 218. &
E. N. C. Dec. I. ann. 6. obs. 302.
Lien. l. c. & Ruysch. toics ex
perius apud Verbeeyen L. II. p. 349.
& Tbes. VI. n. 83. Vesicam omni-
no ligamentis modo sustentat Pevv.
l. c. Arant. l. c. I. van Mekren
c. 7. poss. obs. D. de Marchett. l. c.
Junker tab. phys. p. 154. VVeit-
brecht syndesm. p. 127. & pro
puncto fixo fibrarum vesicae est
ID. Semel tamen papillam, quae
in cavitate vesicae adhaecioni ura-
chi responderet, dictam Ridleyo &
Trevvio f. 48. p. 108. & quae
solet facta esse & caeca Trevv.
l. c. p. 104. cavam reperi, uti
Ridley l. c. medium nempe ura-
chum in receptaculum cavum,
pene avellanae capax dilatari, ita
tamen, ut ea cavitas cis umbili-
cuni desineret, ut Ruyschius vidit
l. c. & Covuper l. c. & Saviard.
obs. 97. Ita etiam ad umbilicum
ulque pervium urachum reprae-
sentat HALE, TAUVRY p. 116. Bour-
don p. 133. (semel). Saviard l. c.
Bianchi de gener. p. 37. (pro re
vulgari), Covuper T. LIX. Hei-
ser E. N. C. Cent. IV. obs. 194.
& ad digitum transversum longitudi-
nem Moebius l. c. obs. 2. Ruysch.
Tbes. IV. p. 30. Tbes. V. n. 57.
Tbes. VIII. n. 56. Cl. Heiseker de

gener. negot. p. 27. Molinetti. p. 117.
Trevv Comm. lit. 1711. ff. 26. &
scere similia vidit Peyer de ura-
cho, & olim A. Laurentius L. VIII.
Quaest. 17. sed, vercor, ex con-
jectura.
(9) In funiculo urachum recensuerunt
Rafus l. c. Galenus de diff. vulv.
c. ult. Ibroghibus L. V. cap. 19.
Riolanus p. 377. & aliqui allan-
toidae defensores, ut Highmor
p. 114. Collins p. 636. & Hart-
soeker Suite des conj. phys. p. 124.
& la Motte p. 257. qui addit bre-
viori inter vasa aequum esse
observ. 211. & Littré Mem. de
l'Acad. 1701. p. 116. Canalis etiam
flava materies plenus, a vena &
arteris diversus Muralt Coll. anat.
p. 686. huc videtur revocari de-
bere. Sed praeter istos viros, in
praeparatione sua accuratissimus
Albinus aliquid nervuli simile vi-
dit, sub involuero umbilici, ad
placentam usque continuum Neu-
sville de allan. p. 43. Addit Pe-
yerus, se in uracho ostium vi-
disse, quod ad aliquot ab umbili-
co uncias adminiteret seram obs. 4.
quae sola, ni fallor, aperti supra
umbilicum urachi est observatio.
Verum ante me Car. Stephanus
p. 297. Pareus p. 109. Arantius
p. 18. Drolincourt de uracho n. L.
Hoboken. anat. rep. p. 239. 344.
anat. prior. p. 43. Gayant l. c.
Needham c. VII. l. v. Horne mi-
crosc. p. 139. Hon. Fabri de ho-
mine p. 181. Bartholinus p. 320.
Ruysch. apud Erndl. p. 86. Sa-
viard. l. c. Manninham p. 6. Trevv
de diff. p. 105. Noortvuyck p. 24.
Roubaüt 1714. p. 414. urachum
in funiculo non potuerunt reperi-
re: ipseque Graafius, cum allan-
toidem adminiteret, pingeretque,
nullam tamen ab ea ad vesicam
viam esse fateretur p. 185. & simi-
lis est allantoidem adfirmantis
MANZ

MANGETI confessio. Ego quidem seculum supra umbilicum progressum, attenuari, findi, ut *Fabricius* l. c. *Riolanus* p. 378. & membranescere vidi, & in tunica alterutrius arteriae quasi amitti, *Spigelius* etiam teste l. c. p. 7. & *ROUHAULT* off. p. 39. & *Hobokeno anat. repet.* p. 251. & *Backio de corde* p. 47. *Albini* de muca urachum demonstrat. Cl. *Noortwyck* potius unum vasorum umbilicalium esse. Deinde nervulus ille urachi similis *Hobokeni anat. repet.* p. 344. aut albicantia corpora *Verheyeni* L. II. p. 244 ad septa pertinent, quae funiculum distinguunt *Noortwyck* p. 22.

(10) Hanc allantoidem plerique anatomicorum receperunt. Alii quidem simpliciter brutinam fabricam ad hominem transfulerunt, ut peculiariter, & topicam, neque circumfusam seu cavam membranam hoc nomine acciperent, in quam urachus urinam adduceret, & effunderet. Ita *Galenus de util. par.* L. XV. c. 4. de diff. vulv. c. 10. *Theophrastus* L. V. c. 19. I. *Sylvius Asae.* p. 69. *Vesalius* p. 674 pro fabrica non perpetua, *Spigelius* p. 5 (cum frigidissimis rationibus.) *Higbinius* p. 212. & *Mangerus*, qui adfirmat saepe se vidisse, & aquam continere ab amnio aqua diversam l. c. hucque refero reniformem illam sub amnio allantoideam *Graessii* p. 300. etsi alibi mediam fetus membranam velle videatur p. 285. Sed & *Munichius* credit se demonstrasse, in quadrimestri seu, allantoideam p. 86. non ibi facillime intellexit. Plures scriptores membranam mediam pro allantoidea recensuerunt, ut C. *Gemma* ic. 2. p. 24. *Needham*, *Collins* p. 636. *Hoboken. anat. rep.* p. 434. *Fantonus*, *Beddoe*, *Lister* *Mem. de*

Facad. 1701. p. 115. 1702. off. 8. & urinam inter eam & chorion effundi crediderunt *Fantonus*, *Dienmarbroeck* p. 215. &c. Alii vero inter chorion & amnion (in loco a placenta libero) *Fallopium* off. p. 206. & ex eo, ut solet, *Vidur*, & *Vesalius* p. 674. pro una fabricarum possibilium, & *Plater* p. 163. & *Taurey* p. 117. aut inter mediam & amnion, ut *Lister* l. c.

Qui ex brutis allantoideam receperunt, facile resutantur viso ovo hominis integro. Ergo allantoideam istam resutant *Eustachius de off. exam.* p. 204. *Aranthus* p. 26. *Narolius* p. 113. *Riolanus* p. 367. *Fabricius* P. I. c. 1. P. II. c. 5. (sed is male etiam bovi, equo, porco, cani, feli, denegavit), *Harwei* p. 284. qui & ipse etiam in brutis negare videtur p. 278. tum *Everard* p. 184. & *Heister* E. N. C. Cent. 2. off. 150. (contra quos vide *Nerdbamum* c. 3.) & *Faber* p. 613. & D. de *Marchett.* p. 54. & *Bartolinus* uterque, & *Dreincourt* de chorio n. 24. 25. & *Verheyen* L. II. p. 338. & *Bohn* p. 23. & *Rau* apud *Valent.* II. p. 95. & *Raysb. Thef.* IV. n. 30. & *Mauriceau* p. 28. & *Estmuller* de excof. secund. p. 7. & *Borger* p. 475. & *Pascali* L. III. p. 86. & *Pesteb.* diff. cit. & *Heister* comp. p. 170. & *Noortwyck* p. 22. & *Moroo* *Edimb. soc.* II. p. 219. & *Treuv. de diff.* p. 105. & *Histeb.* l. c. Istis autem, urinam inter amnion & chorion admittentes, facile redarguit valida, quae passim reperitur, mediae membranae cohaesio cum chorion, cellulosaque interspersa Haerles observante, & *Moroo* l. c. & Cl. *Noortwyck* p. 22. & amnii pariter chorionique (f. mediae) accuratus coactus *Varol.* l. c. *Harwei*

deae, apothecae locii, quam solus Britannus Cl. HALE [11] bene [12] descri-

vit p. 184. *Roubaux* 1715. p. 136. atque contigitas *Bobu*. p. 23. *Hobok. secund. vitul.* S. II. c. 3. *Enflach.* l. c. Nullam etiam aut in chorio, aut inter amnion & chorion aquam reperit *Faber* p. 615. *Hoboken anat. prior.* p. 38. & olim *Arantius* p. 28. & *Dralincourt de chorio* n. 24. 25. Ipseque contra hypothelin *Diemerbroeck* p. 184. (11) Sed Cl. HALE verae vesicae, peculiaris, ovalis f. 3. 2. 1. in *Phil. trans. abridg.* IV. P. II. p. 27. seqq. perobscuram & iconem dedit & descriptionem. Dicit amnio tenebriorem esse, tegete tantum partem factus, quae chorion respicit, & poni inter eam partem amnii choricae, quae placenta respicit, angustioris vero esse placenta, (in iconibus, ut tamen in descriptione ajat eam ad oram placenta usque separari posse). Porro cervicem quidem sua placenta contingere vult, opposito vertice scutum abique medio corpore urgere f. I. H. Cum amnio ad duas tertias sub vertice conjungi E. cervicem vero urachum admittere f. a. qui, a funiculi ad urachum conjunctione, non per amnion, sed sub amnio, recto longo itinere f. 2. ad cervicem adrepat. Addit, in tenero abortu allantoideam ovalem se reperisse f. 3. quae distinctam ab amnio vesicam faceret, & similem adducit *Tysoni* observationem. Sed etiam *Kelius* allantoideam Hales apud auctorem vidit p. 213. 214. Pro allantoide etiam sentit, sed modelle *Cheselden anat.* p. 281. Cl. *Albinus* denique, sed in tectissimo fetu 7. septimanarum, invenit vasculum, quod potest pro uracho haberi, insertum in propria vesicula ovalem, majorem urinaria, parum distantem a funiculo, inde sinistrorsum la-

tescentem, ab amnio separatam, inter eam & chorion positam, liberam undique, & continuis scitum firmulaque membrana. Ita *Noortwyck* p. 202. qui praeparatam vidit, tum doctiss. *Boehmianus de situ uteri* p. 4. & *Newville de Allant.* p. 43.

(12) Satis demonstrat Cl. *Noortwyck*, quam parum vel sibi conflet, vel nobis profit Cl. HALE. Enormis certe urachus in f. 1. 2. toties major ateriis, omnem fidem superat, & repugnat descriptioni, ubi urachum aeu textoria non majorem facit. Deinde non satis repetitas observationes habet, sed imprimis unam, in gemellorum factam secundis, uti loculenta est suspicio Cl. *Noortwyck*, inter amnion & mesiam flum in pulsum fuisse: cum aliquando inter has membranas sub placenta, facile, per ipsam macerationem vesicae nascantur p. 189. subeunte in cellulosa tali humore. Ita dudum peculiarem chorii aquam *Harveius* adgaovit p. 283. tum *Rolfink de fetu fusc.* & *Stabl.* p. 514. 515. & *Diemerbroeck* in tenero ovo amnion a chorio separabilem reperit p. 183. *Ruysschius* vero inter duas chorii lamellas subinde aquas intercipi *Tbif.* X. n. 155. *Tbif.* V. c. 57. Et *Bobus* primis mensibus, decimaque septimana in proprio experimento inter chorion & amnion intervallum reperit p. 23. ibique aquam *Schurig syllopf.* f. 105. Inter mediam porro & amnion gelatinam vidit *Lutro* 1701. p. 210. *Roubaux* 1714. p. 165. & inter duas laminae amnii *Berkhaart de circ. fet.* n. 6. quod eodem redit. Denique, inter amnion, ad funiculum adfurgentem & placenta, intercedo aliquando est trium digitorum *Hoboken anat. repet.* p. 220.

descripfit, veteres autem ex brutis fere tradiderunt. In eam nunc cavitatem lotium suum infundit, quod ad marrem redire videtur, neque enim fere acre est. Adtrecta vesicam, videbis urinam in urachum subire. Confirmat hoc urinae iter SCHENKIUS (13.), duabus, quas adfert, observationi-

p. 222. Adeo multae causae sunt ampullarum, quae possunt abincauto pro allantoide haberi. Cl. vero *Albini* observatio necdum satis repetita, & in tenerissimo corpore, & principe demum circumstantia constituta est, certa nempe urachi in allantoidem insertionem, quae demum, cum continuati ex vesica pervii uachi demonstratio ne, possit allantoideam extradubium ponere.

- (13) Ex FERVELIO quidem „adulto urinam afflatur, quasi miogeni, per umbilicum fluxisse *Sebenk. obs. l. III. c. de ur. p. 508.* Sed multae huiusmodi historiae passim habentur, & collegit *Hale l. c.* In fetu ad quartum diem urina per umbilicum E. N. C. *Cent. VIII. obs. 35.* Duodecimo die urachum in catella apertum vidi, quod jam monui. Hydropicus sanatus urina ex umbilico erumpente *Boni-venius c. 12. Marc. Donatus p. m. 425. & Hildanus Cent. I. obs. 47. Cent. VI. obs. 58.* Urina prope umbilicum in adulto exiens, quam & ipse pro fistula urachi habet *Idem Cent. VI. obs. 58.* Ex umbilico urina in parturiente *Slevogst apud Cl. Hilscher de gener. negot. p. 18.* Per venam umbilicalem aliquando exit aqua hydropicorum *Norol. p. 106. & Dan. Horstius apud Moebium p. 321.* Io ancilla ex umbilico ad quatuor pollices producta urina *Cabrolus p. 100* cum urethra obstruenda esset. In hydropica urachus apertus *Moebius phys. p. 361.* Io ischuria urina per umbilicum E. N. C. *Dec. I. ann. 3. obs. 208.* In adulto urina per umbilicum SIG. KOENIG. In puero decem aonorum urina infra umbilicum exiit, argumento

urachum pervium fuisse HIGH-MORUS p. 115. Minguentium per umbilicum exempla habet D. de MARCHETTIIS p. 13. In uracho viri areolae HARDER *opiar. n. 49.* Puer per umbilicum mingens YONGE *Phil. trans. p. 100. n. 323.* & alius duodecim annorum LITRE *mem. de l'Acad. 1701. p. 117.* uracho manifeste aperto, tum trigemarius alius IB. Urachus per quinque transversos digitos apertus in juvene octodecim annorum, & in urethra calculus IDEM. Io quatuordecim aonorum puero urachus pervius *Verdrius E. N. C. Cent. VI. obs. 14.* In adulto Cl. ALBINUS urachum per duos pollices apertum, & aquam ex vesica admittentem vidit apud *Neufville p. 19.* Hominis, qui per umbilicum, & alterius, qui sub umbilico urinam ederit, exempla habet CHESELDEN p. 281. Haemorrhagia cum urinae odore ex umbilico *bist. de l'Acad. 1727. n. 1.*

Verum dudum observavit DIERMBROECK p. 266. haec exempla non id demonstrare plerumque, quod putatur. Nam aqua hydropica etiam passim per ipsam integram cutem sudat, & facilius omnino per debiliorem sedem umbilici sibi viam facit. Deinde potest ulcus vesicae urinam sub umbilico emittere, possunt ureteres praeter vulgarem naturae ordinem ibi cuti inserti fuisse. Ita certe io tumore spongioso ad umbilicum vidit STALPART *Cent. II. obs. 32.* & huc forte pertinent exempla *Boislavienum 1726. M. nov. & Edinburgensium Vol. III. p. 276. & Phil. trans. nu. 464.* & atretae BARTHOLINIANAE *bist. 65.*

tionibus. Homini adulto abscessus est casu umbilicus, huic ab eo tempore per umbilicum locum exiit omne, & urethram neglexit. Alius homo vesicae vitio urinam excernere non poterat, ergo natus est tumor circa umbilicum, eoque rupto, per reliquam vitam urina per eam viam perpetuo effluxit omnis.

Copiosior) Quando in partu haec allantoidis aqua effluit, solent vocare aquas posteriores (14). Nempe chorio & amnio ruptis exit aqua amnii.

hist. 65. Cent. I. quibus omnibus per spongiosam carnem utina, vel in umbilico erupit, vel proxime. Adultorum denique rara exempla, quibus urachus apertus fuit, pertinent ad eas, quas ex feudus excitavi, cavi urachi historias. Facile eoim crediderim, in homine eerte, urachum, semel apertum, tamquam aliqua vesicae appendix esset, porro apertum manere.

(14) *Harvicius* vidit, in media gravitate aquas erupisse, absque noxa, deinde geminas in partu aquas p. 293. Has etiam *Ruysebius* vidit *Thef. X. n. 155.* & vocari *ovula VVasser* auctor est *Histebus de impedim. partus p. 11.* raras autem esse oportet, cum neget dari la *Motte* *obs. 147.* Porro post aquarum multam eruptionem felix partus successit *Mauriceau obs. 213.* & secunda vice aquae rupiae ante partum quique diebus la *Motte* *obs. 57.* & sex ante partum diebus *Mauriceau obs. 240. 402.* & septem *obs. 620.* & novem diebus ante partum *obs. 652.* *Peeblin cent. I. obs. 29.* & quatuordecim *Maur. obs. 40.* & mense *Gaucy* ex versione *Hysmanni p. 103.* & *Mauriceau obs. 361.* pro frequente, tum *obs. post. 37. 85. 94.* la *Motte obs. 305.* Quatuor, & quinque & sex septimanis *Cramer. Comm. Nor. 1732. heb. 36.* & sex septimanis, ad novem pintas *Mauriceau obs. 19. 148.* & duobus ante partum mensibus *Peeblin l. c. & E. N. C. Dec. II. ann. 2.*

Tom. IV. Pars II.

obs. 100. Mauriceau obs. 188. & longe maturius *ID. obs. 60.* & repetitis vicibus la *Motte obs. 307.* & tertio mente ad duas tredecim libras *SALMUTH Cent. II. obs. 59.* & secundo conceptus mense *Maurie. obs. 219.* Vide *TILING de placent. p. 120.* Priores ergo illas aquas solent referre ad liquorum allantoideae, cum absque aquis amnii fetum sanum, & tutum vivere posse non videatur. Verum haec aqua saepe ab hydrope uteri fuit *Mauriceau p. 178.* quod ipsa novem pintarum copia demonstrat, multo maior ullo liquoris humani fetus. Alias peculiaris hydatidis, aut deoque aqua minus naturaliter inter membranas collecta, conspiciente *CRAMERO l. c. pari,* ut in hydrocele, ultio possit contineri, & inviolata profluere amnio. Veras autem aquas fuisse, quae per rimam membranarum effluerint, ut *Mauriceau p. 178. obs. 361.* & *post. 94.* aut reliquias prioris fetus, ut *Struven de secund. p. 66.* vix crediderim. In priori hypothesisi fetum sanum manere difficile est, posterioriora mala nimis rara sunt.

Sed quid denum sit de utrina fetus? an remittitur ad matrem, ut **MAUROCORDATUS**? cuius bruta pleraque conceptaculum urinae nata sunt, homo nullum? Paucam nasci crediderim, cum amplae & liberrimae umbilicales arteriae sanguinem aortae descenderis pene omnem usurpent. Videretur etiam fetus aliquid hic posse,

B b quem

amni, & relaxat viam pro transituro infante, qui facillimo partu edetur, si continuo hanc aquam infans secutus fuerit: quando vero aliquot horis post ruptas aquas fetus sequitur, tunc via sicca fit, & partus difficilis. Verum in hoc casu saepe subsidio venit alia aqua, quam secundam vocant. Ea ex allantoidea membrana est,

§. DCLXXXV.

Aufsa) Faeces etiam in adulto absque ullo tenesmo paulatim in crassa intestina conferviuntur. Verum in sano homine faeces crassae & putridae reperiuntur, in intestino recto, & colo, & caeco: in ileo nullae unquam inveniuntur. Nunc in fetu, si tanta saecum copia congesta fuerit, ut crassa intestina amplius distendi recusent, neque adeo faeces in ea apotheca recondi queant, tunc ipsum ileon intestinum (1) distendi incipiet, & faeces non ultra retineri poterunt. Tormina enim nascuntur, quando ileon subeunt, neque enim huius intestini sensibilitas crassum aliquod corpus ferre potest. Sed neque fetus faecibus se liberare potest prius, quam respiravit. 2. Urina, distenta prius fetus vesica, vix potest tota in allantoideam membranam deponi, neque tamen emingi potest: hic alter stimulus est. Ex hac nunc recti intestini, & vesicae conjuncta irritatione, oritur in adulto homine ineluctabilis convulsio; sed etiam in fetu non poterit non magna molestia nasci. Accedit forte alia aliqua causa (2)

huc

quem fetus humanus ab arterioso viro patitur, multo major calore uteri membranacei, & pene exsanguis brutorum. Ergo de pauca illa urina & aqua, quae in vesicam descendit, pars major forte reorbetur per venas bibulas vesicae not. 4. ad CCCLXXXV. in fetu procul dubio patentes. In summa necessitate non negaverim infans in amnion elabi, sed raro crediderim fieri, cum vesica fetus nunquam distenta reperiatur.

[1] DCLXXXIII. not. 3.

[2] Partus naturalis causa varie propo-
sita est. Mecopium, tormina faciens, hinc fetum magis nitentem *Drelincourt* habet *Periob.* 10. & *Fabricius* l. c. P. II. c. 9. Alii caput inversum & praependerans ut *Hippocrates* *resp. arth.* quatuor

n. 37. *Parolinus* p. 114. *Bergerus* p. 493. & alii sed vide not. 11. Alii addunt his causis defectum respirationis, ut *Fabricius* l. c. *Bobn.* p. 36. vide not. 3. aut alimenti penuriam *Hipp.* *resp. arth.* p. 40. num. 40. continuo iam amni liquore *Harvei* p. 364. aut intolerantiam caloris *Drelinbrosch* p. 243. *VENETTE*, aut tedium alimentii *VOGLI* l. c. Alii pondus fetus auctum, ut *Fabricius*, (praeter priores causas), & magis magisque detrahens placenta nexumque cum matre dissolvens *Harvei* p. 241. *Vogli* II. p. 181. Hanc sententiam *Drelincourtius* resutat, & negat chorion a pondere fetus trahi, & argumento esse, quod rursus placenta ante fetum excludatur *Per.* 35. 37. & addi potest inferiorem fundum

huc disposita a creatore, quae fetum urgeat ad aerem capiendum, neque hactenus explicata est. Videtur sanguis plus indigere aeris ad digestionem suam, hinc circulationem sanguinis magis impeditam esse. Haec tertia causarum est partus (3), quae ad fetum pertinent. Experimentum

B 2

fundum uteri placentam sustentare. Alii acculant convulsionem uteri, a nervis sub finem graviditatis magis, quam prius tensis, irritatisque ex tractione radicum vasorum placentae, tum a circulatione inter matrem fetumque magis impedita, ut ROUHAULT *observ.* VI. p. 94. &c. MAZINUS denique, perfecte contra novissimam anatonem, mutationi uteri a sphaera breviori in sphaeroides longius nuncque capax tribuit *diff. 7. de respir. fet.*

Prima causa irritans procul dubio in ipso fetu est. Nam, etiam in aliis animalibus, fetus suo proprio conato, in quadrupedibus aliquando HARVEI p. 265. semper in avibus p. 266. &c. viperis p. 267. atque insectis ib. ovum rumpit, &c. paritur ID. p. 71 72. MONROO *Edimb.* II. pag. 214. LANGLEY p. 252. II. Molestia vero fetui perpetuo augetur, tum ex saecibus, tum ex ipsa loci angustia, &c. aquarum decremento, ex quo frequentior oritur ad uterum adstrictus ex ipsa sensibilitate incommodi, quae cum perfectione cerebri incrementa caput. Hiac exempla fetuum vivorum a morte matris editorum E. N. C. *Dec.* III. *ann.* 4. *obs.* 83. 175. RIOLAN. p. 398. *conf.* DCLXIII. aut ex uteri immobilitis prolapsu I. c. &c. E. N. C. *Dec.* II. *ann.* IX. *obs.* 149. SAVIARD *obs.* p. 83. Deinde illi, procul dubio accedit uteri irritatio a fetu magis inquieto, graviore, robustiori, paucioribus aquis cincto. Videatur enim utero *simis* aliquis crescenti fetus esse, &c. dilatationem, in quam supra enim terminum in crescentis fetus nititur, cum ma-

gis incommodo matris fieri. Haec nunc irritatio, primo constrictionem uteri efficit DCLXIV. not. 3. quam non excludo, &c. sentio cum HARVEIO I. c. RIOLANO p. 403. BERGERO p. 493. STAHLIO p. 34. Sed iste paucis nimis tribuit utero: tum NENTERUS p. 435. &c. hujus sectae alii. Proxima denique causa efficiens est inspiratio matris enormiter aucta, qua se ab onere intolerabili vindicat. Hujus robur hic praecipuum est, cum quotidie mortuos fetus elidi videamus, &c. instinctu caeco fetus parum omnino se adjuvare queat, neque unquam partus naturalis edatur, nisi ex summo nixu. Recte tres causas conjungit VERHEYEN II. p. 384. Ideo HARVEIUS subtiliter, quando parvus a fetu expectatur, caput extrahi debere, quando ab utero, praeflare pedibus educere p. 267.

(3) Non ignoto VESALII &c. PLATERII alibi citata exempla hiancium in aquis fetuum. Sed eam potius ad desiderium soliti cibi refero, nempe liquoris amnii DCLXXXII. confer quae dicuntur ad DCXC. Unde enim miseris ignotae locis tam dira cupido! Experimentum facile est. Calcitrant, matri incommodi, a secundo usque mense. Sed motus edunt perpetuo validiores, &c. non aliquo confilio, aut determinato tempore pariri volunt. Verum certo denum mense potius, quam prioribus mensibus, efficaciter matrem ad partum stimulant, quia tunc motu & pondus fetus eam propriam ad tolerantiam matricisationem habent, ut ulterius nequeant ferri.

rimento vero constat fetum in aquis mediis, extensis manibus & pedibus ad ranae modum se movere. Hic motus manifestissime percipitur, sed inprimis in feminis tenerioribus, minus obelis. VESALIUS Bononiae, Patavii, & Pidis experimenta fecit [4], exemit ex vivo bruto, v. gr. ex porca uterum una cum fetibus, integrum in mensa anatomica explicavit, ita vidit animalcula miris modis se movere, & nixus edere, quos nemo a tantillis bestiolis expectasset. Dissecabat uterum & amnion, continuo respirabant omnia. Res adeo vera est, etsi causa paulum recondita est, CICERO ad MILONEM de lege se ipsum auctori dicit, eam nos non edoctos esse, sed ab ipsa natura hausisse.

Uteri) Uterus mulieris, neque gravidæ, neque menstruatæ, figura turbinata est, & cavitatis figura obtuse conica (5). In eo statu uterus non multum distat a vaginae (6) initio, sive a pudendis externis. Quando vero mulier utero concepit, ascendit continuo uterus (7), & remouetur a pudendi externo orificio. Hoc primum signum est fausti conceptus. Causa mutatae figurae ovum est, quod in uterum descendit, & majus nunc, quam ovi cavitatis, eum distendit, ut sphaericus fiat. Novimus enim omnem membranam a qualicunque fluido aequaliter undique distentam, sphaericam fieri. Utero nunc eam figuram adeptæ, etiam os uteri mutationem uteri sequitur, & planius fit, ut nempe in sphaerae superficie jacere possit, neque periæ in vaginam prominet. Quo diutius vero uterus increfcit, eo altius ascendit, quia pelvis angustior est, quam sphaera uteri gravidæ, ut ea in pelvi locum non inveniat, sed cogatur ascendere in abdomen, ut superior ipso umbilico fiat.

Vertice) Fetus, quando unicus in utero gestatur, & placenta fundo uteri adscendit, ut plerumque fieri solet (8), sedet in utero pedibus deorsum positus, calcaneo nates feriente (9), genibus ori admotis, spina

(4) p. 324. ed. 1555.

(5) DCLXIII.

(6) DCLXXV. not. 13.

(7) In minus resiliens abdomen. & magis inter tubas dilatarur, quia ibi sinus copiosiores. Maturo fetu praegnantis uterus totum pene abdomen occupat, vide icones SPILGELII de form. fœt. T. I. ubi nimis regularis pingitur, & BIDLOI T. 54. communicatam a I. B. LAMZVERDE *bijl. molar.* p. 323. & uterus gravidus diaphragma in thoracem urget DE-SNOVES *lectures* p. 32.

(8) DCLXXVI. not. 9.

(9) Hic situs est, in quo plerumque fetus mortui reperiuntur, & quem pene omnes anatomici describunt. ARISTOTELES *bijl. molar.* L. VII. c. 3. HIPPOCRATES de natura pueri C. Strophand L. III. c. 5. Columbus p. 252. [montamen pro frequentiori]. Arantius p. 33. Fabricius P. II. c. 9. Harvey p. 257. Mauriceau p. 233. Bidloo T. 65. Dionis *des accouch.* p. 128. Deventer f. 6. Monro, Norwicheyck, T. II. Causa est in ipso musculorum praevalente robore flexis nempe paribus pect

spina dorsii incurvata, manibus ori adpositis, quasi fugeret. Præmis nunc gestationis mensibus mater hunc fetus situm absque molestia fert, & fetus frontem umbilico matris obponit, genua pectini. Sed caput fetus multo magis crescit, quam partes reliquæ, atque adeo centrum gravitatis non in umbilico est, verum multo superius. Nam in recens edito fetu caput fete tertia (10) pars corporis est, in fetu vero secundii mensis, fere dimidium. Verum etiam pulmo collapsus gravis est. Denique fetus in liberis aquis suspenditur mobilis. Ocyus [15] ergo aut serius, caput pondere suo abreptum cadit, & fetus totus invertitur,

ut

pene omnibus, quod fere ubique flexores exterioribus robustiores sint. Non ideo perpetuus est, ne in cadavere quidem. Quinto enim mense fetum transversum vidit la Motte obs. 55. & duos pingit Fabricius l. 6. §. 8. & citat etiam sibi visum C. Bauhinus app. ad Roussel. Columbis denique, sed rarissime, transversum caput, raso sursum, elatum, plerumque deorsum positum reperit p. 253. Multo minus in vivo certa lex est, in quo calcitratio perpetua, etiam tangenti manus demonstrat, caput modo supra, modo infra, modo propius pedibus esse, modo remotius. Vide contra definitum fetus situm. Riolaan p. 367. Couper ad T. 53. Drake L. I. c. 24. de la Motte obs. L. I. c. 23. L. III. c. ult. Noortwyck p. 127. In ipso pullo pariter incertus est Maitreian, p. 138.

- [10] Salzman de diff. fet. n. 4. In primordiis fetus caput corpore majus Harvey p. 56. In fetu pollicis magnitudine caput corpori æquale Venette p. 266. In bimestri abortu caput thoracis, & ventre majus Faber apud Hornandem p. 651. Crescendo fetus, etiam gallinaceus elongatur Maitreian p. 35.
- [11] Ita vulgo traditur, fetum citius septimo mense vel octavo, vel nono ineunte Dionis p. 188. capite præcipitem se in pelvem dare, ut facies, os sacrum, pedes umbilicum matris respiciat Arantius p. 35. etiam per experimenta p.

p. 33. Mauriceau p. 234. Manningham p. 10. Haister. Comp. p. 11. Vide iconem apud Spigelium T. 2. 3. Fabricium l. 7. & descriptionem in E. N. C. Dec. III. an. III. obs. 123. Et antiqui vulgo pro causa partus hunc situm adulerunt. Contra eos vero dixit Cheseldenius, & contra inversionem definitum tempore partum præcedentem la Motte L. I. c. 23. 61. 97. qui adseruit, etiam in partu incertum situm esse, non diffidente Mauriceau p. 234. & van Horne vvebmutter, p. 17. & D. Onysius in diss. maur. Leidæ habitæ an. 1743. Aliquando enim jam sexto mense fetus in eo situ reperitur PAVV. obs. 6. la Motte obs. 53. & citius Idem. obs. 55. & tertio demum Bianchi p. 69. f. 17. Cl. vero Onysius post C. Lumb. & Venette p. 275. ex 23 exemplis vigetibus & scriptis situm verticalem reperit, ut omnino non pro situ solum naturali ultimi temporis, sed ex considerato situ fetus pro penitus & perpetuo naturali habeat l. c. p. 22. Verum certum est, etiam ultimo mense caput fetus in venite materno tangi, & etiam paulo ante partum facillime diuoverit I. Siegmundin. p. 12. & in ipso partu p. 125. ut rarum sit, uno, ut Mauriceau p. 235. aut duribus integris mensibus fetum in eo situm fuisse, in quo caput in pelvim pendet L. Bourgeois l. p. 211.

ut faciem offi sacro (11*) obvertat, verticem uteri osculo. Id fit communiter octo, septem, sex septimanis ante partum, aliquando tamen tantum quindectim, aut paucioribus (12) diebus, prouti ferus tenerior fuerit, aut torosior. Una vero abdomen matris, quod hactenus superius tensum fuerat, nunc descendit (13) ad subsidentis sacci modum, atque inferius ad pubem prominet. Quando id factum est, tunc norunt mulieres, primum stadium ad partum esse. Eadem opera liberantur organa respirationis matris, & diaphragma, minus nunc conpressum incipit agere, & omnia viscera versus os pubis urget. Sed ibi haeret crassum pueri caput: idemque pedibus suis recalcitrat, vasaque prope os uteri ea ratione aliter premuntur, arctantur, effluit mucus (14), inter omnes mucus mucosissimus, ex vesiculis *Nabothi* (I. G. cryptis), qui totam viciniam ita inundat aliquot fere ante partum septimanis, ut lubricam viam pareat descensui fetui. Haec secunda periodus est (I. G. ab hoc enim muco defluente partum haud longe abesse vel feminae norunt [15].) Verum quo uterus plenior est, sphaeraeque propior, eo ascendit alius, & a vagina, cui in virgine proximus est, vix duobus remotus digitis discedit, inferius interim vix increvit, neque descendit. Nunc verb uterus omnino descendere cogitur, infans enim capite suo deorsum nititur, magis adeo distenditur uterus supra ostium suum, idemque explanatur, quod tertium est ante partum stadium. Nam os uteri non

(11*) Nempe partus naturalis est, quando fetus faciem offi sacro matris obvertit *Mauriceau* p. 206. *Verheyen* II. p. 388. Non ratissime tamen facies anteriora respicit, ut apud *Stegmündin*. p. 69. *Mauriceau* obs. 354. 391. 415. & p. 214. & ita natus est *Dux Andegavorum*, filius *Henrici IV. Lovis Bourgeois* II. p. 187. Sed praeter naturam tamen & difficultus in hoc situ paritur *Mauriceau* p. 208. & obs. 698. & la. *Mais* L. II. c. 8. & unavult *Chapman*. pedibus extrahere, si faciem eo modo praetuleris p. 32.

[12] Ita melius *Deventer* p. 55. & *Heister*. p. 216. paucis nempe ante partum diebus caput fetus in pelvim illabitur, & ab eo tempore mater vix unquam absque molestia degit. Aliquando paucis ante horis ut *van Elvoorn* l. c.

(13) *Deventer* l. c.

(14) DCLXXV. not. 6. maxime ex cryptis uteri, & vaginae sinulis DCLXIV. not. 12. tum, foris, ex lacunis uterinae distis ad DCLXV. not. 12. Glandulae vero sebaceae alarum, quas exciunt ex *Morgagno Praeceptor*, hic parum possunt, ceram enim frumentosam potius, quam mucum secerant, quae in plicis partum corporis humani ad dolorificum adstrictum impediendum necessaria est, a muco vero longe differt, solida tenacitate, indole inflammabili paucitate.

(15) Cont. MAURICEAU p. 212. Adit jam septimo mense os uteri mucosus reddi MAURICEAU c. 7. Etiam in brutis ante partum mucus densior defluit, ut in vaccis vidit *Alder* p. 547.

non rotundo, sed transverso (16) rictu hiat, oris humani simili, & intercepto inter convivia labra. Hujus oris labia nunc magis distenduntur (17), & divergunt, & apertura nascitur (18). Interim fetus agitur tenelms, quos diximus, & motus edit varios, quos ex VESALIO citavi, magis ergo uterum maternum deorsum promovet, & capite suo in angusta pelvi ita in os uteri nititur, ut capite tangat hinc urinae (19) vesicam, inde rectum intestinum. Ergo etiam matri tenelms nascuntur, & nixus ad lumbos, qui per musculos abdominales versus os pubis

[16] Id naturale est, & perpetuum. DCLXXV. not. 8.

(17) Sed distenta sub ultima praegnationis tempora cessante DCLXXV. not. 43. p. 219. necessario utrique retrahitur sursum os uteri, & hiat non quidem in utraque; sed in transversa tamen diametro augetur: & una, cum contra abdomen surgat, minus quicquam in vaginam prominet, quod idem vocant adparere brevius & planius Mauriceau c. 7. p. 93. 97 &c. Deventer c. 15. Hoorn vix mittit p. 25. & tenius Mauriceau ib. & pro bono signo habet Mauriceau obs. 446. Conf. Cl. Boeber. de situ uteri p. 19. Haec mutatio successive fit, & melius est, si sensim sensimque contigerit Siegmundin p. 194. Incipit secundo & tertio mense Deventer c. 16. quarto mense, & quanto Onymos p. 9. & eo tempore os uteri mollescere docet Mauriceau p. 93. Sexto & septimo mense hincere Deventer l. c. & post sextum mensem la Motte c. XI. octavo Aristoteles bist. anim. L. VII. c. 4. & Mauriceau p. 123. nono ineunte Hoorn p. 27. duobus ultimis mensibus Riolanus p. 365. Siegmundin. l. c. tuncque os altissimum, tenuissimum, planissimum fieri Hoorn p. 16. inde semper magis, ut ineunte nono mense etiam obsterices diversitatem percipiant I. Siegmundin p. 24. Duodecim diebus ante partum os uteri unciae latitudine apertum re-

perit Mauriceau obs. 155. & quindecim diebus digiti capax obs. 467. Tertia ante partum septimana ad unciam hiat vidit Ruysschius obs. 43. & ad tres digitos Mauriceau obs. 178. & post. 105. Viginti tribus diebus idem unciae latitudine obs. 166. & nersie ante partum digiti capax Mammigam p. 10. & pollicis Mauriceau obs. 2. Sexto demum septimo mense jam ad aurei magnitudinem aperti Deventer c. 16. & d. etiam consilium aliquando, quando jam aperti ceperat, Chapman. vidit case I. & Mauriceau p. 96. Alias ad partum usque clausum est, & a doloribus demum aperitur Siegmundin. p. 194. Addit Harveius, ostium parturienti molle esse, & molle manere, si aliquid intus in utero manserit p. 196.

[18] Non ideo continuo partus instat, si uteri osculum ad unciam hiauerit. Ita Mauriceau p. 214. & adparet ex not. 17. Id autem signum vix fallit, si successive uteri osculum se dilataverit Dionis des accouch. p. 230.

(19) Hinc ante partum semina urinam vix continet ARISTOTELES l. c. & inquir Mauriceau p. 218. 212. Dionis p. 158. 159. & accipere tamen urina se liberat Deventer p. 55. & vesica crassior fit, & minimi Cistria Mem. de l'Acad. 1708. p. 183. atque maxime prope urethram comprimitur Koch, de affe. vefic. variss. p. 7. Parsons.

pubis determinatur (20). Haec nunc est *obstetrix*, non verus dolor, laeae enim interrogavi, semper responderunt non dolorem esse, sed tenesimum. Is est intolerabilis conatus: qualem fere viri in se ipsis experiuntur, quando durissima, & maxima scybala conantur egerere: tantus certe aliquando, maxime in hypochondriacis, ut sanguinem ex natibus expreferit, aut ruptis demum valis apoplexiam produxerit. Hi tenesimi semper ad lumbos incipiunt, inde progrediuntur ad umbilicum, hinc ad os pubis, & muscoli abdominis ita indurefcunt, ut a ligno parum differant. Nam ubi ii muscoli oriuntur, qui nunc maxime convelluntur, ibi etiam dolor est. Haec ipsa nota, quod muscoli abdominis durefcant, dolores ad partum separat ab iliatis, & hystericiis doloribus. Sed hi muscoli oriuntur ab ossibus pubis, & ilium, & caput fetus etiam pergit urgere antrosum, uterus adeo truditur in pelvim, neque enim alius fetus exitus est. Superius enim, posterius, & inferius ossa resistunt. Porro convulsionibus eo magis augentur, quo magis uterus in angustam pelvim protruditur, dum tota sphaera sequi nequit. Hoc nunc stadium est, in quo *nativitas* nasci incipit, quam dicimus nasci, quando digitus obstetricis, vaginae inmissus, os uteri sentit explanari, & longiore fieri fissuram. Sed nunc quartum stadium sequitur, nixus increfcunt, os uteri dilatatur, & aqua amnii deorsum truditur, atque ante caput fetus pellicula tangitur, quae aquam (20*) continet. Hoc quintum stadium est. Quando vas plicabile aqua plenum, & corporibus in aqua natantibus solidis, urgetur undique, utique aqua cohibet, ubi minor resistentia opponitur, non ideo corpora, quae in aqua natant. Ergo ovi pressio omnis determinatur versus uteri rimam, & istud cogit prominere, atque labia adtenuat, quae ipsa tenuitas signum est.

signi vstris bladder p. 18. Aliquando ita valide vesica comprimitur, ut ischuria succedat E. N. C. vol. Dec. VI. *obsf.* 126 la *Motte obsf.* 49. 130. quae fetu digitis repulso solvitur. Inde vesica aliquando enosmiter dilatur, ut octo pintas cepert EDIMB. SOC. IV. p. 449. & novem ebopines, enorem certe molem 36. libratum, ni fallor, la *Motte obsf.* 51. Mortes ex hac retentione urinae vidit *Chapman improv. of midwifry* ca. se 40. Vicissim autem plena vesica resistit partui, & ab urgente capite fetus rumpi visa est *Parsons* p. 21. *Pinaeus* p. 95. la *Motte*

obsf. 49. Remedium est, si femina decubuerit, aut in majori malochirurgus digito uteri fundum repulerit *Dionis* l. c.

- [20] Ea nota *Stevogt de dolor. part. spur.* p. 8. & quod os uteri per hoxnux dilateretur *Siegmundin* p. 196. *Druxter* p. 60. van *Hoorne VVebsmutter* p. 35. 38. muculose alpa-reat, & aquae augeantur la *Motte* L. II. c. 12. dignoscuntur ab inutilibus illis doloribus, quos vocant *spuriis*, & os uteri obsterantur potius claudere *Druxter* l. c. *Hoorne* l. c. *Siegmundin* ib. & p. 5. (20*) Certum signum partus instantis est: ostium uteri dilatatum, & aquae

est instantis partus . Eminent interim saccus iste aqua plenus (21), & premitur extorsum versus os uteri, & pila aquis plena magis & magis increfcit, & digitis tangitur, hoc vocant *aquas formari*. Tunc porro nititur caput in locum, quem aquae fecerunt, augentur dolores, & uterus magis premitur, fic aqua amnii, tanquam veficam distenderet, & aequabiliter dilatat os uteri, & haec optima machina [21^a] naturae est, quam male lacerant (22) ignarae, & temerariae obftetrices: ita enim effluunt aquae, facculque concidit; quamdiu vero integer est, os uteri aequabiliter distenditur undique ab urgente liquido, absque dolore, quia omnes partes dilatandi osculi aequabiliter urgentur, atque adeo nulla violente premitur: rupto vero sacco a fetu ipso uterus inaequaliter comprimitur . Solidum enim omne inaequaliter premit, plus in una fede, minus in altera, pro figurae suae varietate, fic, dum una pars quiescit, altera totam vim nitentis solidi experitur . Haec certe artium pessima, multas matres, fetusque multos occidit, quamprimum nempe sentiunt rimam uteri se aperientis, rumpunt bullam, & aquas emittunt . Si nunc neque obftetrix nimis festinaverit, neque mater, caput fetus subit os uteri, & pelvis dilatat, tunc convulsa mater [22^a] edit nixum, majorem prioribus, tam validum, ut muscoli abdominis ad asseris modum durescant, & una plurimum aerem inspirat, diuque retinet, tandem summa compressione pectoris diaphragma deorsum in abdomen premit, ut ovum uno incidat inpetu . Hi nixus nunc non sequuntur, si ovi ruptura accelerata fuerit . Tunc enim fetus solo suo nixu proprii corporis os uteri dilatare debet . Vel etiam dum ovum fetu gravidum exsilit, & os uteri dilatat, eodem tempore rumpitur aqua, & cum fetu effluit, etiam id bonum est, malum autem, quando aqua diu ante partum effluit, & fetus per sicca [22^a] loca cogitur transire, & fetus figuratus debet transire specie solidi, qui prius sub fluidi specie transibat, neque membra fetus aequabiliter aut premunt, aut premuntur . Quem vero descripsi partus

hoc ostium eminentes *Mauriceau* p. 238. & molles membranae p. 213.

(21) A doloribus membranae repletac durescunt, remittente dolore mollescunt, ut caput tangas *J. Siegmundin* p. 27.

(21^a) HOORNE p. 48.

(22) MAURICEAU p. 241. nisi situs fetus contra naturam fuerit, aut membranae nimis fortes . Sed omnino vetat la MOTTE fere

in omni casu *obs.* 167. 37. & nihil metui, quamdiu aquae integritas adfuit ib. Male adeo lac erare jubet GOUEY, & huic partum quando pelvibus extrahitur fetus ab obftetrice, pro naturali habet p. 105.

(22^a) Signum partus certum tremor febrilis similis *Dionis* p. 104.

(22^a) Amnii liquor interfert utero absque dolore dissentio CYPRIAN. p. 47. & mucus naturalis omnibus oleosis

partus integri (23) ovi, is maxime naturalis est, tuncque amnion, chorion, & placenta, una prolabantur. Hujusmodi partum credibile est EVAE contigisse, idemque communis est tot gentibus Indis, quibus absque ulla arte obstetricia sanissime parere familiare (24) est. In eo casu ars non potest, nisi nocere. Proximus naturali, & vulgarissimus (24*), neque tamen perfecte naturalis partus est, quando in ipso ultimo nixu aqua exsilit, tunc autem duae membranae, & placenta in utero manent. In hoc genere partus oportet fetum quidem reponere, & involvere, ut respirare possit, & interim mater liberatur toto onere, dum placenta cum duabus membranis educitur, & funiculus umbilicalis opportuno loco refecatur (24*): neque enim unquam refecari debet prius, quam placenta

eleosis praeflat MANNINGHAM p. 37. Humores partum faciliorem reddunt GALEN. de util. L. XV. c. 5. Partus sicci periculosi Mauritian p. 268. 349. Siegmundin p. 128. E. N. C. Dec. II. ann. II. n. 91. & lenti Hoerne p. 48. uti vulgo notum est: hinc etiam nota & periculosa nimis praecox ruptura aquarum Motte obs. 57. Siegmundin. p. 65. ante ostium apertum Harvei p. 196. Aquae ante partum male habent feminas gravidas Hipp. coac. L. III. c. 3. n. 1. & Doretus ib.

[23] Bruta animalia ita pariunt HARVEI p. 265. & ipsae viperae BALDO teste, & feminae aliquando HARV. ib. eumque partum pro naturali habet IDEM p. 196. Exempla etiam producit T. BARTHOLINUS epist. 1. Cent. IV. & STALPART. van der VVIEL. C. II. obs. 32. REIES RUYSCH. obs. 11. & MAURICEAU obs. post. n. 64. 87. de abortu bimestri, & olim HIPPOCRATES gemellorum quinque-mestrum alterum velut in tunica vidit EPID. L. VII. Bonus la MOTTE cum talem partum videret, male simuit, ne suffocaretur obs. 165. Ignorans HARVEIANI problematis.

(24) Feminae Indae, die puerperii in aquam lotum eunt Thersnot 10-

yag. L. I. T. III. c. 48. & Guineenses Boiman. p. 153. & Conganae Zucchelli relat. p. 165. & Nigritae in universum Lingou. desfer. of. Barbados p. 92. & Americae facile pariunt, atque postridie ambulant Americi Vespulii in relat. idemque in Groenlandiae indigenis vidit Egede gamla Groenland p. 81. Etiam in Europa partus nonnunquam facillimi occurrunt: qualem Peccolus descripsit Cent. I. obs. 27. & stantis in partu mulieris Rivellinus: & minime rarae sunt mulieres, quae continuo a partu omnia, etiam rustica opera edunt, prolapsibus uteri ideo magis obnoxiae. Vide Semmertum prax. L. IV. p. 410. Harvei p. 276. & vulgo a partu si remotum lectulum puerperas Nosodochii l'hotelieu incedere testatur Mauric. p. 210. Omnis autem partus vulgo pro naturali habetur, in quo sanus, neque nimis capitatus, fetus, in eadem cum utero & vagina directione [Dewenter, Boesmar, Onymos p. 7. 13.] praecedunt capite, & facie versus os sacrum conversa editur.

(24*) Qui vulgo ab omnibus pro naturali describitur la MOTTE obs. 56. SIEGMUNDIN. p. 128. p. 64.

(24**) Neque nimis longus, neque duabus uncis brevior, ne umbilici fides debilitetur, & nascitur dissipato

centa educta fuerit : [25] atque porro infans vitam vivit propriam . Ars ipsa locum nullum invenit , & felicissimi partus sunt , a qua longissime abest ; quales sunt deceptorum virginum [26] . Hujusmodi puellam vidi inter convivium prehensam doloribus , quos vocabat hystericos , secessisse in alteram cameram , atque continuo totum ovum una cum secundis exclusisse integrum . Quando vero arte conamur , ut adjovemus , turbamus fere naturam , quae sola totum opus perficit . Si vero partus praeternaturalis fuerit , tunc oportet artem advocare , quae res in naturae ordinem revocet , & obstacula removeat . Quando vero nondum matura placenta est , tunc perinde , uti fructus acerbi solent , nimis [27] firmiter annexa est utero , quam ut facile cadat , uti cadit matura . Ergo fundo uteri adhaeret fortius , quam quae possit excludi conatu nientis matris , tunc fixa ibi manet , dum fetus , seclusus ab utero , solus respirat , & oritur continuata quaedam series corporum : fetus nempe funiculo , iste placentae , haec utero adhaeret . Tunc perita obsterrix una quidem manu funiculum sustentat , altera sequitur ductum funiculi , subit per os uteri patentissimum [28] , neque enim id ita subito clauditur [29] ,

C c 2

venit

- positio ad hernias umbilicales *Chapman* . p. 64. MAURICEAU p. 465. &c.
- [25] MAURICEAU p. 348. 464. SOLINGEN. *Embryule* . p. 318.
- [26] MAURICEAU p. 210. HARVEI.
- [27] Rarius vitium esse SIEGMUNDIN : sed fatetur *Eadem* inter omnia maxime perniciosum esse p. 101. 102. 221. Ego vero nimis frequens esse invenio . Exemplum mortis ab hac adhaesione refert *EADEN* p. 101. *Salzman* . in *obs.* p. 43. MAURICEAU *obs.* 504. FUCHS. E. N. C. vol. 3. *obs.* 146. MURALT. *coll. anat.* p. 238. Ab adhaeto placentae frusto , inflammatus uterus E. N. C. *Dec.* I. ann. IV. *obs.* 192. A retenta placenta mors per febrem malignam die octava , MAURICEAU *obs.* 162. Causa varia est , immaturitas , nam abortibus validius adhaeret , major proportio solidi , centralis placentae & funiculi insertio , strictura spasmodica RUYSCIUS *Adv. Dec.* 21. n. 10. scirrhus .

- [28] Uterus a partu quidem patet , ut campaua , RUYSCH. *Adv.* 11. n. 10. & unus cum vagina continuus tubus est *Dionis des accouchemens* p. 54. *Rapports en Chirurgie* p. 445. &c. Sed postea totus uterus , liber jam a fetu & placenta , contrahitur , *Galenus* jam observante , & ad primam paritatem redit . Sedecim diebus si fieri *Graef* . p. 184. quindecim & decem diebus *Fabricius* P. I. c. 9. octavo vel nono *Deventer* . p. 44. & quinto *Plater* . apud *Sebenk* . *obs.* p. 555. intra paucas aliquando horas *Manningham* . p. 21. *Chapman* . *cas.* 45. *Horne obs.* 4. *Riolanus* p. 365. ut continuo a puerperio uterus pugno non major fuerit la MOTTE *obs.* 397. aut vagina *Riolanus* . p. 365. & tertia hora os non laius cavitae uteri ID. p. 366. Aliquando continui *crampi* os uteri constringunt *Siegmundin* p. 11. Item os statim a partu valide contrahi , deinde lentius expertissimus la MOTTE testis est L. V. c. 6. Vidit etiam *Harveius* continuo ita clau-

venit ad membranas, inter istas & uterum digitum insinuat, versus latera orbiculi placenta, quaerit locum (30) adhaesionis, ibique digito in arcum flexo uterum sustinet, & reprimat, dum interim funiculum leniter adtrahit, ita sequitur placenta, & si vel paulum successerit, continuo facile exit. Haec in negotio isto summa ars est. Si vero obstetrix digitum inseruerit inter membranas disruptas, quae setum emisserunt, amnion nempe, & chorion, tunc membranae lacerantur, & vix absque inflammatione uteri liberatur semina. Exemplum a pueris sumendum est: quando nempe ex plateis stratis volunt lapides eximere, corii orbem arte apprimunt ad lapidis superficiem, tunc funiculum, qui corio adhaeret, adtrahunt, & ita lapidem extrahunt. Quando vero pars una corii inaequaliter, minusque arte lapidi adplicata est, tunc corium de lapide abstrahunt (31) uti placentam de utero oportet detrahere.

clausum, ut ne stylum caperet, unde retentis grumis sanguinis maximum vitae periculum p. 275. Tarde quidem claudi *Ruychbuius* an l. c. & 14. die se apertum reperisse, idque minime raram esse *Thef.* IX. n. 15. in multiparis denique minus claudi *Art de faire des vapers* p. 343. habetque *Harveium* consentientem, uteri nempe os non claudi, quamdiu aliquid praeter naturam in utero manet p. 274. Ita quarto die os uteri pugni capax, cum secundae adhaereret *Muall.* l. c. Quinto die, duos digitos latum reperit *Chapman.* case 44. Sed omnes auctores obstetricii reclamant, ajuntque os uteri circa placentam se constringere *Mauriceau* p. 251. 257. la MOTTE p. 598. &c. atque circa placenta relictam pariter, la MOTTE *obs.* 397. etiam in abortibus, unde periculum ab haemorrhagiis p. 258. post ejectos exiguos fetus, & facile intus manent secundae *Mauriceau obs.* 360. & difficulter eximuntur. Juber ideo la MOTTE & alii, continuo a parto & prius, quam os uteri se contrahat, inferere manum, quod tunc absque dolore fit *Manningham* p. 12. & *Chapman* p. 66. 67. & extrahere secundam, *Aran-*

tio monente, qui etiam jubet manum continuo inferere p. 16. ceteros recentiores: tum *Mauriceau* p. 251. la Motte *obs.* 99. *Solingen embryol.* p. 321. *Chapman.* p. 65. 66. 67. *Cl. Hartranst de extr. secund.* &c.

- (30) Vide *Hartranst* sub fin. *Stuart.* de secund. p. 35. *Chapman.* p. 70. Initium vero facere jubet *Mauriceau* in ea sede placenta, in qua minus firmiter adhaeret p. 251. *Vet. fin. de part. diff.* p. 23. *Vet. rum Solingen* p. 335. & *Cl. Hartranst*, commendat marginis extremitatem inferiorem, digitumque unum sub altero inferere jubent, alternis, oppositis ad uterum dorſis, & retinere uterum, dum placenta extrahitur *Horne* p. 66.

- [31] *Ruychb. obs.* 20. 26. qui observat, vix unquam alio tempore constringere; *Zod. Gall. ann.* III. *M. aug. E. N. C. Dec.* II. *ann.* I. *obs.* 115. 241 *ann.* II. *obs.* 195. *Stalpart. Cent.* I. *obs.* 67. la MOTTE *obs.* 245. 246. MAURICEAU p. 246. *obs.* 355. 685. VVALDSCHMID. de abortu SCHURIG. *embryol.* p. 246. P. AMMAN. *Prax. vuln. lethal.* Dec. V. n. 1. SAVIARD. *obs.* p. 84. III. VVERLHOF. de febr. p. 292. CHAPMAN. case 29.

Ab

here . Si obstetrix unice funiculum traxerit, neque interim sustinuerit uterum, tunc, si placenta cohaesio firmior fuerit, poterit totum uterum extrahere inversum : ita, si inversus (31^a) manerit, puerpera intra tres horas expirat, neque servari potest, nisi eodem temporis momento uterus repositus fuerit . In eo enim statu uterus sanguine stagnante [32], & vix moto plenissimus est, &, quamprimum aer accedit, inflammatur, & putrescit, etiam in reposito, sanguis . Verum etiam tunc caute agere oportet, quando digitus in uterum inseritur, nam, si vel paulum ungue laeseris [33], inflammabitur [34], & cum inflammato utero paucissimae seminae servantur .

Matris] Dixi tres causas partus, quae ad setum pertinent . Totidem a matre pendent: 1. Defectus alimenti . Quo vastior enim fetus est, eo uberiore indiget alimento . 2. Pressio augetur in partibus matris inferioribus, hinc plus sanguinis ad superiora regurgitat, & 3. irritantur nervi .

Sunt

Ab obstetrice rubam extraxam:
vidit MANNINGHAM p. 49.
Tunc in utero pori adparent, per
quos sanguis effluit LITTRE
Mém. de l'Acad. 1707. p. 281.
SALZMAN. *obs.* RUYSCH. l. c.
VVALDSCHMID. l. c. Mortem
vero securam fuisse testatur MAU-
RICEAU, STALPART & reli-
qui omnes, atque fere semper mori
feminas RUYSCH. etiam tunc,
quando uterus restituitur HILS-
CHER. *de negot. gener.* Conf.
Cl. a. BERGEN. *de prol. uteri* .
Servatus fuisse tamen aliquando
RUYSCHIIUS testis est l. c. tum
exemplum est in E. N. C. *Cens.*
II. *obs.* 195. Hunc novum mor-
bum esse credo, de quo CELSUS
in *praef.* ait, « splendidam femi-
nam post paucas horas expirasse,
cum caro ex pudendis prolapsa
exaruisset. Alias uterus cum pla-
centa protrahitur, sed absque
inversione, paulo minori pericu-
lo. Talem prolapsum restituisse
J. van. HORNE *obs.* 4. »

(31^a) Exemplum Ruysebius habet *de musc. uteri* .

(32) Uterus ante partum plurimo san-
guine distenditur HAVEI p.

243. Conf. DCLXIV. not. 12.
(33) Cum placenta uterus elapsus, &
cultello leniter incitus fuisset, in-
de statim lethalis haemorrhagia.
Ruyseb. obs. 26.
(34) Haec ipsa rudior extractio adeo fre-
quentes fecit morbos puerpera-
rum milliares p. 204. mortisque
puerperarum, illustri observante
VVERLHOFIO *de febribus* p.
290. *Comm. lit.* 1733. *book.* 38.
verissime, uti ex trillissimo exem-
plo didici: cautaeque jubet esse
obstetrices, ne rudius eam par-
tem traherent, cujus adeo pericu-
losae passiones sunt RUYSCH.
obs. 61. la MOTTE *obs.* 166. 473.
&c. Cum placentiam separasset di-
gitis, uterus quasi *foetus* mansit,
& aegre servata est puerpera SIEG-
MUNDIN. p. 105. &c. Mors a
subita & rudi extractione placen-
tae MAURICEAU *obs.* 658. Haec
ratio fuit, quare optimus RUY-
SCHIIUS tot locis suaserit, quando
placenta adhaesit, relinquendam,
potius esse, neque enim nocere,
sed in molam abire *Adv.* II. n. 10.
aliquando vero sponte post aliquot
horas decedere expulsam a vi mus-
culi sui *de musculo uteri* p. 13.
aut

Sanguis) Eo momento, quo placenta secedit, prorumpit sanguis, non guttatim, sed uno impetu (35) deorsum ruit, nisi mulier pene absque sanguine

aut a clystere deturbari *Adv. II.* n. 10. (quem etiam commendat MAURICEAU p. 259.) neque putrescere, neque mortem inferre ibi p. 14. Ego non diffiteor exempla exsistere, in quibus secundae diu retentae absque noxa expulsa fuerint. Secunda a partu septimestri retenta motu animali expulsa E. N. C. Cent. 1. obs. 51. Triduo, absque corruptione, & sponte expulsa placenta la Mot. obs. 163. Post Triduum expulsa sponte MAURICEAU obs. 163. E. N. C. Dec. II. ann. 9. obs. 116. Aliquot diebus E. N. C. Dec. II. ann. 5. obs. 179. die sexto vel septimo in sana semina discedunt secundae putridae Hippocrates *synonymus* & de septimo *Maur.* obs. 414. Aliquot septimanis retentam & frustatim absque malo exclusam placenta habet *Vater.* ad *Ruyf.* p. 7. & mensis integro E. N. C. Dec. I. ann. 8. obs. 117. Quadraginta quinque diebus E. N. C. Dec. II. ann. 1. obs. 184. Quatuor mensibus a partu *Kerkring.* obs. 36. & septem *Buchner.* *miss.* 1728. p. 1497. & adhuc diutius *Histoir. de l'Acad.* 1738. n. 5. Vide plura exempla apud *Estmuller.* *diff. de secund. ex.* cius. p. 12. 13. 25. 26. In primis minores illas placentas abortuum diu conservari, atque per putredinem supurationem abire, aut in molas degenerare satis video experimentis confirmari *Hildan.* cent. III. obs. 59. *Mauriceau* obs. 169. 440. 688. 621. obs. *post.* 20. 144. &c. *V. Perlbosch* etiam teste p. 252. Verum placenta & lochia inter omnes humores partesque corporis humani putrescibili natura eminent, & in teterrime olens liquamen contabescunt. Inde a secundarum ad naevum superstitionis adfusione inflammatio & pe-

ne gangraena in recens nato E. N. C. Dec. III. ann. 9. obs. 311. Lochia valde cito faciunt *Verboyn.* II. p. 394. Neque aer arceri potest a partu maturo, cum aliquot certe horis os uteri pateat. Inde putredines & febres a resorbto gangraenoso liquamine, & mortes etiam expulsa placenta, ut apud *Bartholinum* *bib.* 39. cent. V. *Mauriceau* obs. 163. E. N. C. Dec. II. ann. V. obs. 173. *Comm. lit.* Nor. 1735. n. 17. *Leitil. Is.* *tronnem.* I. p. 294. Omnes adeo, excepto *Ruyf.* *bis*, anatomici consentiunt, quantum fieri potest, eximendam placenta, neque negligendum, nisi certioris mali metus in nimia adhaesione manus vinciat. Vide *Cl. Leporini* in *Ruyf.* *cbii* paulo nimis universale consilium animadversiones. Extrahi etiam jubebat *Hippocrates*, sed prudenter, fetus ipsius pondere, qui utri impositus esset, ex quo aqua paulatim subsideret.

- [35] Omnes consentiunt, placenta, vel partialem *Mauriceau* obs. 583. *Mural.* coll. anat. p. 642. 658. vel integram dissectionem haemorrhagarum veram causam esse: *Mauriceau* p. 123. etiam, si primis mensibus exiguum salis germen fuerit p. 158. apertis ostiis vasorum uteri, quibus vasa similia placentae opponantur DCLXXXVIII. not. 11. Haec vasa minuuntur, quando uterus ab integro partu contractus, ad priorem exilitatem redit. Sed, dum fetus in utero manet, uterus nequit contrahi, vasa adeo distenta manent, & perguine sanguinem cum summo matris periculo, effundere, *Dionis* *des accouch.* p. 334. & cita morte, si haemorrhagia maior, aique adeo ma-

sanguine fuerit (35*). Non prius erumpit sanguis, nisi vel partus minus naturalis fuerit, aut aliquid laceratum sit; aquae vero & mucilago utique ante placentam exeunt; nunc vero, dum placenta secedit (36) ab utero, purus sanguis exundat. Uterus, in femina nono mense gravida, ad minimum vigecuplo major est se ipso, primo mense praegnanante. Haec diversitas pendet unice a maiore sanguinis copia. Sanguis iste stagnat in fungosi corporis uteri cavernis, chylosus est, & ante placentam stat, quod nemo negat, neque enim hic quaero, an etiam fubeat placentam (37). Nunc aufertur placenta, ergo vasa aperta sunt, & sanguis, qui in utero est, & ex vasis uteri in placenta vasa communicat, non redit in venas, neque id fieret cum matris commodo, sed expurgatur in uteri caveam, dum de arteriarum finibus tot epistomia (38) removentur, atque saltu prorumpit, quicumque steterat in vasis, quae placenta haestus

major placenta portio soluta fuerit. Ergo educendus semper fetus, sive falsum germen fuerit, sive immaturus fetus, sive infans perfectus *L. Bourgeois* l. p. 64. seqq. *Chapman*. p. 74. *Siegmundin*. p. 99. *Bohn. de fals. abortu* p. 609. *Mauriceau* p. 158. 160. id autem facile fere fit, cum in hoc casu placenta jam dissoluta parum adhaereat *Mauriceau* p. 161. & uterus lae pateat *Chapman*. l. c. Neque quidquam relinquendum est, cum haemorrhagiae finis expectari nequeat, nisi uterus per septe liberatus fuerit p. 171. cuius tantum grumus maior, aut pars placenta reicta fuerit *Mauriceau obs. post.* 25. *Chapman*. p. 26. la MOTTE *obs.* 396. Quoties id neglectum est, cum maturis inprimis fevibus, certa mors succedit *Mauriceau* p. 158. *obs.* 220. 238. 330. 650. *Bohn. de abortu salubri* p. 604. 605. Educatione vero facta saepe servantur *SIEGMUNDINI* c. *Mauric.* p. 168. *obs.* 284. 216. 279. 457. *obs. post.* 57. 80. 98. 110. 110. Aliquando tamen post nimias haemorrhagias, etiam educito fetu, inter deliqua exsanguuntur *MAURICEAU* p. 162. 166. aut aegerime servantur la

MOTTE *obs.* 401. 402. Commendat autem PUZOS, in maturis fevibus non manu adeo fetum, in tanta matris debilitate, extrahi debere, sed os uteri digiti distendi, sic dolores nasci, & haemorrhagiam a soluta placenta necessariam minus subitam, aut leviorem succedere *ACAD. CHIR. II.* Simile fere consilium fuit *D. Mauriceau obs.* 624.

(35*) Ab abortu iuxta haemorrhagiam, ut nullus in corpore puerperae sanguis reliquus esset *L. Bourgeois* l. p. 67.

(36) Hinc periculosissimae haemorrhagiae sunt, quando placenta circa os uteri adhaeret *HOOKNE* p. 27. Quando placenta fetum praecedat, quod tunc necesse est fieri, enormis sanguinis fluxus sequitur, ob vasorum multitudinem, neque cohibendus, nisi subito fetus extrahi potuerit *HIPP. de superfet.* n. 2. *MAURICEAU* p. 331. *obs.* 175. 210. 421. 428. 502. 651. *DIONIS* p. 299. la MOTTE l. III. c. 15. *BOHN.* l. c. p. 616. *Siegmundin*. p. 98. *E. N. C. Dec. II. ann. 5. obs.* 34.

(37) DCLXXVIII.

(38) Hinc etiam a naturali partu subitae nonnullam post avulsionem placenta

nus quasi obturaverat. Haec adeo haemorrhagia peritum non turbat (39). Quando vero sanguis exit ex gravida, in cujus utero fetus adhuc remanet, oritur omnino timenda haemorrhagia, funesta, nisi fetus continuo extrahatur. In hoc enim casu fetus uterum expansum tenet, neque finit collabi [40], sic pergit sanguis erumpere ad mortem usque. Nullum ergo sanguinem ante secundas oportet exire utero. Quando vero aqua rubra exit ante partum, aut quando secunda aquam praecedat, respiravit fetus, & in summo periculo versatur *. 1732.

§. DCLXXXVI.

Dimissis) Femina & ante partum, & in partu maximos dolores patitur, in primis dum caput ferus, & humeri exeunt. Quando nunc placenta obsecuta est, nascitur status tranquillitatis exoptatissimus, cum quo, ut feminae ajunt, nulla alia beatitas comparari potest. Verum haec ipsa periculosa pax est, neque unquam in naturali partu feminae pereunt, nisi post nixum editum, tunc enim omnis sanguis ad abdomen fertur, & nihil ad cerebrum, & cerebellum, venit. Ergo jam ante partum cingula (1), Britannorum more ex corio facta, debent abdomini circumdata adesse, ut, quamprimum semina peperit, abdomen constringi possit, & coerceri sanguinis nimia determinatio ad inferiora. Sic caventur apoplexiae, deliquia, convulsiones matrum. Porro cavendum est, ne frigidus aer ad uterum venire possit.

Contrahere) Eductus est fetus, & sanguis, quem uterus per totam graviditatem retinuerat, nunc effluxit: uterus autem se contrahit, & qui prius distensus fuit, ad priorem parvitatem redit, neque superest corpus, quod uterum distrahatur, comprimuntur adeo vasa, & omni momento angustiora

centam ab haemorrhagiis mortes visae sunt la MOTTE p. 723. obs. 423. CHAPMAN. *casu* 7. &c. aut funestae convulsiones MAURICEAU *obs.* 230. conf. not. 35.

(39) Nisi nimia sit, tunc enim minime periculo vacat MAURICEAU p. 384.

(40) Collapsus uteri, quando fetus eductus est, in cohibenda haemorrhagia tam efficax est, ut etiam ob eam rationem haemorrhagiam in sectione caesarea modicam esse GALENUS, & ROUSSET *de sect. caes.* S. I. c. 8.

(1) An errore codicis? An credidit Praeceptor, posse aliquid haec cingula ad frenandum effluxum sanguinis. Possunt utique, sed tum demum, quando enormiter abdomen comprimitur, & tunc facile lochia supprimuntur la MOTTE *obs.* 420. Sed millenas feminae ex lochiis suppressis pereunt, si una ex haemorrhagia nimia a partu legitimo perit. Mihi naturae adversari videtur ea comprimere vasa, quae per aliquot dies aperta manere, necesse est, nisi feminam perire velimus. Vide la MOTTE L.

V. c.

gustiora fiunt, & collapsu uteri clauduntur [2]. Primo adeo impetu (3) evacuaturs sanguis, qui stabulabat (4) in arteriis uterinis, alendo destinatus fœtui, neque in venas rediturus, sed in placentam infundebatur sensum. Hic sanguis haeret per totius uteri ambitum, ergo abrupta placenta vehementer exsilit (5). Alterum lochiorum stadium est, quando purus quidem, floridusque sanguis, ad sextum & decimum (6) diem usque [1. G. 3. 4. 5. diem, raro ultra: FELDM. per biduum] lente, atque leniter [7] effluit, quia per aperta quidem vasa desillat, sed jam magis contracta.

Expellis) Uterus repurgatur; nempe ea portio sanguinis, quae in expansis vasibus uteri potius stabulabat, quam transfluebat velociter, is sanguis derivatur extra corpus feminae. Si retentus fuerit, magna mala faciet: neque enim in venas redit, sed stagnat, oritur phlegmone uteri, deliria accedunt, febrisque [8] vehemens, & proxima mors sequitur. Ergo semper maximam curam adhibere oportet, ne lochia retineantur.

Id

V. c. 9. dicentem contra receptam patriae suae consuetudinem, quam sequebatur MAURICEAU sed alio scopo, ut forma feminis conservaretur. Hinc ab initio laxas facere jubet ligaturas p. 176. post decimum quintum diem strictiores p. 177.

- [2] La MOTTE L. 5. c. 6. id. *crasf. fœtere* vocat MAURICEAU p. 21. 22.
 [3] Lochia primo ad sesquiheminam effluunt, tanquam sanguis a victima HIPP. *γυναικων*. Die primo multa & rubra lochia MAURICEAU p. 411.
 [4] Ex portis illis minoribus uteri supra citatis ad DCLXIV. & magnis ostiis sinuum cavernosorum VATER. *fig. uter. grav.* p. 16.
 [5] Placenta avulsa uteris est quasi latum vulnus HARVEI p. 174. MAURICEAU p. 412.
 [6] Secundo, tertio die lochia pallida fiunt, & semper expallescent, donec lactis fiat similia MAURICEAU l. c.
 [7] Dictum est, uterum a partu contrahi DCLXXXV. not. 28. vi sa-

bricæ musculosæ DCLXIV. & elatere arteriarum, nimis dilatatum, quae ad priorem exiguitatem redeunt. Ita necessario primum rubri sanguinis impetus minuitur, deinde eo vergunt humores in eo ordine, quo sanguini succedunt, rubellus, ichoris similis HARVEI p. 174. flavus, pallens denique albidus. CL. VATERUS, credit valvulas sive rugas cavernarum uteri aliquid etiam posse, ad moderandum lochiorum impetum l. c.

- [8] Ex recentis lochiis uteris inflammatus, & totus ater BRESL. 1723. m. nov. Ex levi terrore suppressa lochia, & mors la MOTTE *obs.* 411. Mortes a suppressis lochiis per febres acutas HIPP. *Epid.* l. *aegr.* IV. *Epid.* III. S. II. *aegr.* 2. 23. & in universum a lochiis recentis febris calida, uteri inflammatio *γυναικ.* α. summumque periculum *Proverb.* l. n. 10. Felices quibus abscessus a lochiorum superpressione morbum solvit: ut apud la Motte *obs.* 409. 410. 413.

Id fieri potest per frigus [9], aut rudem obstetricis tractationem (10).

Tandem) Denique vasa uteri ita se coarctant, ut sanguinem nunc nullum accipiant, verum proximam crassitie sanguini materiam, semirubram, semimucosam. Tunc uterus semper magis contrahitur, & tenuior redditur, donec naturale omnino liquidum (11), majori tantum copia, excernat, atque ultimo exsicceetur constrictus. Hactenus tamen supra virginem suam parvitatem in maiorem molem distensus manet, donec septem, octo, novemve septimanis priorem exilitatem (12) recuperet, tuncque impraegnari aptus fiat, & retinere fetum, quod non poterat ante [13], nisi in valde vegetis mulieribus.

Varia) Pro varietate temperiei, mensium abundantia, aut paucitate. Aliae mulieres lochia per integrum mensem (14) patiuntur, quibus nempe menses copiosi fuerant, aliis vix aliquid sanguinis erumpit, nisi primo impetu (15), quibus etiam ante partum parca menstrua stillaverant.

§. DCLXXXVII.

Contractis) Nunc vasa uteri arctiora sunt, & magis resistunt sanguini, huc deponendo, ita ut sanguinem chylosum, crassiores, non recipiant.

Tunc

(9) La MOTTE *obs.* 409.

(10) DCLXXXV. not. 34. quae frequentior causa est. A parte membranarum relicta lochia suppressa. La MOTTE *obs.* 400. &c.

(11) Lacti simile MAURICEAU p. 411. a die quinto ROUHAULT *offer.* p. 44. Vulgo pro vero lacte habetur, sed male ROUHAULT. MAURICEAU p. 413. *Mem. de l'Acad.* 1708. p. 247.

(12) DCLXX. not. 13.

(13) In brutis vero, v. g. cuniculis, uterus unica a partu hora ad venerem, & conceptionem aptus est HARVEI p. 274. Naturaliter minus in femina est tertia septimana MAURICEAU p. 381.

(14) Sunt, quibus lochia rubra ad quinque, & sex septimanas stillant la MOTTE p. 612. uti in regionibus calidis videtur familiare esse. Nam a partu masculino triginta, a

femina quadraginta diebus fluere ait Hippocrates *επιγυναικ.* u. gtaecus homo.

(15) Dantur, quibus absque morbo lochia intra bideum sistuntur Bellinger. *of the new syst.* p. 32. la MOTTE L. V. c. 6. & quinto la MOTTE p. 622. aut omnino nulla fluunt SALMUTH. *Cent.* III. *obs.* 89. E. N. C. *Cent.* VI. *obs.* 76. *bist. de l'Acad.* 1738. *obs.* 5. TRUMPF. *Comm. lit.* 1735. *beob.* 40. Aliquando diarrhoeae purperis lochia auferunt la MOTTE *obs.* 160. alias copiosum lac MAURICEAU p. 413. 419. alias per alvum sanguinea effluunt BR E S L. 1720. p. 617. LANZONI *anim.* 226. Via tunc ex utero in abdomen per tubam elapsa STAEHELIN. *spec. anat. bot.* 1724. u. 4. Confer DCLXXXVII. not. 8. & seqq.

Tunc pars sanguinis chylosa (1), quae prius cum mensibus effundi solebat, deinde stagnabat in uteri arteriis, neque radibat in venas, nunc, cum definit effundi in uterum, redditur venis uterinis, venae cavae, cordi vasis pulmonalibus, aortae, & circulationem obit per corpus. Inde febricula oritur plerumque, quam vocant lacteam, vel puerperalem, naturalis omnino, sed paucis duratura horis: simul mammae dum rescere incipiunt, & intumescere quasi oedemate, & lochia minui (2).

D d 2

Si

(1) Lac procul dubio chylus est, colore, sapore, contentis DCLXXXIX. similitum: conf. CXXXVII. Salsiorem unice facit ductus thoracici chylum LOVVERUS p. 237. quae diversitas forte ad lympham admixtam pertinet, contentiente MICHELOTTO. Sed chylus iste non subito in sanguinem vertitur, & pluculis omnino horis cum sanguine circumducitur CXXIX. CCIV. LIEUTAUD. p. 212. conservato colore, & sapore. Inde non penitus rara exempla sunt, lactis alieno loco effluentis. Ex tumore duro eratis lac salire vidit DIONIS p. 410. & abscessu tali SCHURIG. *syll.* p. 517. Ex pustulis femoris verum lac IOURNAL DES SAVANS 1684. n. 16. Ex ulcere COVPER. T. XIX. Lacteus succus ex minimo foramine inguinis fluens SOC. EDIMB. V. p. 198. Lac ex umbilico effusum, per canalem non satis notum ascendentem versus hepatis E. N. C. Dec. II. ann. 8. *obs.* 177. Lac per os effluens Dec. II. ann. 6. *obs.* 76. Denique thymi succus, lactis similitudinis I. POZZI *Comm. epist.* p. 66. & nonnullarum glandularum conglobatarum, in fetu, & recens nato homine, succus lacteus est. Non ergo opus est minime probabili commento MAZINI, qui alborem & dulcedinem lactis a figura ovali glandularum mammariarum deducit *Inst. med.* p. 234. Sed chylus videtur globulis suis respon-

dentes habere diametros in vasis mammarum lactiferis, & in eos deponi, non dissimiles, forte, pororum ad cellulas adiposas ducentium, quae satis analogum, sed minus aquosum liquorem recipiunt, & perinde uti lactei ductus, & facile ab arteriis chylum admittunt DCLXXXVIII. not. 7. & expedite reemittunt in venas. Haec enim proprietas sola explicare potest, quare in virgine, muliere vidua, paucissimis temporibus exceptis, nempe a partu & imperfectius in inpraegnatis, nihil omnino per ductus lactiferos fecernatur, sed collapsi, clanculum quasi adsint, & tenuissimo tantum & aegre visibili liquido persfluantur? Eo nempe toto tempore resistentiam a collapsis ductibus lactiferis ita magnam esse oportet, ut ex horum ductuum principio, continuo arteriis, lac facilius, & expeditius in venas rubras, quam in progressum ductuum lactiferorum transeat. Hinc visis mammariis obstructis in femina lactante, & febriente sanguis lacteus Bartolinus de hepatis *descript. de pper. caus.* p. 51.

(2) Succus uterinus omnino a vero lacte differt, pallidior est, mucosior, aquosior, minus aut pinguis, aut dulcis, non autem valde a colostro recedit, sive lacte aquoso gravidarum, aut puerperarum nunc primum nutritum. Nam primo a partu die serum, tertio denum & quarto lac videtur.

Si nunc accefferit suckio mammae a lactente puero [3], vel pressio a matre, tunc mammae fiunt quasi uterus, nempe superpondium sanguinis, quod in plethoram menstruam consumebatur olim, & postea inpendebatur alendo foetus, id nunc mammae traditur, quarum vasa per suctionem aperiantur. Et si perrexerit fetus, aut docta mulier, mammae exurgere, intra paucos dies, nihil ultra de lochiis stillabit, nisi paucae puris guttulae, ex secreto, & stagnante liquore paratae.

Communicantes) GALENUS (4), deinde RIOLANUS, porro NUCKIUS, vasa habent, quae lac ad mammae ferant. Nempe 1. arteria mammaria, ex arcu arteriae axillaris oritur, retrogreditur sub claviculam, adit costas, inde descendit ad centrum mammarum, iisque inpenditur. 2. A trunco arterioso hypogastrico, qui etiam utero arterias dat, arteria contrario ductu ascendit, perforatis abdominis musculis, ad mammae, & utriusque arteriae ejusmodi directio est, ut truncos truncis perfecte obponant, & motui cordis contrariae eant. Neque voluit CREATOR, ut recta via sanguis ad mammae veniret, uti neque recta via ad uterum reduxit. Verum per arterias retrogradas appellitur ad uterum is sanguis, qui minime aptus est ad motum, chylosus (5) nempe, qui nondum diu circulum per corpus obit, neque in naturam humanam excoctus est. Ergo per has arterias, chylosus maxime sanguis

nit *Stahl. theor. med.* p. 163. Verum sufficit, opinor, a partu insignem aliquam excretionem superfluum esse, ut succedat aliam, & naturaliter ea, quae similioris liquidi est, uti alibi catarrhus diarrhoea solvit, sudor diarrhoeam, urina sudorem. Ergo experimentum, uti certum est, ita non obscuras causas habet. Multae feminae paucae lochia habent, quibus abundius lac ad mammae venit *Mauriceau* p. 419. Nutrices lochia vix patiuntur *ID.* p. 413. Nutricibus paucillum mensium *Aristoteles bist. anim.* l. X. sub fin. Porro a terrore lac ad uterum reperculsum, ut per integrum mensem lochiorum specie fluxerit *Boccone Musc. de Fetic.* p. 23.

[3] Suckio per inspirationem explicatur. Infans in dilatato pectore, spatium parat, aere minus elastico plenum. Sed incumbit mammae pondus atmosphaerae. Ergo lac jam depositum in tubulos lactiferos,

urgetur vi nova, atque superat papillae difficultates. Deinde, & eadem opera papilla leniter titillata *DCLXXIX.* 9. 12. intumescit, erigitur, ductusque lactiferi in rectitudinem porrecti, facilius succum chylosum emittunt. Utraque causa facit, ut lac in os infans descendat. Idem, etiam in cadavere, pressio potest, & in feminis levis titillatio mammae, quae lac accessit, & coactum, resolvit *Stahl.* l. c. p. 166.

- [4] *DCLXVI.* Caeterum sanguinis ad mammae determinationem ex clauso utero, & funiculo umbilicali resecto etiam *Simsonus* explicat *of the womb.* p. 46. & ab hypogastricarum cum mammariis communicatione *KAUUV.* n. 1073. Sed demonstravi: l. c. posse nos carere hac, satis dubia, anastomosi.
- [5] Qui globuli molles, magni & inaequales, atque facilissima discessio elementorum *DCLXXXIX* exigui adeo ad expedite fluendum apti: tudo sit.

fanguis, ad mammas adfertur, qualis ad uterum ferebatur; partim enim ab utero venit, partim a singulari valorum apparatu praeparatur.

§. DCLXXXVIII.

Dilatabili) Mamme liberae sunt, neque ullo ambeuntur musculo. Inponuntur musculo pectorali majori, ita tamen, ut interponatur pinguedo, inter musculum mammaeque discum. Hic totus discus facile ab anatomico, aut a chirurgo, qui mammam extirpat, eximitur, & exemtus ex pinguedine enucleatur, ut liberrimus sit undique, nisi, ubi papilla cuti tenui adhaeret. Ergo mamma facile dilatur (2).

Communicantes) Haec ratio est, quare per adeo varios valorum anfractus sanguis ad mammas veniat. Voluit enim natura, ut ex quolibet horum valorum in alterum libera via perpetuo pateret (4).

Relia)

- (1) *Figura externa mammae notissima est. Glandulosa vero congeries, quae proprie mammam constituit, utique insulae modo, in media albilissima, mobilissima, sub papilla vero paucissima, VVinslov. Exp. tr. de la poitr. nu. 2. pinguedine ponitur, a musculo pectorali abunde libera, Morg. Adv. V. p. 8. contra, quam Cl. Lienaud visum est & Cl. Gunzio D. de mammis p. 10. undique ab ea pinguedine separata, albo, satis tenaci, eum cellulosa tela acinis interposita continuo involucre, dicto G. Baubino theatr. p. 180. Ravio apud Valent. II. p. 100. Molinetto p. 87. VVinslov n. 11. Gunzio de mamm. p. 10. quod glandulam mammae undique continet, iis exceptis locis, ubi ductus excretorii exeunt, uti glandula VVbartoni, aut Stanonis, involucre pene tendineo, cum cellulosis earum glandularum internis vineulis continuatur. Haec ipsa pinguedo est, a qua princeps mammae moles, & rotunditas pendet, & qua consumpta mammae evanescere videntur in ve-*

tulis Rayseb Thest. IV. n. 23. In: de virginum mammae fororian-tes, non a glandulosa fabrica Fannous diff. XI.

- (2) Demonstrant subitum tumores, a lacte, a repressa perspiratione, a causis obscuris. Mammae subito tumidissimae E. N. C. Cent. I. obs. 67. In herniosa, cum abdomen constringeretur, mammae intumescebant Bartbol. bist. 47. Cent. VI. Mammarum sexaginta & quatuor librarum exemplum Phil. tr. 1669. & aliud vastissimarum mammarum Salmab. Cent. II. obs. 89.

- (3) *Arteriae, in Textu.*) vide DCLXV. not. 2.

- (4) l. c. DCLXVI. a.

- (5) *Abest, in Textu.*) Mamma glandulam conglomeratam in centro habet, dictam I. Corpo sag. p. 25. b. Vesalio p. 676. Spigelio p. 267. Lienaud. p. 211. &c. pictam a Bidloo T. XIX. f. 1. Ea sola lac generat, & mihi videtur nica, hemisphaerica, & mammae concentrica, propior tamen cuti, ubi papillae respondet, ut nicaam non

Recta) Ut finis arteriae rubrae absque interposita glandula fiat ductus lactifer, & ex trunculo quidem arterioso in continuam venam rubram sanguis fluat, in ramum vero lateralem lac feratur. Quando enim vasa arteriosa mammarum replentur, liquor in vasa lactea mammarum transit

[7], &

non male dixerit *Riolanus* & *C. Bartholinus* pag. 182. Nam acini omnes, uti in conglomeratis, in unam molem conpinguntur *VVharton* p. 259. *Rau* l. c. *T. Barthol.* Cent. II. b. 92. *Morg. Adv.* IV. p. 90. *Adv.* V. p. 7. *Heijster* in *praef. comp. VVinslovu* n. 10. *Gutermann* de *mamm. & lacte* p. 10. *Guns* l. c. p. 11. Minus adeo recte plures mammae glandulas facit *Diemerbroeck* p. 240. & in *icone Verheyen* T. XVIII. f. 2. neque novi *Vesalii*, aut *C. Bartholini* glandulas minores, quae magnam circumstant, neque bene decem numerat glandulas *Molinetti* l. c. Cohærentes mavult vocari *Cl. Bobmer* de *mamm. progr.* p. VIII. Componitur haec glandula ex numerosissimis acinibus subrotundis, *Bobmer* ic. I. rubris aut e aubro lividis, duriusculis, membrana clausis *Rau*, cellulosa tela conjunctis. Has glandulas vesiculofas vocat *Vinslov* nov. *syss.* p. 60. *Ruysebbius*, ut solet, nullas glandulas mammarum admittit *Epist.* XV. *Thes.* VII. n. 70. non bene tamen pinguedinem pro glandulis dicit haberi *Epist. cit.* nihil enim, vel iple, potest mutare, nisi intimam acinorum fabricam non vesiculam esse cavam, sed vasorum glomerem. In vivis negat glandulosam fabricam adesse *Vesalius*, sed repugnant experimenta, & *Morgagnus* *Adv.* V. p. 3. Et glandulam & pinguedinem habet *Cl. Guns* l. c. p. 27.

(6) *Lactiferos*, in *Textu.*) *Vesalius* venas mammarum in lactante lacte plenas viderat p. 677. *I. Postbius* ductus dixit ad papillas euntes,

& lac fundentes p. 511. *Spigelius* *lactiferos* candidos canales pariter vidit, & addit in praetextu angustiores fieri p. 266. Tubulos candidos in centro mammae eoei untes reperio apud *C. Bartholinum* p. 183. Porositates obcurius vocat *VVharton* p. 261. *Fufius T. Bartholinus* sexta septimana a partu ductus vidit & pinxit *bis* 92. Cent. I. ductus ramulos, divios in glandulosam mammae substantiam anat. *renov.* p. 332. Ab eo tempore vulgo noti fuerunt, & in semina, aut gravida, aut non supra sextum mensem a partu extincta facile reperiuntur. Hos adeo ductus ego repetio laxos, membrana albiissima & tenerissima factos, ut oculorum aciem iuvenes fere eludant, multo, quam in iconibus latiores, certe sexto a partu mense ne duabus quidem lineis angustiores, ut etiam *Ruysebbius* dixerit, in praegnante sed di amplissimos *Thes.* IV. n. 23. conf. *Trevv.* E. N. C. vol. 2. *obs.* 24. Sinus vero peculiare a *Cl. Trevvio* in originibus horum ductuum dictos l. c. & repetitos a *Gutermanno* p. 11. & *Cl. Guns* p. 14. nullos vidi. Oriuntur radiculis suis in glandulam principem mammae dispersis, *Nuck* *anogr.* f. 1. & semunc a papilla confluant in viginti fere trunculos, qui undique circumstant papillam, ita arcte stipati, ut nihil fere nudum relinquant, conf. *Morg. Adv.* IV. l. 3. perque papillae fungosam carnem adscendendo ita arctantur *Spigel* p. 266. *Nuck* f. 1. & p. 13. *Rau*, *Bobmer*, *Kest* p. 216. *VVinslovu* n. 13. ut setam

[7], & quando in ductus galactophoros vicissim liquor injicitur, impletur

setam argenteam crassiores non facile capiunt *Nuck* l. c. *Trevv.* l. c. difficilius vero per osificum inter rugas collapsae papillae admittant, quod *Cl. Bohmer* p. 13. & nobis succellit, sed raro evenit *D. de Marchetti* p. 61. ut non male minimis & vilum fugientibus canaliculis papillam perforari scribat *Molinetti* p. 87. Valvulas nullas vidi, uti neque *Covvper* ad Tab. XIX. neque *Nuck* p. 11. habet autem *Bidani* l. c. *Margetus*, & *Pelfyn*, anat. chir. p. 256. & ex ovis describuntur in E. N. C. Dec. l. ann. 2. obs. 154. Neque spincteres *Keilii* l. c. vidi, neque valvulam ad osificum papillae dictam a *D. de Marchetti* l. c. neque transversas demum anastomosif ductuum, pene ab omnibus propositas, nempe a *Ravio* l. c. *Keilio* comp. p. 115. *Nuckio* p. 16. f. 2. E. E. E. *Verheyeno* f. 4. & ex capra *Mangeto* theatr. II. p. 169. ex quibus factum est, ut *Covvperus* omnes per unum ductum intrari posse doceat T. XIX. & *Gutermannus* idem adfirmet, & *Nuckus* omnino omnes descripti conjungi in circulum, a quo ad papillam, & excretoria oscula rami exeant p. 16. Hunc circulum perinde recensuit pro vtero *Cl. Gutermannus de mammis & lacte* p. 10. & ipse *VVinslovvus* n. 13. 19. & *Gutermannus* quidem experimento demonstravit, ut agnosceretur a *Trevvoto Comm. Lit.* 1734. n. 16. Ego vero ductus vidi manifestissimos, circulum nullum, nullum etiam pingit *Bartholinus* & *Verheyen* T. XVIII. f. 2. & discrete negat se reperisse *Trevv.* l. c. & *Cl. Bohmer* p. XV. & *Cl. Gunn* p. 18. Infulas autem ejusdem ductus manifeste vidi, quales inter ramos ejusdem ductus etiam *Cl. Bohmerus* pingit f. 1. 2.

An viderunt clari viri circulum venosum subcutaneum, qui eleganter arcolae ambitum circumscribit, & minutis ipsorum vasibus melius respondet? an unice radices ductuum prope papillam in truncum confluentes, pro transversis habuerunt anastomosibus? an fabricam omnino veram, sed diversam a meis experimentis omnibus, etsi plurimos ductus lactiferos mercurio repleverim? Nunquam denique vidi pauciores quindenis, cum quinque vel sex habeat *Gutermannus* p. 11. octo *Morgagnus Adv.* I. in ic.; septem & octo *Keil.* sex ad undecim *Neuber* art. magn. anat. nu. 6. *VVinslovvus* n. 19.; sex ad novem *Nuck* f. 2. 3. 4. 5. 6. sex ad septem *Gunn* p. 17.; Decem numerat *T. Bartholinus* liss. 92. *Cent.* I. & *Ravium* p. 100. Decem aut plures *Bartholinus* anat. p. 131. Decem & duodecim *Lieusaud* p. 211. *Verheyen* T. XVIII. f. 2. Septem ad decem *Cl. Bohmer* p. 10. *Ruysschius* unice multos vocat *Tiesf.* Aff. 3. nu. 3. In balaena unicus ductus est eleganter margine cristato, fimbriatis ostiis, ne lac effluat *Tiesf.* l. T. IV. f. 5. 2.

[7] Experimentum passim habetur. Aqua ex arteria mammaria per lactea vasa rediit *Manget. theatr. anat.* II. p. 168. & materies injecta p. 169. & idem experimentum successi. *Albino*, & vicissim mercurius per ductus lactarios injectus, rediit per arteras *Nuck* p. 11. *Covvper* ad T. XIX. Nihil ergo indiget obscuris illis *Pleusfensi* adiectionibus, vasa lymphatico nervae in cavitates glandularum vesicularium inferi p. 60. & multo mirus propriis vasibus chylosis, quae a ductu chylifero ad mammas lac vehant, qualia *Everardus* habet p. 15. 117. 118.

cur venae & arteriae. Hinc lac, quando non coagulatur, potest in sanguinem redire (8). Hi iidem ductuli, demonstrati a Νυκκιο, conjuncti, faciunt unum ductum majorem radicibus, & iterum in fine arctatum. Haec nunc vasa replentur lacte, & faciunt, ut mamma turgeat, absque sanguinis ope, nihilo enim plus sanguinis est in mamma perpetuae, quam in alia quaecunque aetate feminae.

Spongiosae (9) Papillae (9) spongiosa corpora habent, fere uti penis virilis, ea perinde a tentigine adiciuntur, si confricata fuerit papilla.

Plura)

&c in *Phil. trans.* n. 67. recensentur, repetita in mammis vaccarum a *Pascolo* Ill. p. 116. &c in cane a *Lenzono anim.* 31. &c *Zypaeo*. Olim negavit, vasa a ductu thoracico adire mammas *Auzout* apud *Pasquet* pag. 157. &c *VVbartonus* p. 264. &c *N. Stenonis de musc. &c gland.* p. 46. &c *Nuck* p. 20. &c *Dionis Cours d'Anat.* p. 408. cum frustra in cane inquisivisset, &c in femina, &c constat nunc satis, lymphatica omnino a mammis, ut alibi in corpore, ad cisternam confluere *Bohmer* p. XI. Vidit autem vir Clarissimus vas lymphaticum ex parte hepatis convexa, euns ad cartilaginem ensiformem, juxta sternum edens ramos, &c surculos inter tertiam quartamque costam a mammis accipiens L. c. In vaccis *VVbartonus* viderat p. 260. tum *Needham* c. 1.

- (8) Non subito equidem, ut repetito expetitus sum. Sexto enim a partu in infantick mense lac flavum in ductibus lactiferis, &c utique fluidum reperi. Sed redit tamen in feminis, quae pueros abstant, uti pinguedo, in sanguinem, neque pergit fecerui, postquam mammae prius ad summum saepe tumorem adfurrexerunt.

- [9] Papilla cylindrus est, obtuse terminata, exus vatie celliculosa &c rugosa, timofaque *VVinslov* n. 20. spongiosa, fungosa, uti penis *Vesal.* p. 677. *Nuck* p. 25. quae

leni contactu erigitur, & sanguine, quem roseus color prodit, tota turget. Fibrae autem, duarum serierum, majores & minores, quas *Nuck* p. 24. &c ex eo *Covvperus* ad T. XIX. &c *Kestius* describit p. 116. reticulatas, spatia spongiosa intereientes *Nuck* f. 6. 7. 8. in quas sanguis effunditur, nondum satis notas habeo, neque fascias ligamentosas, ex quibus incipimus papillas componi *VVinslov* auctor est n. 18. Tota porro papilla plena est ostioli ductuum lactiferorum, inter plicae collapsae papillae latentibus *Spigel* p. 262. *Ruyss* *Thes.* I. T. IV. f. 4. inordinatim dispositis, ut in iconibus *Nuckii*.

- [10] *Nervosae, in textu.*) Nervus princeps mammarum ex intercostalibus est, &c ad quintum costarum intervallum exit *Vesal.* p. 678. quem fusius describit *Cl. Guenais* p. 22. propria enim expetimenta non habeo. Multos vero esse, ut *VVbartonus* p. 260. &c *Needham*, facile summa hujus parvis sensibiles demonstrat. Papillas denique mammarum in balena primo detexit *Ruysschius Adv.* II. *sub fine*, ubi imitar penicilli in multos villos dissolvuntur *Thes.* I. T. IV. f. 7. 8. 9. Deinde ex femina ibidem f. 1. 4. &c in mamma ferus optime vidit, amicus olim suavisimus Ill. *Bohlius de viis lact.* n. 15.

Plura) Decem, vel duodecim, non in medio, sed in ambitu papillae terminati. Per hos ductus magna lactis copia exilit, postquam semel a suctione pueri aperti fuerunt, neque unquam effluit (11) in sana muliere, etiam si mammae plenissimae fuerint, nisi infans suxerit. Si vero suctionem duo, aut tres pueri continuaverint, poterit educi per mammas chylus maternus omnis, & ipse denique sanguis succederet: sanguinem autem qui salus sit, repudiat infans, neque pergit sugere.

Arcolam (12) In ea cryptae sunt, quae succum mucaginosum & oleosum continent, ut papillae a pressione infantis defendantur.

Refectio) Vidi casus, in quibus cerevisia (12) crassior, quam jejuna nutrix biberat, post quinque minuta horae aegre elapsa per mammas efflueret, peragrato, in tantillo tempore, toto itinere in massam sanguineam, & per eam massam. Quamprimum enim fistulae evacuatae sunt, replentur a succedente humore, & a suctione laxantur, atque dilatantur. Quando mulier unum forciosem fetum nutrit, aut omnino duos, eosque famelicos mammae adplicat diutissime post ultimam refectionem, mox mammae flaccescunt, ad linteorum modum; tunc, si puerpera biberit cerevisiam avenaceam dulcem, vel lac, inplebuntur (13) denuo mammae, eadem

[11] Non naturaliter certe, effluit rammen nutritibus, maxime quando abstant, tum gravidis, serofus humor, qui vestes maculet. Nempe ductus lactiferi, ubi per papillam ascendunt, longiores sunt papilla languente, hinc in plicas collabuntur, & oscula retrahunt, & resistunt liquori. Papilla vero a sanguine rigente in rectam lineam extenduntur, cum eadem, atque plicis deletis, leves facti, facilius permeantur *Morg. Adv. V. p. 6. VVinslov. num. 21.* Hanc causam esse confirmat modus, quo vaccarum ubera mulgentur, mira nempe & mechanica extensione *VVinsl. l. c.*

[12] Haec areola tenerrima, & a pellucente sanguine subfusca cute fit. In ea tubercula sunt, verrucarum similia *Birdoo T. XIX. f. 1. 3.* sparsa *Morgagn. Adv. l. p. 10. T. 4. f. 2.* in apice perforata *Morg. VVinslov. n. 15.* & obfita acinis sebaceis *Morg. Adv. V. p. 13. Boebermer p. XVI.* ex quibus cera

secrenitur papillam defensora, pilii vero rarius prodeunt *Morgagn. Adv. IV. p. 4.* In iis tuberculis non raro lactiferos ductus aliquos minores definire vidit in nutrice *Morgagni Adv. l. p. 11. & Adv. IV. f. 2. c. c.* in fine angustatis, in media glandula dilatatis *Adv. V. p. 10. f. 2.* & serum quasi lactis edere, pressos, & lac, sed rarius *Verbeeyen p. 151. 152.* serum denique perinde & lac *VVinslov. n. 15. 16.* In meis, non numerosis, experimentis, ductus lactiferi omnes in papilla haerunt. An inde lac ex abscessu prope papillam aperto *Solmuth Cent. II. obs. 12.* Papilla denique etiam alias quas glandulas sebaceas proprias habet *Morg. Adv. V. p. 15.*

[12] Exemplum, ut vocant, in terminis, habetur in *E. N. C. Dec. I. ann. IV. obs. 15.* sed vide *DCXC.*

[13] Post inediā sanguis ex mammis fugitur, replentur eadem a pascu, & hilaritate *Diemerbroeck p. 245.*

eadem ratione, ac si spongia, lacte plena, in eas expressa foret. Vidi feminam, cui lac per totum biennium [14], absque intervallo, per mammas exstillavit, quae, quoties biberat, omne per ubera reddebat, &, nisi biberet, animo linquebatur. Eam peculiari methodo sanitati restitui, postquam toto biennio languerat.

§. DCLXXXIX.

Quod) Primum lac, quod a partu elicitur, odore & sapore alio est, quam lac quod sequitur; & purgante vi praeditum, meconium expellit. Hoc privilegio carent principum pueri, qui continuo, ubi lucem adspexerunt, fugunt lac nutritum, quae jam aliquamdiu lactaverunt, his ergo meconium retinetur, unde multa mala (1).

Lac) Humor inter humores corporis humani candidissimus, dulcissimus (2), ex quacunque materia paratus fuerit. Utrumque ab oleo habet,

- (14) Lactis tanta abundantia, ut post octo menses praeter eam copiam, quam puella consumebat lactando, duae librae quotidie emulgerentur E. N. C. Dec. II. ann. 5. app. p. 475. Duodecim pintae lactis singulis biduis & triduis in puerpera *VVeimrie*. In gravida mammae sponte per viginti septimanas lacte fluentes E. N. C. Centur. IV. obs. 131. Femina, cui per quatuordecim annos nunquam lac in mammas defuit *Bresl.* 1713. *M. Jnn.*

- (1) Lac recentis puerperae melius est pueris recens natis, quam lac, quod sexta a partu septimana genitum est *Mauriceau* p. 156. Ex lacte annuo, pingui & calcofo, aegrotant nuper nati pueruli E. N. C. Dec. II. ann. 6. obs. 7. Nam lac recentis puerperae tenuius est lacte aetate magis provectae, & serosius, minus oleotum, paulum stimulant, miluheritimum *Morgan. mechan. pract. of. phys.* p. 316. SPIGEL. l. c. HARVEI p. 104.

- (2) Hoc seculo causa & sedes hujus dulcedinis detecta est. Sal nempe essentialis lactis dulcis est, quem miror a *Præceptoris* in che-

micis experimentis non proponi: in patria vero mea magna copia parant. Auctor est *Lud. Testi* E. N. C. Cent. III. obs. 33. laudator ex primis *Aloysius della Fabra de artibritide*. In patria mea paratur ex lactis fero, absque acido parato, incoctis ovis. Separato coagulo serum continuo coquitur, ne acescat, inspissatur repetito trans linteamina adigendo, donec omnis viscositas abigatur. Tunc hoc tenue serum denuo coquitur, &, quamprimum cuticula adparet, ab igne removetur, idemque in frigore repositum crystallales ponit albas, sed ab aere flavas, dulces, neque acidas, neque alcalinas, neque cum utrovis sale effervescentes, in aqua solubiles, ab aere humiditatem non facile contracturas. *Conslavere* fuisse 1734. *A. M. J.* Haec praeparatio multo elegantior est, quam *Testiana*, qua fere sola evaporatione obtinetur sat dulcis, albus, friabilis, informis. An etiam norum hoc saccharum *Brachmanibus*? quos *Kaempferus* ait ex lacte saccharum educere posse.

bet, cum aqua diluto, quod ex cremore lactis adparet, qui carminatus butyrum exhibet (3). Id oleum a chylo est: adeoque pars chyli maxime oleosa, lac est, reliqua lymphæ. Non negaverim etiam spiritus (4) adfundi, & lac perficere, & aliquid forte conferunt ad eam dulcedinem, qua humanos liquores omnes superat. Crassius autem lac est lotio, tenuius (5) vero quam sanguis, & sanguinis serum, unde fit ergo ut urina vias lactis nunquam subeat? non certe absque necessaria conditione, quæ in partium fabrica latet, neque a sola canalis magnitudine pendet.

Serum) Quando lacti fervido aliquid acidum [6] adfunditur, coagulatur in unam & scissilem massam, quæ colostrum [6*] vocatur, & de vase in aliud vas transfundi potest, ut ne gutta quidem destillet. Quando idem lac stat, sibi relictum, secedit pars ejus in tenuius

E c 2

serum

[3] Et in emulsionibus artificialibus manifestissimum est: ibi enim oleum recens vegetabile cum aqua tritum alborem & dulcedinem lactis perfecte imitatur. Hoc oleum specie globulorum adparet LEEU- VVENHOECK. & pinguidinem lactis ex numero globulorum licet aestimare. In equæ lacte paucissimi globuli sunt, plures in nutrice BONANNUS *microg.* Plures in junioribus, pauci in vetulis *Lamsoni observ.* 79. E. N. C. *Dec. I. ann. I. obs.* 31. Hos globulos pellucidos etiam *Hugenius* habet in *dioptr.* 3. p. 175. & conf. CXXVII. Levitate sua secedunt, & stipati cremorem album dulcissimum efficiunt, concussione vero coacti, majori aquæ parte abacta coeunt in speciem solidioris olei, id vocant butyrum.

(4) Spiritus ad lac adiundi *VVbarton* p. 269. *Nuck adomogr.* p. 16. *Mazin Inst. med. mech.* p. 231. &c. Verum, uti hoc non negaverim, ita repudiare oportet spiritum ardenseum, quem passim reperio ex lacte destillari. Fabulæ origo est ex *Johannis de Luca* descriptione Tartari: ex eo *Purebas* habet, post quem a *Lafaro* repetita est de *bum.* p. 432. & a du *Haide*

destr. de la Chine V. IV. p. 46. *Disterius Strahlenborg.* Tartaros in pellibus lac equinum concutere, crassamentum exprimere, reliquum serum distillare, ita nasci ardentem spiritum, quem vocent *arcti.* Addit *Sibrand Lles* bis vel ter destillari in *rim.* p. 237. Verum apud eundem *I. de Luca* reperio, Tartaros lacti equino addere hordeum, & nunc demonstratum est, serum lactis non solum, sed cum fumento addito fermentari, adeoque farinæ vegetabili unice pro aqua esse *Comm. Lit. Nor.* 1742. *bodd.* 24.

(5) Neque enim ad ignem cogitur, sed exhalat.

(6) Ut notissimum est in albis, ubi unice utitur coagulo ex vitulorum ventriculis parato cum sale *Scheuchner* post *It. alp.* I. p. 56. *Boerb. Elem. Chem. Proc.* XC. Ab omni vero acido lac cogitur, etiam integri adhuc Galli flavi. Sed etiam in febre coactum legi *Sibrader obs.* 5. *Dec.* IV.

(6*) Colostra vel colostrum est primum lac a partu *Palladius* in *novembri* M. n. 13. *Spigel. de form. fet.* p. 17. &c. Tenuis, aquosum, albuminis colliquatū simile est *Harvei* p. 199. sensim crassescit p. 205.

ferum [7], ut vocatur: pars altera, caseosa, expresso liquido omnino in caseum abit, adeo durum, ut pene lapideus (8) fiat, sola repetita expressione per lintea, trans quae lapides inpositi lactis partem tenuiorem urgent, maxime, si butyrum prius separatum fuerit, neque enim caseus valde induratur, neque fragilitatem deponit, quamdiu butyrum admixtum habet. Serum autem adhuc multum habet particularum nutritiarum (9), inde enim homines robusti alii possunt, & ipse expertus sum, solo sero vitam trahi posse. Haec omnia, & de brutorum, & de mulieris (10) lacte vera sunt.

Exhalat) Non bene adeo seminae pueris prospiciunt, quando lac, quo puer alitur, ad ignem prius excoquunt, fere per horam, donec imaginariam, quam acculant, cruditatem deponat. Depravatur enim coquendo, amissa parte fluidiori, salubriori, multoque salubrius foret (11), si absque ullo igne, unice cum panis mica parvulis propinaretur.

Sponte)

[7] Scythae lac concutunt, secedit ad superiora butyrum (cremor), medium serum est, in imo densum quid subsidet, vocant Hippocrem *Hippocrat. apud voss. 3.* Ex lacte serum & caseus *Aristoteles hist. anim. L. III. c. 20.* Hoc serum aquam habet a chylo, & lympham a sanguine & itinere per ductum thoracicum.

[8] Vasa lactaria diuturniori usu obduncuntur tartaro lactario terrestri durissimo *Schouebzer It. alp. p. 59.* Lac in puero tabido specie tophorum egestum ex inferiori gutture BENNET *theatr. p. 73.* Calculus in ductus chyli cisterna, JE DRAN apud ILL. amicum BOHILIUM *de vitis lacteis num. 48.* Haec vera terra est, conf. PRAECEPTOREM *Elem. Chem. II. p. 301.*

[9] Aqua casei, (nempe sero lactis) ARABES plurimum urebantur MESUE p. 148. op. omn. ed. Juntin. 8cc. Sero & quidem macilentissimo SCHEUCHZER p. 61. porci in alpinis unice saginantur. Hydrogala per tres annos solo puella vixit MISC. BUCHNER 1728. p. 979. & I. FERGUSON octodecim annis aqua & sero lactis, & hordei decocto, vitam

aluit, ex nuperis Anglorum commentariis. De lacte vulgonotum est, podagricos maxime vitam unice lacte trahere LOBB. *de calcul. p. 270.* & phthisicos. Philinus, apud ATHENAEUM, dum lacte solo, absque ullo alio cibo vel potu vixit.

[10] Butyrum ex lacte femino etiam obdinetur BORELLUS *Cent. III. obs. 82.* ita tamen, ut lac humanum valde dulce sit & tenue, ferocius adhuc caprillum & eo tenuius asinum, vaccinum minus aquosum LANZONI l. cit. BOERHAAVE *Elem. Chem. II. p. 298.* demum lac femininum minus de acida, plus de putrescibili natura habet, homo enim est de gente carnivora. Non coit lac utrimque dentatis ARISTOTELES l. c.

[11] Vaccini lactis recens emulsi odor omnino perit sola quiete, & nubes est particularum facile visibilium, quae de calente lacte ascendunt. Hinc Phthisicis solet lac de mamma muliebri commendari sugendum, de quo nihil avocando perit. Caeterum calidius lac praestare, etiam HOFMANNUS auctor est in *physiologia*.

Sponte) [12] Intra sex horas, quando is, qui nunc obtrinet, coelo calor est (14. maji coelo satis aestuoso.

Inodorum) Quando de lactis proprietatibus respondendum est, omni-
no semper odorem explorate.

Chylus) Non tamen, qualis in vëtriculo est, cinereus (13), neque duodenalis chylus subflavescens, subamaricans (14), neque ilei intesti-
ni, candidus & dulcis, neque mesenterici similis, cui lymphæ tenuis
adfunditur, neque crudi, primumque in sanguinem admissi; verum chy-
lus, qui per pulmones transit, & cui lymphæ tenuis intime conjuncta
est. Neque enim alia via est, qua possit chylus ad vasa galactophora ve-
nire, nisi prius semel vel iterum per pulmones obierit circulum. Deinde
ad chylum aliquid (15) de sanguine materno accedit, multo chylo
crassius.

§. DCXC.

Graviditatis) Feminae plerumque post finem mensium imprægnantur
[1]: id confirmant numerosa experimenta in Galliis capta: ex centum
enim partibus omnino nonaginta & novem fiunt nono mense post menstrua
ultima, numerando post unam septimanam menses ultimos, & ab ea epocha
repetendo novem gestationis menses. Tunc enim uterus repurgatus & vacuus
est, & exhausta plethora, neque metus adest, conceptum adeo cito ex-
pulsus iri. Nunc concepit utero femina. Sed fetus primo mense parvus
& contractus est, hinc plethoræ materia, post tres septimanas reparata
(2) in uterum deponi nequit, adeoque sanguis regurgitans abit in vasa,
quæ cum utero communicant, & distendit mammas, & eo ipso signo,
etiam

(12) Magis læ animalium carnivororum,
sed & seminum. Recens autem
emulscum neque acidum, neque
alcalinum est, neque cum ullo
sale effervescent. ELEM. CHEM.
Proc. LXXXIX.

(13) Idemque nimis acidus.

(14) A bile admixta.

(15) Haec est pars mucilaginosa lactis,
& ab aqua, & ab oleo, & a sa-
le, & a terra diversa GUTER-
MANN. l. c. p. 14. quæ, sepa-
rato oleo & caseo, cum sero lac-
tis conjuncta manet, & repeti-
tis demum filtrationibus ita sepa-
ratur, ut liberati sales secedere
possint not. 2. Haec eadem &
major ab aditu partium adre-

natio facit, ut lac retentum pu-
rescat, maxime in genere car-
nivoro, caseus vero omnis spon-
te faecet, verminetque, & acris,
alcalinus fiat EL. CHEM. p. 101.
DCXC. not. 14. Hac re a vege-
tabilium emulsionibus differt: & in-
de forte natura lactis ab acido
coagulabilis, lymphæ alias sero-
que sanguinis propria, qua desti-
tuntur emulsa vegetabilia Elem.
Chem. II. p. 258. & Proc. 29.

(1) DCLXXVI. not. 12.

(2) Cum menses viginti unciarum sint
DCLXVII. not. 7. fetus vero uno
mense a conceptu tantum unius
drachmæ DCLXXVI. not. 3.

etiam prius, quam menses emanferint, dignoscitur graviditas [3]. 1732. quando primum tempus mensium emanit, tunc mammae intumescunt.

Partu) Tunc plethora, solita ferri ad uterum, eo nunc contracto, ad mammas refluit: &, quamprimum lochiorum copia imminuta est, mammae turgescunt (4).

Largiora) Pleraque feminae nobiles sperant se formae elegantiam conservaturas esse, si infantem non lactaverint. Verum nos quidem homines natura non sumus sapientiores. Sed NATURA nullas reginas creavit, neque dignitas civilis aliquid in corporis fabrica mutat: feminas ergo fecit DEUS, quas homines vocant reginas. Hae adeo reginae perinde tertio gestationis mense, & iterum a partu inflatas mammas habent, sed repellunt medicamentis id lac, quod debent puero. Hoc consilium, si feliciter evenierit [5], lochiis abundantibus reddit obnoxias, atque menstruis omni

[3] Impeditis quocunque modo vasis inferioribus, sanguis ad superiora regurgitat. Fetus non sanus est, si lac in gravida abundaverit HIPP. epid. II. f. 6. Apbor. V. n. 52. CELSUS L. II. c. 7. nempe plethoram ad uterum vergere necesse est, ut fetus incrementa capiat. Praegnantibus menses pauci vel nulli, nam lac ad mammas fertur HIPP. *peri gynaec.* c. MAURIC. p. 137. Et primo quidem gravidis paulatim mammae turgescunt, atque plerumque dolent, quod saepe graviditatis signum est DIONIS ib. p. 153. & lac incipit apparere, quando fetus moveatur MAURICEAU p. 92. ferofumque stillat DIONIS *des accouch.* p. 155. E. N. C. vol. 4. obs. 66. aliquando vero etiam in gravidis verum & copiosum adest E. N. C. Dec. II. ann. 2. obs. 99. (aliquando tamen nullum SCHURIG. *syllaps.* p. 416. 417.) Hinc mortuo fetu mammae gracilescent HIPP. apbor. VI. n. 39. LANG. *epist.* p. 670. MANNINGHAM p. 19. Simili modo a mensibus iubito suppressis repentinus mammarum tumor successit Lanzoni obs. 190. & vetustus aphorismus est, si mulieri neque praegnant,

neque puerperae, lac in mammas fuerit, ei menses desunt Hipp. apbor. V. n. 39. Et vicissim, a mensibus vel haemorrhagiis mammae gracilescent LOMM. obs. L. 2. E. N. E. Dec. II. ann. 4. obs. 154. Sed etiam in hydropse, qui pro graviditate inposuerat, mammae innumuerant Schaeber *de virg. obst.* p. 23. & cum mola lac in mammas fuit Hipp. *peri gynaec.* MAURICEAU p. 114. Fick *Comm. Nor.* 1732. h. 20. Invenio equidem Littrianam seminam Mem. de l'Acad. 1702. & quam descriptit Cyprianus, & eam, de qua Calvi agit *bist. de l'Acad.* 1714. cum fetibus tubariis nullum in mamma lac habuisse, sed hoc ad miserum statum refero, in quo hae feminae seum extra uterum habentes, victuaverunt. Deinde cum mola lac adeste negant Dionis *des accouch.* p. 184. Fesb. *de mola* n. 22. Verum obposui experientia, & iste fatetur, uti nec ipse vicissim negaverim, hoc lac aquosum esse.

[4] DGLXXXVII.
[5] Nam inter causas est inflammationis uteri & funeularum febrium puerperalium. Confer de aoxis lactis repulsi Bollingerum in append.

omni mense recurrentibus . Quae vero infantes lactant , eae lochia [6] minus copiosa patiuntur , & omnia puerperii symptomata mitiora , mensesque [7] omnino nullos , quamdiu lactant .

Lactis) Corpora feminina arterias & venas omnes , & imprimis uterinas & mammarias adeo laxas nata sunt , ut omnis pars sanguinis , quaecunque ad obeundam per corpus circulationem minus apta fuerit , continuo , vel ad uterum deponatur , vel ad mammas , magis vero ad mammas , a quibus resistantiam suctionis aufert : idem enim fere suctionis , qui *Boyleanae* antliae effectus est [8] . Tanti certe suctionis est , ut mammae siccae maneant , nisi exsugantur . Haec causa est , quare chylus , nondum [9] adfectus permeandis vasis humanis , adeo facile in mammas illabatur .

Sponte vix) Raro id contingit , ob rationem jam propositam , & collapsam substantiam cavernosam papillae , quae ductus lacteos comprimit . Quando vero puer sugit , remouet a papilla pressionem externi aeris , expanditur substantia cavernosa papillae , & sanguis eo ruens inplet cellulas , aperitque ductus galactophoros , in quos nunc lac facile subit , detractum sugendo .

Salu) Aliquando ad unum , & duos , & tres nonnunquam pedes [10] . Ratio haec est . Papilla sibi relicta vix dimittit lac , & connivente spongiosa fabrica sua constringit oscula vasorum galactophororum . Quando vero papilla , per suctionem titillata arrigit , percita quadam tentigine , tunc recedit fabrica spongiosa a ductibus lacteis , & per istos , nunc liberatos , lac exsilit .

Acescat) Quia chylus est , crudusve humor , chylo proximus [11] .

Viris] Exempla habent SCHENKIUS , DONATUS in historia medica mirabili , & alii , qui de mulieribus scripserunt . Neque hoc nobis debet mirum videri , nam viri chylum conficiunt , qui pene lac est , & solo lacte

[6] DCLXXXVII.

[7] Nutrices vix menses patiuntur , *Arist. bist. anim.* L. X. fin. certe vix , nisi post octodecim a partu menses *L. Bourgeois* I. p. 165. Viscissim lac , si quando in menstruatis fuerit , malum est lac . *MOTTE obs.* 27. Aliquando tamen cum lacte etiam menses fluunt , forte in valde plethoricis *Lamy in diss. anat. Orilob. oecon. part. p. 107. Harder. prodr. phys. c. 10. Conf. DCLXV. not. 2.*

[8] DCLXXXVIII.

[8] Cojus glebuli & majores & laxiores sunt , quam sanguinis globuli , ex utraque causa impermeabilis .

[10] Ex plenis vasis utique humor cum salu exsilit , etiam ex salivalibus , ut vulgo notum est .

[11] Panis & pleraque vegetabilia acrescunt . Hinc chylus acidus est , & in ipso sanguine vestigia hujus acidae indolis supersunt . Pus ipsum acidum elicit *Quesnai de la Saignee* p. 169. 195. Formicarum succus cichorii subestit

lacte natrimur omnes (12), quocunque prius usi fuerimus cibo, prius enim quam nutriat, chylus in lac abit. Deinde viri habent mammas, papillas [13], areolas, eodem loco, & eadem fabrica factas, quae in feminis est, unice minus laxas mammas, & minus turgentes humoribus. Ergo si vasa mammarum, quae in utroque sexu eadem adfunt, in viris dilatata fuerint, lac in mammis certe nascetur. Vir fuit, pauperculus (14), cui carissima conjux mortem obierat, reliquerat infantem, qui mamma sua privatus noctes, dielque ejulabat. Miseratus puelli pater, adplicuit propriae mammae, suxit infans avide, atque adeo vir in nutricem evasit.

Virginibusque (15) Ratio eadem est. Hic Leidae exemplum continet. Ancilla honestissima, quae neque conceperat unquam, neque pe-

Rai Phil. Trans 68. In carnivoris autem animalibus, canibus, felibus, leonibus, lac acie & urinofum est *Boerhaav. Elem. Chem.* II. p. 157.

- (12) Chylo nempe, qui aliquamdiu lactis habitu per sanguinem circumferitur, donec serum fiat cxxxviii. &c.
- [13] DCLXXXVIII. Aegyptiae omnes mammosiores P. ALPINUS *bist. anat. aeg.* I. p. 14. b.
- (14) Simile exemplum repeti apud S. Boerhaave *observ.* p. 194. & aliud ex Santorello apud *Diemerbroeck.* p. 249. Sed in universum lac ex virorum mammis stillasse plerumque aquosum, serosum, auctor est *Aristoteles bist. anim.* L. III. c. 20. Virorum papillis adcretae ros aliquis effluit *Iasma Praet. de utero* p. 111. Lac de mammis virorum stillare viderunt *Lacuna* apud *Rod. a Castro de nat. mul. praef. Carpus* (ad uncias quatuor una vice emulsa) p. CCII. b. *Cerdanus de subit.* L. XII. *Vesalius* p. 678. *Cyprianus* p. 19. *Helovig. Franciscus Maria Florentinus* libello proprio E. N. C. Dec. I. ann. 3. obs. 86. & iterum ann. II. obs. 115. Cent. I. obs. 86. Vol. 4. obs. 68. copiosum *Keil.* p. 117. *Morgagnus Adv.* L. p. 11. V.

p. 3. *Ill. Teichmeyer. med. for.* p. 38. *Venetie* p. 51. in medico, *Lanzoni animado.* 31. & de se ipso testis est *Bianchi apud Monget. theatr.* II. p. 174. apud *Rufos* vero frequenter viros lac in mammis habentes repeti *Duvernoi Aët. Patr.* Vol. III & in *Africa Charleton.* Vide compilationem ex C. Gemma, aliusque apud *Marcellum Donatum* p. 610 611 *Cornelium Constantium* p. 104 & *Francum Sat.* XV. In capro, lac *Aristoteles* l. c. cum mammae urtica confricarentur. In lepore maie lac E. N. C. Dec. III. ann. 5. 6. obs. 88. Canes & feles mures, qui catulos aluerint proprio lacte *M. Donatus, Boerhaave* l. c. p. 200. Tres hircos lac exhibentes mulgentibus terio recenset P. A. *Martiniolus epist.* p. 144. & alium hircum *Lentilius E. N. C. Dec.* II. ann. 3. obs. 130. & *Schvumkfelt theoriotr. filis.*

- [15] Lac in virginibus nullum esse *Aristoteles* auctor est, qui negat lac nasci, nisi femina vero iulerit *Hist. anim.* L. III. c. 20. Sed aliqua tamen passim exempla in contrarium reperiuntur in feminis, neque gravidis, neque puerperis E. N. C. Dec. Lann. III. obs. 116. *Harder. prodr. phys.* & cuniculis Vol. 2. obs.

pererat, cubabat cum herilibus infantibus, leſti ſocia. Pertaeſa nocturnarum ejulationum, & ſomni experts, adplicuit tenerrimum infantem uberibus virgineis. Suxit puer verum lac, atque repetito conatu nutricem fecit, quae experts fuerat conjugii. Re detecta, ſuſpecta habita eſt temeratae pudicitiae, atque recentis puerperii: ſed honorem adſeruit accurata inſpectio, obſtetrices enim unſque veſtigia partus facile reperiſſent.

Factus) Omnis recens natus infans, quotquot vidi (16), ſive mas, ſive puella fuerit, mammas lacte turgidas habet, & papillas erectas, duriffimas, quas emulgendero, & exprimendero, vel exſugendero, nutrices

evacu-

obſ. 121. In virginibus exempla habent *Alex. Benedictus*, a *Vega Foreſtus*, *Corn. Conſtantinus* l. c. *T. Barth. hiſt.* 27. *Cen. I. Salomith.* obſ. 92. *Cent. I. Mangſtus* l. c. p. 272. *Morg. Alu. V. p. 3.* & c. l. ſectionem habet *Cl. SCHACHERUS Polycarpi* f. in *progr.* & *FRANCUS Sat. XV.* Virgo nigrata puerum lactavit *Ponetta* p. m. 51. 52. Caſellam, quae nunquam pepererat, ſells ita emulſit lactando, ut lac daret *Kerkring.* obſ. 21. & in eapra virginis ſimile exemplum habet *Graeven. acon. anim.* p. 218. tum *Boccone* l. c. p. 201. *Schur. ſylleps* p. 412. In vetuſtis vero *Ariſtoteles* l. c. exempla refert. In vidua quinquagenaria *L. Burgeni.* ſe p. 9. & *E. N. C. Dec. III. ann. 7. 8.* obſ. 86. in femina 64. annorum *Murali. coll. anat.* p. 56. Quinquagenariae nutrix *Henn. ab Heerſ.* obſ. 14. Sexagenaria nutrix *I. M. Hofman. E. N. C. Cent. X. 27p.* obſ. 44. In femina 68. annorum lac ea copia natum, ut gemellos nutritiverit, *Phil. tranſ. n. 453.* & in octogegenaria, ut puerum aleret *AB. Suar. 1733. p. 86.* Avia nepotem lactans *Duemerbroeck.* ex *Santorello* l. c. Conſer. exempla apud *Morbiu* in *phyſiol.* p. 568. tum *Bartolinuſ* *Diſſ. med. p. 250.* & *Francuſ* l. c. Nonigno-

ro *Cl. Mannenſhamuſ* fluorem ſerofuſum ex mammis ſeminarum a recentis menſibus ſtillantem una pro lacte habere p. 45. quale ſerum acre ex mammis virginis deſcribitur in *E. N. C. Dec. III. ann. IV. obſ. 81.* Sed verum lac eſt, quod pueros nutrit.

[16] Res ipſa undique conſtitutor. Serum tenue in turgidis mammis puerorum eſſe, & poſſe exprimi *Spigelius* l. c. c. 16. primus inter eos vidit, quos legi, deinde *Riolanus* p. 409. *Barbottinus epiſt. ad Horſt.* p. 86. *Harveii exerc.* 53. *Bohn.* p. 27. *T. Cornelii Conſ. progr.* VI. *E. N. C. Dec. I. ann. 8. obſ. 86. Vol. 5. obſ. 151. Breſt. 1724. p. 216.* pro re nova *Morg. Alu. V. p. 3. Fanc. Mar Florentinus* l. c. *Gutermann. Comm. Lit. 1734. bebſ. 16.* *Hebenſtreit progr. ad anat. mul. Lauſon. obſ. 65* conſ. *Francuſ* l. c. p. 249. Neque ſubito haec proprietates evaneſcit: nam in triduano puero *Buchner. miſc. 1729. p. 189.* *Spigelius* l. c. in trimeſtri ſilia lac vidit *Graeven* p. 127. in puella octodecim ſeptimanarum copioſum lac fuiſſe legitur in *E. N. C. Dec. II. ann. 9. obſ. 139.* in bimulo ſtatre lac in mammis vidit *VKinnelovv. Expoſt. IV. n. 24.* in novenni puero *E. N. C. Dec. III. ann. 7. 2.*

evacuant, ne stagnans (17) liquor noceat. Tunc perfecte humor exsilit, qualis in mammis matris est, primo a partu die. Bos enim, postquam vitulum enixa est, altera die lac dat emulsi, vocant *dieß*, insigniter diversum a lacte, secundum naturam habente. Hujusmodi lac etiam in mammis fetus est, & etiam exsultum aliquoties redit, donec post aliquot dies exsiccerur, uti in seminis, post ablationem, lac evanescit. Unde hoc fit, & cui bono? Causa manifesta est, licet a nemine explicata fuerit. Fetus mammae semper lacte pellunt, quando recens in lucem editus est, & miri morbi sunt, nisi expressum fuerit. Videtur hoc modo responderi posse. Quidquid glandularum est, id in fetu majorem longe molem (18), quam in adulto, obinet. Thymus [19] in fetu pulmonis lobo non multo minor est, & habet ingentem aperturam, qua in oesophagum aperitur, eoque lac deponit, certe ita se reperisse scripsit ad me magnus inter nunc supersites Anatomicus. Sensim autem minuitur, ut in adulto nullus (20) superfit, & perit absque vestigio glandula, adeo ampla, quae in fetu requirebatur, in adulto homine inutilis est. Ita etiam mammae in recens nato magnae sunt, in utroque vero sexu dispereunt, ad pubertatis annos usque, nam eototo tempore puellae mammae nihilo pueri mammis ampliores sunt. Utilitas autem hujus lactis in fetu secreti obscura est. An infans se ipsum in utero fugit (21)? flexilissimo enim, dum in utero habitat, corpore est, & ledet capite prono, & incurvato. Consului de hac re RUYSCHUM, rescripsit, se lac perinde in mammis fetus reperire, inquisitorum autem esse, an omnino sugat, si fortuna fetum vivum in matre mortua spectandum offerret. Sed ab eo tempore nulla opportunitas oblata est, & illum nunc fata abstulerunt. 1732. An secernitur ex mammis liquor, qui in cavitatem amnii effunditur (22)? Videtur hic aliquid subesse incogniti.

Solum) Qua lac chylo proximum, neque haftenus in alcalescentem naturam, humoribus nostris propriam, degeneraverit.

Cremo-

- | | |
|--|--|
| <p>7 8. <i>obs.</i> 86. In minorenni puero <i>Bartolinus anat. renov. p. 333.</i></p> <p>[17] Et spoliemata faciat <i>Spigelius l. c. Gutermann. l. c.</i> Receptum esse, ut exprimat serum de infantum mammis <i>Mauric. obs. 189.</i></p> <p>[18] DCLXXXII. not. 9. 10.</p> <p>[19] DCLXXXII. not. 11. De ductu vero, quo in oesophagum pateat, nihil inaudivi, neque probabile videtur.</p> | <p>(10) Exiguus, missus, & obrutus pinguedine.</p> <p>(21) Ita scite <i>Bidloo Exerc. V. D. c. II.</i> verum m. hi haec ambages vilde inuiles, & absque exemplo videntur, receptum nempe semel succum, iterum ex corpore excerni, ut denuo ore receptus in alimentum cedat.</p> <p>(22) BOHN. p. 29.</p> |
|--|--|

Cremorem] Adparet ex chemica emulsione. Quando amygdalae, hordeum, oryza, cerealia reliqua, vel semina cucurbitacea, frigida vulgo, majora, & minora, teruntur cum aqua, oleum miscetur aquae, & fit perfectus chylus. Quando lae istud sibi relinquitur, sursum intra quindecim horae minuta secedit cremor, serum ima petit, eadem fere ratione, in homine, oleosa ingesta cum tenui lymphâ trita, in chylum abeunt. Caseus vero in emulsione nullus est, neque enim hic ex chylo generari, sed a lacte materno secedere videtur (23). Hinc ex lacte crudissimo caseus minus bonus paratur, & ex eo demum lacte optimus ille caseus, quem Vallones vocant *Remondou*, parari potest, quod diu in materno sanguine manserit. Hic caseus destillatus eadem principia edit, quae ex cornu cervino, vel ex humano sanguine per ignem obtrinentur: & in solo aere caseus per temporis moram ita putrescit (24), ut prae acrimonia causticus fiat, cutemque inpositus, erodat. Hujusmodi etiam casei parantur in Hollandia boreali.

Tempore] Vulgus persuadetur, multique cum vulgo medici, lac unum, definitum suis proprietatibus, liquorem esse. Verum, uti urina, ita lac, omni fere hora aliud fit. Experimenta feci, maximo cum successu. Si mulier, quae tota nocte siccilofum infantem lactavit, eo toto tempore nihil biberit, mammas habebit flaccidas, sitim vero patietur maximam, & solent dicere nutrices, nulla majori voluptate se adfici, quam a potu, sub ea tempora hausto. Si vero nihil biberit, & tamen puerum matutinis horis mammas adplicuerit, requiet iste lac ingratus. Bibat tunc, continuo flaccidae mammas turgebunt, & infans avidus lac hauriet, quod non fuit in sanguine cum iis qualitatibus, eum quibus ab infante fugitur, adparuisse enim, si tale adfuisset, sed a potu, post unam, alteramve circulationem dilutum, & mutatum, in ubera venit, neque ideo totum crudum est, eum pars circulando praeparata admista sit.

Communicet] Quod nutrix peceat, infantem necesse est luere, purgari, si purgans medicamentum adsumserit, laborare, si spiritum vini ingesse-rit. Id vero tunc fit, quando ubera inania fuerunt, non perinde, quando edit, vel bibit mammis jam parato lacte turgentibus: si enim mammae plenae fuerint, infans, etiam si nutrix vinum biberit, continuo mammae potest adplicari, neque enim novum chylum, sed lae extrahet, pridem paratum. Quando vero fugit ex inanibus mammis, recentissime repletis mero potu, sitibundus, & avidus, venenum adtrahet. Vidi nobilem puerum, cui sanissima nutrix erat, horrendas pari convulsiones,

F f 2

nul-

[23] Non repugno, terram, quae cum cibis accipitur, uti salivae, & urinae, & bilis, perpetua comes est, ita lac comitari DCLXXXIX.

not. 8.
[24] Eriam lae putrescit, & verminae
BOYLE *exp. phys. med.* cont. p.
133.

nullam causam tanti mali reperiēbam in tenello corpore. Sed adflare vidi aegro hilarem, & quasi temulentam nutricem, & rogavi, num biberit? affirmavit. Porro interrogavi, quo tempore postremam mammam puero exhibuerit? reposuit, id a prandio factum esse, iterum quæsi, an prius puer bene valuerit? affirmatum est. Ergo contuli ructus, & convulsiones pueri cum confessionibus nutricis, & accurate vidi, puerum ebrium esse, ea vero ætate ebrietas pene lethalis est, & difficillimum expertus fui laborem, ut omnibus ex arte factis puerum servarem. Persuadeor omnino, in aulis & apud ditiores, ab his meracis nutricum potitationibus longe frequentiores, quam creditur, puerorum mortes accidere, atque adeo frequentiores primariorum puerorum morbidas, debilesque constitutiones. Casus funestus in aula accidit; Medicus nutrici principis medicamentum purgans exhibuerat, & negligentior, oblitus fuerat monere, ne continuo, neve ante octavam a sumto pharmaco horam principem puellum uberibus admoveret. Inscia adeo misera lac præbuit principi: is suxit avide totam ex nutrice vim pharmaci [25], inciditque in hypercatharsin, qua exstinctus est. Si monuisset medicus, quod hic moneo, extra omnem fuisset culpam. Contrario vero errore medici, sæpe lactuca, vino, cerevisia, & reliquis acidis nutrici interdiciunt, quæ tamen nutricibus saluberrima sunt, cum unice oportuisset monere, ne continuo a pasto, hujusmodi crudis cibis adsumtis, nutrix, cui mammae inanēs sunt, infantem mammis adplicaret: ea enim omnia lac octava postea hora adsumtum minime corrumpent. Quando vero mulier tota exhausta, cerevisiam meracissimam bibit, ex eo genere, cuius cadus octo, & decem florenis venditur, mammae utique lacte plenas habet.

[25] Exempla passim exstant. Infans purgantis, quod mater adsumit: effectus passus T. BARTHOLIN. *Cons. II. obs. 53.* MARTIANUS apud LANZONUM *Vol. III. p. 484.* Ex esu gratiolæ lac vaccarum purgans, & ob eam causam aliqua Ebrosus, (ubi omnino plurimam crescere vidi) præneglecta VIRIDET *de prim. coll. L. I. c. 15.* Lac amarum ab ab. finio A. Hujus. *Ann. II. obs. 61.* Lac ovium Plovinciæ rhyum, redolet Zbod. *Gall. ann. IV. M. Mart. Croci in lacte color Lanzon. anim. 31.* Lac vaccarum in prægnatum alii viribus Lobb. *calcul. p. 167.* & vulgo notum.

est, cepæ alpinæ tenuissolæ sapore quorundam montium buyrum, & ipsos infici caseos. Hæc demonstrati, lac de chyli natura multa retinere. Sed morbi a matre in infantem transeuntis vicissim demonstrati, mutum etiam de materno sanguine in eo esse. Febricitanti lac corrumpitur, & flavum fit *Elem. Chem. II. p. 303.* Lac in lue boum tenue, flavum ib. p. 303. Icterus cum lacte in puerum transit E. N. G. *Cent. 1. obs. 90.* & de lue passim experientia leguntur. Aliquando tamen video drissimos morbos maternos, lactenti puero vixi nocere. Vidi in febre miliari, in lue

habebit, & sentiet pressiorem novi chyli, ad mammas vergentis (26). Si vero tunc puellum uberi adplicuerit imprudens, convelletur infans miris modis, & verissime ebrius erit [27]. Ita saepe ex culpa bibacis mulierculae, miselli pereunt. Nam cerevisia, & alii meracioris cibi, vix mutati ad mammas fluunt, omni nunc fere exhaustas liquore.

Optimam] Aliquot a partu horis lac optimum est, neque crudum, cum duae sanguinis unciae intra viginti quatuor horas 14400ies circulationem obeant, atque adeo numerosissimis vicibus chylum per pulmones ivisse necesse sit, qui quarta hora ex mammis exsugitur. Hoc ipso tempore fetus, qui alimento eget, mammis optime adplicatur.

Abominabile] Si nutrix, viginti quatuor integris horis neque ederit, neque biberit quidquam, quale jejunium sectae aliquae, antiquissimos ritus secutae, imperant adseclis, & aliquando etiam nostris accidit, si febris aliqua adhaesit ad cibos nauseaverint; tunc lac habebit nulli infanti potabile. Si octava matutina nutrix cibum sumserit, infans ad decimam horam a meridie lac admittit (28), post eam horam, & nutricis jejunium quindecim horis longius, refugiet mammam, si mater voluerit admove, & perget ejulare, frustra oblatis uberibus. Hoc adeo vetustum lac, emulsum adparet dilutum, subflavum, salum, Belgae nomine ab aqua marina desumpto vocant *braack*. Hae lactis mutationes explicatae minime difficiles sunt. Omnis fere chylus noster, & potus accescit, & oleosam indolem habet, sed vis corporis humani destruit omne acidum, oleum vero omne aduenat, & utrique inducit naturam nostram saliam, quae vergit in salum urinae elementum. Ita homo, qui lac vegetabile bibit, non lac, sed urinam minget, flavam, saliam

loc venerat matres pessime adfectas, innoxium lac praebuisse parvulis. Vaccae rabidae lac minime malum E. N. C. *Pol.* VI. p. 321. & a matris peste decumbentis lacte nihil in infante mali *Stalpart. van der Wiet. Cent. I. obs. 99.*

- (26) Quasi ad modum saepe superne, ab axillis adtraheretur STAHL. Dolores a dorso versus manus, lactis iter demonstrantes DIERMBROECK, p. 242.

- (27) Vinum nigrum sincerum ex mamma *Lanzoni obs. 111.* E. N. C. *Dec. III. ann. 4. obs. 75.* & cassia *Kobblers apud Horst. Epist. X. Zood. Gall. l. c.* & cerevisia E. N.

C. *Dec. I. ann. IV. obs. 15.* Ex cerevisia a nutrice summa pueri hydropicus *Bartholinus l. c.*

- (28) Lac intra duodecim horas perfecte paratum est, his enim vaccae de die emulgentur *Elem. Chem. II. p. 300.* Diutius secentum, & in vaccis corrumpitur, & in feminis atque scilicet indurefcit. Flavissimum in insaniticide mammae, & parum fluxile vidi. Inde etiam, quod febrientes & esurientes lac tamen habeant, demonstratur, lactis partem non minuat, ex humanis liquoribus esse. An soluta pinguedo? Ita *Hofman. Physiol.*

fallam, ut omne illud blandum, dulce, album lactis penitus deletum sit prius, quam chylus per vasa renalia transeat. Eadem ratione chylus, quando viginti quatuor horis per maternum corpus circulationem obiit, abit in ichorolum, salsum, urinosum lac, quod oblatum puer non solum respuit, sed fere in convulsionem incidit, adeo irascitur tam horribili alimento, quod ipse fieri vidi, cum nutrices nausea febrili laborarent. Si vero cum adeo malo lacte, nutrix pitifanam hordeatam biberet, aut cerevisiam, continuo bonum lac redderet.

[*Vidui*] Infantes raro alio; praeter lac, cibo utuntur; ergo quidcunque tenellis acciderit, causam suam in lacte oportet habuisse. Quando infans variolis, aut ardente febre laborat, tunc convenit lac acidulum, & ejusmodi etiam alimentum nutrici dare oportet. Abilineat ergo ab ovis, a piscibus, & carnibus, haec enim calefcent omnia, & putrescunt; deinde a salinis, & biliosis. Nam etiam sponte febris nimis profunde haeret, & si eo tempore nutrix opipare viveret, affatis carnibus, atque meraco potu uteretur, flammae certe adfunderet oleum. Si vero tenui victu usa fuerit, lacte v. g. ebutyrato pro potu, & pitifana, pro cibo vero pane, milio, oryza, avena, tunc pulchre habebit infans. Porro in hoc casu, infantem continuo a pascu, vel non serius quam semihora, nutricis mammis oportet admove, ut quam crudissimum chylum forbeat, ante quam acescens adsumtorum indoles superata sit. In hoc enim malo, quando alioquin vis vitae super legitimos fines in infantibus valet, ea dare oportet, quae hunc adritum doment. Si vero in infante pallor adfuerit, morbus frigidus, & acidus, & anima, sudorque, & alvi faeces acorem spiraverint, & tormenta infesta sint, nunquam malum ita sanabis, quin perpetuo recrudescat, nisi lactis materni acidam indolem mutaveris, neque obtinebis fidelem victoriam exhibitis cancerorum lapidibus, semper enim renascetur, atque ad mortem usque molestum erit acidum. Ergo pene integre pane oblineat nutrix, pisces edat, carnesque, & bibat rubra, meraca vina, neque mammam praebeat puero, nisi sexta a pascu hora, quo tempore adsumta fere in naturam nostram abierunt.

[*Bonum infantis*] Medici aulici, quibus infantum regionum nutrices eligendi munus incumbit, solent lactis guttulam in cochlear aureum, vel argenteum, destillare, tunc, si consistit gutta, lac pro bono, & cocto habetur. Porro colorem subcaeruleum esse (29) oportet, album enim lac nimis crassum est. Sed odor omnis debet abesse & sapor salisus omnis, atque dulcedo apparere, qualis in saccharo est. Verum
his

(29) Lac albissimum, medioeris consistentiae optimum est *Mauriceau* p. 528. & melius semper, quod

tenuius la *Morte* l. c. 33. *Hofmann* in *phys.*

his omnibus optime constitutis, misere tamen falli potest medicus. Vidi optimas nutrices rejeſtas fuiſſe, & eleſtas peſſimas: nam cum fortuna nutricum, & totius familiae ab ea electione pendeat, vix aut edere audent, aut bibere, ante explorationem, ne forte aliquid in cibo vel potu admittant, quod laſti noceat. Deinde anxiae accedunt. Sed cum his conditionibus lac feminae ſaniſſimae ſaluum erit, & aliquid habebit de urinae odore. Cum huiusmodi nutrix mihi exploranda, permitteretur, juſſi edere & bibere miſeram, & poſt aliquot horas redire, rediit onuſta lacte optimo.

§. DCLXXXI.

Dilatat] Omni modo nititur infans, ut aerem capiat (1) DCLXXXV & talpa modo movetur per omnes anguſtias, quod matres & obſetrice experiuntur, neque queſcit, niſi fatigatus. Nunc hunc ſetum aer ex-
tus adluit, ergo, quamprimum peſtus dilatavit, momento citius ſubi-
bit pulmones (2), & ita mutabit (3), ut per totam vitam hujus
mutationis effectus ſuperſint. In hac prima reſpiratione prima aqua
& mucus ex naribus, & ore ſetus erumpit, in ſecunda vero inſpira-
tione, jam aer pulmones ſubit.

Explicat] Egregia habemus de hac re (4) experimenta, cum in pri-
mis inter duos celebres anatomicos Amſtelaedamenſes controverſia exar-
ſiſſet, & magiſtratus inperium accederet; tunc enim tota res ex imis
exculſa eſt. Femina extra conjugium puerum pepererat, is mortuus re-
pertus eſt, & mater infanticidii accuſata. Cum autem aliqua vacillatio
eſſet, & rea ſcelus perſcribere negaret, atque contenderet ſetum ſuum
in utero perſiſſe, quaſiſvit ex medicis Magiſtratus, an poſſent hoc du-
bium ex arte ſua expedire. Annuerunt medici, re perpenſa, atque edi-
xerunt, ſi ſetus ante partum in utero mortuus fuiſſet, tunc pulmonem
in aqua fundum petiturum, (haec autem reae deſenſo erat), atque
adeo

(1) Caſtellus caeſrea ſectiōe exciſus
continuo haviit, & reſpiravit *By
le exper. phyſ. morb. p. 41.* Cur
vero ſetus primum reſpirat? Na-
rie reſponſerunt varii *Trayſonius*
irritationem adducit ſaecum alvi
& partus vehementem motum,
hinc natam in ſanguine luſtam p.
56. 57. *Govanmerdamus* neſcio
quam irritationem diaphragmatis
ab humoribus, neſcio quibus, ſan-
guinis admixtis ſupponit p. 73. *Pit-
carnius* ab acris pondere, & cla-

mere deducit nitente in pulmonem
ſetus aere deſtitutum, ſic reſti-
tuerit acquilibrium cum aere ex-
terno, ut peſtus nunc dilatari
queat. Mihi evidens videtur eſſe,
quod vagitum molitur, in loco
incommodo, ubi varias adſiſti-
ones patitur, adſuetus molliſſimis
aquis, a frigoris contactu ſec.

(2) DCLVII. not. 3.

(3) DCLVII. not. 3.

(4) DCLXXXI. not. 1.

adeo crimine matrem liberaturum fore. Si vero idem fetus vel semel respirasset, atque adeo vitalis editus fuisset, tunc, aiebat peritissimus medicus, fore ut pulmo in aqua nateret. Experimentum factum est; & pulmo innatavit. Contra conclusionem vero medicorum patroni causae magnam vim dubiorum moverunt. Verum recte omnino medici. Quamdiu fetus in utero vivit, aerem nullum haurit, hinc pulmo fundum petit; quando vero respiravit, tunc aquae innatat. In ipso fetu, si quidquam inanitatis esset, pulmo nateret, caro enim sanguinis pondus non superat, qui tantum una duodecima parte pondus aquae excedit (5). Verum totus pulmo fetus una, continua, compacta caro est, & frustra certe embryo elevarer pectus & septum deprimeret. Nullus enim adest aer, qui subeat, & ipse potius liquor amnii in os fetus influeret, & si fieri posset, ut uterus dilaretur, ipsa ea aqua vesiculas pulmonis repleret, uti aer solet. Quando vero aerem hault infans, totus pulmo inflatur, & unita etiam inspiratione ita disponitur, ut nunquam hanc conditionem penitus amittat. Nam etiam si pulmones, quos in vacuo Boyleano aere privasti, tamen supernatant aquae, neque unquam subsidunt. Ergo respiratio pulmonem specificè leviores reddit: nempe facit, ut distantia vasorum sanguineorum augeatur, & minimi extremi fines bronchiorum, atque Malpighianae vesiculae se invicem recedant, & omnes arteriae pulmonales in eadem ratione ampliores reddantur, in qua thorax dilatatus est, & liquida pro portione totius massae, minorem rationem habeant; (1732. evacuari arterias, & generari in ipsis vacuum Boyleanum, & una cum bronchiis ita distendi, ut majorem angulum duo rami intercipient, medius vero ductus arteriosus distrahatur.) Nisi enim vasa sanguinea inter se magis, quam prius, distarent, nulla ratio esset, quare nunc pulmo non, ut prius, subsideret. Nunc, cum fistulae & vesiculae aereae magis expansae sint, etiam rubra pulmonis vasa ampliora (6) erunt, quam pridem, & venae perinde, uti arteriae, amplae fient, & sanguinis auctarium, quod arteriis pulmonalibus receptum erit, premet in sanguinem

(5) CCXXIV. not. 1. Omnes partes corporis humani fundum petunt, totusque, ut saepe vidi, embryo Vis putredinis vero facit, ut innatet, neque certius corruptionis signum est. Sed pulmo fetus nihil habet, quo differat ab aliis, quacunque parte corpusculi. Superest, ut mergatur. MAZINUS pulmonem 4. mense se ad aquam habere invenit: 182. 174. &

quinto mense: 1: 504. 454. l. c. diff. VI.

(6) Fetus pulmo brevissimus est, & septum altissime ascendit, *Picblin de aer. & alim. def. c. 8.* magnam enim molem tunc hepatis habet, & plena meconio intestina. Exigui thoracis non exiguam partem thymus replet, Pulmonis ergo vasa angusta, compressa esse, necesse est, magis quam in

guinem venarum. Ergo sanguis cordis dextri, expulsi in arteriam pulmonalem, non eam, quam solebat in compacto pulmone, resistantiam nunc invenit. Non ergo tanta portio sanguinis per canalem arteriosum in aortam irrui: nam ex pulmonali arteria in ductum arteriosum, ea tantum sanguinis portio venerat, quae majorem in pulmone, quam in aorta resistantiam invenerat. Nunc subito pulmo insigniter expanditur, ergo plus recipiunt rami arteriosi pulmonis. Quo autem hi plus accipiunt, eo plus per venas pulmonales redit in cor sinistrum. Nam expansio pulmonis aerei periade sanguinem ad cor sinistrum premit, uti arterias expandit. Ergo quanto major portio sanguinis per pulmones venit, eo plus transit ad cor sinistrum, eo plus sanguinis arteria pulmonalis a dextro corde, ab ea vero arteria sinistrum cor accipit, tanto nempe copiosiore, quanto arteriae pulmonales magis quam prius expanduntur. Nunc in secunda respiratione sanguis omnis per rarefactos pulmones, & arterias pulmonales, in vacuas venas, indirecta via ad cor sinistrum venit, idemque cor tanto plus sanguinis accipit, quo vehementius nunc venae pulmonales a sanguine per arterias pulmonales celerius fluente comprimentur, donec omnino nihil cum ductum subeat, & omnis per pulmones in sinistrum sinum veniat. Verum foramen ovale (7) medium est inter pulmonalem sinum, & cor dextrum: in eo valvula est, fixa versus dextrum cor, mobilis versus pulmo-

nes

in ullo adulti etiam cadavere: quod comparando inveni. Merito adeo per hunc pulmonem parum sanguinis transit DCLXXXI. not. 4. Nunc respiravit fetus, omnis ergo diameter pectoris augebitur DCXV. & cum pectore augebitur pulmo, cum nunquam costas deserat DCVII. not. 1. & vasorum adeo pulmonis increset atea. Superest ut pulmo facilius sanguinem ex corde dextro admittat.

(7) De clausione peculiarium canalium fetus multum quaesitum est. Plerumque ea, quae Praeceptor habet, dici solent. Ita Truffon. p. 50. *Pitcarne de motu per pulm.* p. 52. seqq. *Taouy de la circul.* p. 196. 201. *Sylvestre p. 46. Verbeyn lettre p. 51. Vaterus* ad mutationem anguli respicit, quem facit cum aorta ductus arteriosus & qui a respiratione rectior fit, minusque adeo faveat arteriae

Tom. IV. Pars II.

pulmonali. Addiderunt alii varia. *Lanciscus* multum tribuit, pro arterioso ductu, stapedibus aonae, sive circumflexo nervo vago, & intercostali, de corde p. 96. tum zonae musculosae, quae in foramine ovali sub meatu protenditur ib. Sed *Roubault.* novam opinionem protulit, nempe minime a respiratione hanc maximam mutationem pendere. Sensim enim fieri, & manifestam esse inter quinti septimi & noni menses factus diversitatem. In tenero fetu & foramen ovale grandius DCLXXX. not. 6. & aetatem valde parvam respice p. 12. &c. & ductum arteriosum aortae aequalem esse observ. p. 71. &c. DCLXXXI. not. 4. & cor sinistumque sinistrum insigniter minor a dextris, istud dimidia in sexto mense rep. p. 9. hoc tertia parte minus

G g

nes. Haec nunc perinde a parte venae pulmonalis, uti a parte cauae premitur. Cum enim nunc sanguis cordis dextri omnis per arterias pulmonales in pulmones veniat, is certe sanguis omnis in venam pulmonalem veniet, & premet membranam foraminis ovalis mobilem, eo valentius, quo plus sanguinis per pulmones advenit. Sanguis adeo desinet fluere per foramen ovale, & omnis in cor dextrum veniet, qui per cavam advenit utramque, & foramen ovale clausum manebit, a perpetua pressione sanguinis venae pulmonalis. Quo saepius nunc iteratur respiratio, eo majori vi semper pulmones expandi necesse est, & foramen ovale comprimi.

Sed

mus eo tempore, in maturo vero vix quarta aut quinta *rep.* p. 4. sensum vero n. a. m. cordis sinistri, adeo validi, dilatare aortam, magis, quam triplo debilius cor dextrum arteriam pulmonalem distendit. Ergo aortam sensum augeri *dist.* p. 14. & perinde minui ductum arteriosum, qui aegrius se depleat, hinc dilatari ramos pulmonales *respons.* p. 12. 81. donec aequae ampla sit aorta super ductum arteriosum, ac infra eum. *respons.* p. 108. tunc nasci aequilibrium inter sanguinem aortae & pulmonalis arteriae, & istam causam semper agentibus, praevalere denique vires cordis sinistri, claudique ductum arteriosum *rep.* p. 81. 135. *dist.* p. 13. &c. Sed in eadem ratione necessario minui ovale foramen, si quidem sinistram cor in latiore aortam se facilius evacuat, minus ergo contra sinum dextrum nititur *rep.* p. 137. & *dist.* p. 18. Et ea de causa denuo minui robur dextri ventriculi, eum minus sanguinis accipiat *rep.* p. 33. sinistri vero robur augeri, quia minus virum in transmittendo per foramen ovale sanguine inpendit *rep.* p. 80.

Mihi minime dubium est, primam rationem sufficere. Facile enim crediderim, fetus thoracem, per respirationem, altero tanto

majorem fieri, duplo ergo plus sanguinis transmittere in infante, nempe pene omnem, quem ductus arteriosus vehebat DCLXXXI. not. 4. cum praeterea nunc cordis motus acceleretur. Nam in catulis sub aquis mersis cor vix vibrat, valide vero, quam primum respiraverunt BOHN. p. 36. Quamprimum autem magna pars sanguinis a ductu arteriolo averitur, necesse est claudi, uti restat PRAECEPTOR, quia arteria aorta, multo & pulmonali, & imprimis ductu crassior validissime tentitur sanguini se dilatatur, hinc, ob pulmones pervios, tumentiores rami pulmonales, & maxime dexter idemque major, inde dilatata per eandem rationem aorta tenerum ductum, & pene venosum, medium comprimunt.

De foramine ovali manifestum est, quamprimum omnis sanguis cordis dextri per pulmones transit, aequilibrium nasci inter sanguinem dextri, & sinistri sinus. Tunc membrana, atque foramine amplior, in perfectum septum abit ex HARVEI observatione, & RIOLANI contra Pecquet p. 191. & ROUHAULT. *respons.* p. 18. qui addit, in infante, qui respiraverit, hanc valvulam protegi. Eadem valvula, crassior redditur, etiam CARCANO observante, & immobilis Truvv.

Sed canalis arteriosus medius est inter aortam, & arteriam pulmonalem, recipitque in fetu sanguinem, qui a corde dextro propullus, majorem in pulmone, quam in aorta resistenciam invenit. Nunc, postquam fetus respiravit, cor sinistrum omnem sanguinem cordis dextri accepit, & nihil transit in hunc canalem medium: ergo aorta dilatatur plus, uti arteria pulmonalis magis dilatata est, adeoque hae arteriae ad se invicem accedent, & medium compriment canalem, & claudent, tuncque sanguis in infante eodem, quo in adulto, modo circulationem perficit. Nempe sanguis omnis ex vena cava fluit in cor dextrum, & omnis ex corde dextro in arteriam pulmonalem & omnis ab ea arteria in venam cavaominem, & inde omnis in cor sinistrum porroque in aortam veniet.

Cum haec omnia adeo certo ita se habeant, certe pene intolerabile Mini fuit, quod studio partium abducta ACADEMIA PARISIENSIS non continuo MERYUM condemnasset. Unicum argumentum proferebat novator, & huic miror non respondisse DUVERNEYUM. Dicebat ME-

G g 2

RYUS,

TREVV. *Comm.* 1717. p. 100. *de diff. fet.* p. 91. & supremo suo margine posteriori parti concavi lithmi adglutinat MERY de la *circul.* l. 8. (sicunque). Semper tamen haec pars septi tenuior est, & pellucet KERKRING. *obs.* 14. Ductum autem arteriosum video contrahi & crassescere, donec membranae tumor canalem obturet TREVV. p. 96. ut arteriosa manifeste fibrosa carne factus appareat, neque male in ligamentum fieri doceat FABER apud HERMANDEZ p. 607. Brevior enim, & una compressus est, adeoque membrarum explanatarum contactus, & ratio ad contentum liquidum augetur. Tartarea materia obplem in fene vidit SALZMAN de *urinas.* p. 28. Vidi in ejus sine aortico, foramina exigua anno septimo aperta, vidi protuberare carnem, similem conal, vidi tubercula adfuisse, uti in cicatrice. Porro facile est visu, priorem ductum occalescere, ferius foramen ovale not. 10. Nam foraminis ovalis occlusio a ductus

arteriosi mutatione pender, & illud duae arteriae medium elidunt, in quibus singulis vehementius movetur, hunc duae molliores venae. Cacterum LANCISII nervo non plurimum tribuo, cum videam nervos, tanquam capitis propagines, in fetu, quam in adulto majores esse. Neque in tenerima membrana spingerem ullius roboris adgnosco. ROUGHULTUS vero multa ponit, non demonstrata, magnam nempe diveritatem in robore ventriculorum, & foraminis ovalis ductusque arteriosi in ipso fetu decremenda; & considerasse debuit, eas causas, quas adsumit, omni ferui proprias esse, & tamen nulli, vel certe ne millionesimo fetui ductus suos coaluisse, denique manifestam esse operationem aeris, cum intra novem menses, quos fetus in utero vivit, ductus arteriosus aut nihil, aut parum in ullo fetu minuat, a partu vero intra decem dies totus canalis saepe obturetur.

MERYUS „ sanguinem ab arteria pulmonali in aortam minime venire ; quia ajebat, si id fieret, utique necessario aorta major foret arteria pulmonali, cum arteriarum amplitudines sint, uti vires distendentes : vires istae, uti quantitas sanguinis in arterias impulsa. Ergo ajebat MERYUS, impossibile est, majorem esse arteriam pulmonalem, si minus sanguinis recipit, & triumphabat, cum eorum legatis ACADEMIAE REGIAE arteriam pulmonalem aortae aequalem [8] demonstraret. Sed haec tota argumentatio oritur ex ignoratione hydraulices (9). Sint duo canales aequae resistentes *a. b.* conjuncti canale medio *c.* Nunc pone liquorem in tubo *a* urgere in canalem medium *c* ; nihil certe poterit per eum canalem *c* transmitti in *b*, nisi in *b* minor resistentia fuerit, quam est impulsus in *a*. Si enim utrinque inpetus aequalis esset, pressiones contrariae se destruerent. Nunc pulmo in fetu ad extremum inferius canalibus *a* facit majorem resistentiam, quam est resistentia in aorta, sive *b*. Ergo aliqua portio sanguinis in *a*, quae minorem in *b* resistentiam invenit, ibit per canalem medium, donec aequilibrium restitutum fuerit, neque quidquam ultra, tuncque resistentia eadem erit in *b*, quae est in arteria pulmonali. Manifestum adeo est, MERYUM falsa demonstratione usum fuisse. Sed certum est, pulmonem compacta sua mole aequae magnam resistentiam sanguini arteriae pulmonalis opponere, quam totum corpus aortae obponit.

Mutatur) Quando infans ante primas respirationes sub aquam mergitur, diu (10) potest vivere, nam apertum habet arteriosum canalem.

(8) Et majorem: vide DCLXXX. not. 13.

(9) Responderet MERYUS, „ hoede tubis infinite resistentibus verum esse „, in hac vero casu nullam rationem dari, quare pulmo vim suam, qua superat aortae resistentiam, non potius impendat dilatando pulmone ROUHAULT *response* p. 86. Sed vide l. c.

(10) Verissime haec monet PRAECEPTOR. Cerrum enim est ductum quidem arteriosum coalescere ARANT. p. 40. citius ovali foramine, ut non male RIOLANUS foramen ovale saepe, ductum nunquam apertum reperiri dicat *de mot. cord.* p. 91. Neque tamen subito clauditur. HARVEIUS vias fetus aliquot mensibus apertas manere scribit p. 64. De ductu ve-

ro arterioso, idem ; ita tamen ut angustetur, CARGANUS docet. Altero mense apertum vidit VERHEYEN II. p. 347. SALZMANNUS in fene patulum vidit, sed factum tartarea materie *de urin.* nu. 20. &c. *de circ. sang. in fet.* n. 26. Omnino apertum in adulto ARNISAËUS apud HILD. Ep. 45. &c. in juvene 22. annorum E. N. C. Cent. IV. *obs.* 166. quod mihi nunquam contigit. Ego enim aliquando post triduum elusum, alias decimo die perangustum, alias quadragesimo totum apertum reperi, post annum tamen nunquam, quantum in adversariis reperi, patulum. Foramen autem ovale tardius clauditur, nisi raro exemplo aliquando canalem arteriosum praeverterit, quale exemplum

emplum quarta septimana in vitulo, septima in puero SALZMAN-
NUS recenset *obs.* p. 8. ubi cana-
lia apertas, foramen clausum fuit.
Plerumque vero etiam aperto fo-
ramine, ductum clausum reperio:
Ita in puero undecim septimana-
rum *Trevv. de differ.* p. 28. f. 42.
43. 44. &c. in vitulo quinta septi-
mana f. 33. 35. &c. in puero 42.
mensium *Möbius diss.* nu. 5. in
juvene vero PH. TR. 439. Recte
Galenus, qui uno alterove die ait
incipere coalitum, adulto caecum
esse *de util. part.* L. XV. c. 6.
Cito etiam adglutinati ARAN-
TIUS *de fet.* p. 38. Incerta qui-
dem, fateor, in foramine lex est.
Vidi jam altero a partu die pene
clausum, utriusque in suprema parte
unice superesset, & quarto die
clausum lego fuisse in E. N. C.
Dec. I. ann. 6. obs. 202. & ali-
quot a partu diebus *Trevv.* f. 29.
Secundo mense paulum apertum
Verheyen lettr. p. 26. L. II. p. 374.
Undecima septimana pene clau-
sum *Trevv. de differ.* p. 28. f. 42.
& septimo mense clausum ib. f.
25. 26. apertum vero sexto men-
se *Lieutaud* p. 375. Tribus qua-
tuorve mensibus apertum mane-
re recte *Riolanus* p. 392. Quarto
anno apertum CONNOR *de off.*
coal. p. 30. & ego reperio, pene
perpetuo quinto, & septimo an-
no, hoc foramen apertum esse,
ut vix unquam ceram injectam
sustineat. Nono anno apertum
Peyer obs. 8. In juvene ita reperi-
tur SALZMAN *de urin.* p. 28.
Vigesimo anno patentissimum E.
N. C. *Cent. VI. obs.* 91. Vigesi-
mo secundo anno *Littre bist.* 1700.
n. 13. & E. N. C. *Cent. IV. obs.*
166. Vigesimo quarto anno *Fo-
lius*, & vigesimo quinto D. de
March. p. 79. qui pro raro habet.
In aërio T. Bartholinus *Cent. II.*
bist. 46. *Veiling. synt.* p. 89. In
trigenario *Covupper* T. 17. f. XL
In viro duobus annis adultiore

Amyand. Phil. trans. n. 439. In
quadragesario *Schrader Dec.* I.
obs. 4. Ter in adulto *Pinaeus* in
præf. p. 21. Vidit etiam *Ridley*
p. 217. *Arnicaus* apud *Holdanum*
l. c. & *Valæus* ep. I. p. 389.
sed is ratur vocat. Quinquage-
simo anno apertum D. *Refinger*
spec. anat. bot. Comm. Parisi. 1735.
bist. 5. *Barth. Epist.* III. nu. 97.
Quinquagesimo sexto *Comm.* l. c.
In hydropico *Scheid* apud *Salz-
man.* Nonagesimo sexto *Cestberviz*
de valv. uret. p. 23. In adulto
etiam cane apertum *Kempfer* *de*
valv. p. 33. & cane vetulo *Pey-
er obs.* 29. & mure adulto *Har-
vei de corde* p. 64. Dudum *Har-
veius* „ vias serui proprias, quan-
doque per rotam vitam apertas
manere *de corde* p. 64. & inter
19. adultos duodecies tantum fo-
ramen ovale clausum vidit *Mor-
gagnus* L. XV. p. 28. & sæpe
apertum reperit *Riolanus* p. 392.
& frequentius quam clausum ef-
fet, sed unica hyeme 1732. *Ni-
colai Comm. litt.* 1732. p. 260.
Detum quinquagesimo anno in
femine, quinquagesimo sexto in
viris claudi, quod ex chirurgo
Rothomagensi (anle CATIO?)
habetur in *Comm. Nor.* 1738. *bebd.*
35. Id vero nimium est, non ra-
ro enim quinto anno perfecte clau-
sum vidi, etsi minime infrequen-
ter, etiam quadragesimo anno,
& serius, apertum viderim. Ni-
mius etiam *Botallus* est & *Fo-
lius*, qui pro perpetuo in homi-
ne canalem descripserunt, a pan-
cis experimentis seducti. Solet
autem vestigium durius superes-
se, frequenter reticulatum *Trevv.*
Comm. 1737. *bebd.* 13. T. I. f. 4. 5.
foveis io parte suprema *Covupper*
l. c. profundis inscriptum *Fol.* f. 2.
Morg. Adv. V. p. 23. 24. quæ
eandem sæpe oblique in sinistram
sinum aperiuntur *Ridley* p. 217. Hos
ductus angustos obliquos etiam
Pinaeus vidit l. c. In sinistro ve-
ro sinu

lem. Hic deceptus est HARVEIUS (11), &, qui ipsum explicavit; PITCARNIUS (12). Quærebat HARVEIUS, quare fetus, dum illaesa amnio & chorio continetur, etiam ex matre exemptus, per tres horas vivere possit, & idem tamen, postquam semel membranis rupcis aerem hausit, continuo pereat, si sub aquis eum merleris. Exemplum Liffae exstitit; ibi femina clanculum peperit, & infantem, una cum placenta, ruptisque membranis sub terram defodit. Interim observata mutatione subita tumidi abdominis feminae, familiares suspicionem suam magistratui aperiunt, inquiritur, & demonstratur, feminam ante tres, quatuorve horas peperisse. Rea convicta locum indicat, eruitur fetus, & vivus supereft (13), mollior enim terra eum nondum eliserat. Manifestum est adeo, coalitum foraminis ovalis & arteriosi ductus non adeo subitum esse. Si vero eundem infantem repetito sub aquis merse-

ria

ro sinu inversus arcus est, cornubus sursum spectantibus, in quorum concavo arcu foramen biat, superius vero reticulum est. Rarum est, foramen in inferiori parte dextra in adultis passuisse. Habet tamen *Morgagnus Ep. 15. n. 48.* in fene, & in media parte *Trevu. de diff. vas. f. 21.* ex adulto, & in tricenni puella *Conner de coal. off. p. 30.* Denique inter venam Cavam superiorem & pulmonalem foramina communicantia in adulto vidit *VVinslow. Comm. 1739. p. 150.*

- (11) *Harveius de gener. anim. & de partu p. 263.* eruditius proposuit problema, quare fetus septimestris in utero absque aere perdurare possit ad novum mensem, extra uterum vel uno die nequeat? Quare animalia recens edita in integris membranis, & fetus, qui caesarea sectione eximitur, in utero pisculis horis supervivunt, postquam vero semel respiraverunt, in simillimo loco solo aere excluso continuo pereant? Priori seculo fere omnes physiologi ad hoc *Harveianum* problema responderunt, alii aliter, & valde male *Borellus II. prop. 118.*

- (12) Perfecte respondet, uti *Franeptor,*

de causis div. molis &c. p. 58.

- (13) Nempe ante omnia debet de experimento constare. Id quidem verum est, integris membranis animal recens natum aliquamdiu vivere posse. Brutorum fetus a matre separati aliquamdiu hiant & varie moventur *Hipp. epid. VI. n. 5. Vesal. p. 214. Plater Quaest. phys. p. 259. Blagny Zed. Gall. ann. I. M. Jan. Moebius obs. 13.* In partu, qui membranis integris sit, omnino pueri vitales eduntur *DCLXXXV. not. 23.* Vivo fetui cor intra amnion omnino pulsare *Nymann. de vit. fet. p. 31.* Fetum demum sub antia pneumatica non extinguit per *Boylei* experimenta constat, & de felis fetu experimentum habet *Mery de la circul. p. 57.* diu in vacuo vixisse. Sed recte *BOERHAAVIUS*, non videri, adeo continuo mori, qui semel respiraverit, cum ductus arteriosos non subit, sed intra dies aliquot obturetur; adeoque possit aliquamdiu sanguis a corde dextro, etiam neglecto pulmone, circumduci in sinistram. Exempla duo, quae ex *Bobnio* citat, existant p. 38. de infantie.

ris (14), efficere poteris, ut respiret, ad testudinis modum, impediens enim concretionem valvulae foraminis ovalis & ductus arteriosi. Ita ranæ & testudines [15], quando extra aquam vivunt, per pulmonem respirant, quando vero sub aquis degunt, sanguis transit per foramen ovale & canalem arteriosum. Id unum nunc superest explicandum, quare cum aqua sola non perinde, uti cum aere, respirare (16) possimus? & quare non

- (14) Videtur *Præceptor*, uti plures physiologi, & *Dionis* p. 473. credere, eos, quibus foramen ovale apertum fuerit, posse sub aquis perdurare. Ita credebatur *Harvetus de corde* p. 64. & *Valsalvus* op. II. p. 416. & *Sovammerdam de respir.* p. 83. & *Regis in spongia* p. 160. & *Cartesius de form. fet.* p. 202. in avibus aquaticis foramen ovale apertum manere, quod in ave Regia video confirmari a *Parisiniis mem.* pour l'hist. des anim. I. p. 430. Verum experimenta inter se dissentiunt, neque satis respondent. Nam aliquando foramen ovale apertum, neque tamen ideo respirationis minor necessitas fuit. Suspensi illi, quos olim *Riolanus* p. 392. & in *E. N. C. Cent. VII. obs.* 62. & *Cbeseldenius* secuerunt p. 288. foramen ovale apertum habuerunt, & polyposus *Vaslingii*, & submersus denique *Lictrii* *hist. de l'Acad.* 1700. *obs.* 13. Alia vero animalia diu tolerant sub aquis, quibus foramen ovale non hiat, uti dudum de amphibis observat *Needham* c. V. Ita certe nullum foramen ovale apertum habet *Delphinus* s. *Porpess. Grævo. catal. mus.* p. 93. *Cbeselden* p. 288. In Phoca & castore dubium est. In isto enim nullum *Muraltus* p. 474. & *Parisini* ceperunt, *Kulmianus* autem castor hiatum lentis aequalem habuit *Bresl. suppl.* I. p. 107. Sed id ne in homine quidem rarum est. In phoca admittant *Parisini* & *Raius syn. quad.* p. 189. & *Kulmus* E. N. C. vol. I.

obs. 5. negat *Scheibammer. in anat. phocas.* In lutra clausum est *Parisini*. & *Koenig* E. N. C. Dec. II. ann. 10. *obs.* 112. Denique adulti homines, quibus hiat foramen ovale, aut omnes, aut certe plerique tantum exiguo tubulo perivium habent, exiguo futurum praesidio: ductus autem arteriosus vix unquam apertus reperitur, qui longe praecipuus canalus est, per quem fetus ab adulto differt.

- [15] Sed his animalibus naturaliter minima pars sanguinis per pulmones transit, & arteria pulmonalis ex eodem cum aorta ventriculo provenit (ut in crocodilo *JESUIT. SIAM.* p. 30.) ut omnino sufficiat, si aorta paulo minus receperit *BAGLIV.* p. 461. in testudine. Nam revera his animalibus cor unum trifidum ventriculorum habet, uti in p. sc. bus DCXXV. not. 11. conf. *PARIS ant. memor.* T. III. P. III. p. 172. In phoca, sub aquis natante, credit *Scheibammerus*, sanguinem, uti in homine strangulato fit, in venis colligi, quas ideo pro ratione arteriarum amplissimas habere hoc animal: & per amplas etiam venas in iurione memorat *Cbeselden* l. c.

- (16) Si recte intelligo *PRÆCEPTOREM*, quaestio eadem est, quae CCXI. Nam id nemo quaerit, quare non ducamus aquam in pulmones loco aeris? Cum enim vasa sanguinea nostra ponantur inter medias vesiculas, & cum una inspiratione adducamus 40. pollices cubi.

re non possumus sub aqua pectus dilatare, sic vitam trahere superfluum. Hoc nobis *αποφανται* est, quod forsitan Vobis, vestroque aevo, aliquando patefceret.

§. DCXCII.

Hepar) Arteriae umbilicales in fetu sanguinem suum avehant in placenta; inde vena umbilicalis revehit eandam sanguinis quantitatem, quam arteria adduxit, sive ad hepar eum vexerit, sive ad cavam venam, prouti resistentia aut in hoc, aut in illa major fuerit. Quamdiu nunc infans, etiam extra uterum, placenta cohaeret, quam ponimus in utero adhuc esse, & calere haecenus, & meabilem esse, tamdiu sanguis ejus circumit per placenta (1), neque quidquam de quantitate amittit, mater autem utique suum sanguinem perdit (1*). Manifestum ex eo fit, majorem vim esse arteriarum uteri in fetum, quam est vis arteriarum secus in uterum. Abscindatur nunc umbilicalis funiculus, peribit infans, & sanguinem suum omnem amittet per umbilicales arterias. Si vero eae arteriae vinculo constrictae fuerint, quo arteriae arctentur, tunc praestringuntur (2) arteriae (3), vena, urachus, & vena portarum nihil ultra a placenta accipit. Verum in arteriis crurales ibat in fetu ea sanguinis portio, quae a corde sinistro per aortam expulsa fuerat, demta ea portione, quam arteriae umbilicales ad placenta ducebant. Hae arteriae nunc clauulae (4) sunt. Ergo sanguis arte.

vubicos aeris DCVIII. not. 5. haec certe moles aquae ita comprimeret vasa nostra pulmonis, ut robur cordis dextri, ad respirationem aerem & facilem circulationem a CREATORE computatum, sanguini per pulmones urgendo minime sufficeret: & quod etiam magis probabile videtur, rumperet italem cellulosam pulmonis molliissimam, ad solvum aerem continendum robur natum sufficiens.

(1) Fetus ex funiculo pendens, placenta in utero relicta, facile aliquot horis vivit la MOTTE *obs.* 230. 232.

(1*) DCLXXXVIII. not. 11. & exempla hujus infortunii habet la MOTTE *observ.* 211. 225. & PARISINI *Comm.* 1727. h. 1.

[3] Umbilicum resectum bi-duo aut tri-duo a partu delabi, sanamque eundem relinquere notum est MONROO *Edimb. Socier.* II. p. 164. ut vasa nigra ambulta quasi, & acuminata adpareant SCHULZE *de vasc. umbil.* p. 11. *an. delig. umbil.* p. 9.

[4] Arterias venasque umbilicales cisticissime coalescere vulgo creditur. Vidi secundo die exscisum quidem umbilicum fuisse, facile tamen potuisse aperiri & repleti. Post aliquot dies utrumque vas adhuc apertum vidit TREVV, *de differ.* p. 25. Quinto vel sexto die arterias clausas, fuscas in vitulo SCHULZIUS vidit *de vasc. umbil.* p. 12. & fere simile in puello triduo experimentum: omni est TREVV *Comm. Nor.* 1734. p. 219. T. V. f. 3.

f. 3. ubi arterias valde contractas invenit, ceram tamquam per cribrum transmississe. Die sexto scitissime a partu a foru calido funesta haemorrhagia CRAMER *Comm. Nor. 1735. bebd. 43.* Porro vidi arterias die decimo exiguo foramine apertas fuisse, & die 40. cum venae ovalitae essent, cera injecta & sanguine plenas. Sed nuper bis, quadagesimo pariter die, arterias umbilicales pervias reperi, & sanguine plenas, supra vesicæ apicem, ut minima esset particula, quae inter umbilicum & vesicam inanis supererat. Mense nondum tertio magnam partem arteriarum clausam *Trevv. de diff. f. 39.* Intra annum clausas *Trevv. Comm. 1733. p. 327.* Venam vero vidi die decimo apertam, die quadagesimo clausam, & denuo cum ductu venoso bis apertam; ita tamen, ut observem, ductum arteriosum a parte arteriae pulmonalis, arterias umbilicales ab umbilico, venam umbilicalem pariter ab umbilico, venosum ductum a sede portarum inminui, & incipere occaecari. Undecima septimana ductus venosus pene clausus *Trevv. de diff. f. 39.* venam umbilicalem etiam modice aperta. Duobus a partu mensibus sanguis ex rupto umbilico *Bartb. Cent. IV. biff. 97.* sexto mense denuo apertam vidi. Nono mense *Trevv.* in vena tantillum foramen, in arteria solam partem, quae vesicae fere altitudine terminatur perviam invenit *Comm. Nor. 1737. h. 11. T. I. f. 1.* In adulto nunquam vidi venam umbilicalem apertam In puella tamen duodecim annorum umbilicus aliquem sanguinem subbat SCHURIG ex HOECHSTETTERO. In vito trigenario E. N. C. Cent. X. app. obs. 2. & in virgine 35. annorum sanguine plenam & varicosam COITER p. 117. Enormem & diuturnam ex umbilico in juvene haemorrhagiam

Tom. IV. Pars II.

rhagiam HILDANUS habet *Cent. III. obs. 37.* & similia LANZONI E. N. C. Dec. III. ann. 9. obs. 143. PROSKY *Comm. Lit. 1737 bebd. 6.* & Acad. Scienc. 1737. biff. 7. In adulto ex reiecta vena umbilici funestam haemorrhagiam vidit HILD. *Cent. I. obs. 53.* [sed minus certo]. In femina demum 96. annorum venam apertam D. CO-SCHVIZ de valv. *ust. p. 23.* Confer compilationem apud *Tiltingium de plac. p. 216. 217.* Ita nec arterias aliter apertas vidi, quam dictum est ad DCLVI. not. 1. sty-lum admittentes vero I. M. HO-FMAN in E. N. C. 1 c. Ductum venosum omnino semel in adulta femina liberum vidi. Id etiam in 1 annorum vidit *Moebius puero 3 1/2 diff. c. n. 5.*

Ergo solita lege naturae, ad majorem aut minorem a partu distantiam temporis, adpartet vena umbilicalis clausa, in duplici ligamento terete laevis, & plerumque pinguedine obnupta, Ductus venosus tenuis, membranaceus similis. Arteriae vero umbilicales secundum vesicam quidem ligamentorum similes, semiceretes, factae arteria vesicali DCLVI. quoniam multa series fibrarum re-ctarum ambit, similis inelasticitae arteriae, supra duas tertias vesicae fere caecae, ligamenti tere-tibus figura, & utcumque filvis longitudinalibus adfines VESAL. de chin. p. 117. *Trevvius* eleganter, sed prius, quam ego video, caecae pinxit, ut omnino omittat arterias vesicales *Comm. Nor. 1733. T. 3. f. 3. 4.* Hanc occlusionem, ita intelligit fieri doctissimus *Schulze de vasf. umb. p. 11. 15. an. de lig. p. 15.* &c. & *VVeitbrecht syndesmol. p. 227. 228.* & *Trevv. Comm. Lit. 1737. bebd. 13.* ut va-sa ab umbilico abrupta se retrahant, aboleantur & vaginas inanes relinquunt, & addocet *Schulz. experimenta*, arterias um-bilicales.

h h

bilica.

arteriae aortae descendentes nunc venit omnis in pedes, redit in venas crurales, in cavam denique. Sed nihil nunc per umbilicalem venam in hepar advenit. Ergo resistentia [5] sanguinis fluentis per venam cavam auge-

bilicales in vitulo in pelvem osee de sexto retractas de vasc. umb. n. 5. Trevius vero dixerit, arterias abruptas, retractas, ad summae fere vesicae altitudinem, vaginas solas fecisse reliquis testatur. Fere similia vidit de differ. fet. f. 39. Repugnant quidem exempla haemorrhagiarum in adultis non penitus infrequentium, pulvis niger, sanguis siccat si nullis in vasis umbilicalibus pueri repertus a *Perbeyano* L. II. p. 376. longitudo nimia arteriae umbilicalis, quis eam credat semipedalem canalem ad finem usque se retrahere posse; defectus vaginae ullius in ductu venoso, cuius tamen luculentum vestigium superesse solet; ductus arteriosi in adultis certa existentia, maxime vero manifestus in adultis tubulus arteriosus in media ligamentosa substantia arteriarum. Sed nuper etiam venam umbilicalem caecam mense sexto vidi, filii si milem, minime tamen abruptam, & arterias umbilicales supra vesicam pariter graciles, continuas tamen, neque avulsas. In adultis denique ad summam vesicam plenas facit *Lientaud* p. 313. Atque adeo nondum audeo in praestantissimorum virosum sententiam transire.

- (5) Quare vasa umbilicalia coalescant, non adeo facile est respondere. Venam quidem umbilicalem coalescere, cum a partu nullum sanguinem recipiat, facile sequitur. In ductu venoso laboratur. Nam ea, quam adducit *Praeceptor*, resistentia, rem non expedit. Cur enim aliae venae Portarum cum cava anastomosos liberae manent, haec autem sola, facile ma-

xima, comprimitur? Sed videtur in univertum quidem a partu multo minus sanguinis per hepar ire, cum vena umbilicalis, toto portarum trunco maior, nunc deficiat sanguinem advehere. Id confirmat moles decrefcentis hepatis DCCXXIX. Omnes adeo anastomosos portarum cum cava minuiuntur, & facilius comprimuntur. Venosum vero ductum videtur elidi inter lobulum Spigelii & iocumbentem lobum sinistram. Nam fossa ductus venosi in adultis nullam latitudinem habet, nisi quam omenti tenerissima lamina requirit. Elidi autem a partu intelligitur, cum perinde diminuat cavitatem abdominis, ut peitoris cavea dilatatur, atque adeo omnes eminentiae in vicinas cavitates inprimantur.

In arteria umbilicali etiam magis haesitatur. Vastissimi canales sunt, diametro $\frac{20}{100}$ pollicis, qui ab aorta directa via maximam partem sanguinis recipiunt. Cur non manent aperti a vesica ad umbilicum? cur non crepat nitente in vinculum sanguine? Reperio 1. compressionem omnium valorum abdominalium, & iostignem determinationem sanguinis ad vasa pulmonis nuper dilatata, hoc mutatam in abdomine solidorum ad fluida, auctamque rationem. 2. Flexionem, quam haec arteriae cum trunco magnam faciunt, ut viderim injectam per alteram arteriam ceram in ejus utrumque venisse, per aliorum umbilici arteriam non rediisse. Porro hanc plicam, in homine certe, a partu augeri adparet, cum haecenus conglobatus, nunc extendatur, & arte-

augetur contra inpetum sanguinis per ductum venosum: venientis ex sinu hepatico, & pressio venae cavae superabit pressionem sinus portarum, iste enim a solis visceribus chylopoieticis, illa a toto corpore inferiori sanguinem accipit, & venarum hepaticarum sanguini plurimum detractum est, magna vero portio venae cavae accessit. Ergo nascitur in vena cava tanta contra sanguinem ductus venosi resistentia, ut comprimat, & circulatio porro per hepar perinde sit, ut in adulto.

§. DCXCIII.

Meconium) Hujus excrementi stimulus fuit una ex praecipuis causis (1), quae partum irritando acceleraverunt; nunc adductus est aer in thoracem fetus, superatur adeo sphincter ani, & faeces egeruntur. Prius, dum fetus in amnio vivit undique tectus, nunquam faeces egerit, neque stercus in amnio reperitur, quando vero aqua faecibus turbata effluit, norunt gnarae obstetrices setum jam respirasse.

Vesica) Idem de urina verum est. Urachus (2) in homine quidem vinculo constringitur, dum umbilici funis ligatur. Homines enim perirent omnino, nisi vinculum injiceretur, diversi in ea re ab animalibus, quibus omnino nulla noxa accedit a resecto mordicus funiculo umbilicali, &

H h 2

li, &

& arterias umbilicales magis retrogradas habeat, ELLERO etiam perspicaciter monente *Comm. Nor. 1733. p. 379.* Hinc levissima compressione haemorrhagia vasorum umbilicalium coercetur CHAPMAN p. 66. 67. 3. Etiam in adulto in aneurysmate ligatae quaecunque, aut praesectae & cicatrice clausae arteriae paulatim occalescunt, & diminuuntur, praevalente vi solida, quamprimum impetus liquidus ex aequilibrio diminuitur, & sanguis non videtur contra vinculum nisi, quod vicini rami abunde adsint, in quos impendatur is sanguis, quem ligata arteria nunc refusat. Vidi, & vulgo notum est, resecta arteria radialis, in dilatata fuisse sensim ulnarem, ut rami omnes, quibus prospicit radialis, inde sanguinem acciperent. Inde a parva vasa genitalia, cum in reliquo corpore omnia vasa in ratione ad

musculos minuantur, sola increascent pedesque, qui fetui valde imperfecti sunt, nunc insigniter augentur, & ad sustinendum corpus aptiores redduntur. Plura non video. Geniculum Cl. SCHULZIIUS ponit, quo in umbilico arteriae fetus cum arteriis placentae connectantur, eoque ruptae fines se retrahere, finibusque diminutis exarescere *an dilig. umb. necess.* p. 7. Sed hoc geniculum neque ipse Schulsius vidit, neque favens Schulzio Trevu. *Com. 1733. p. 394.* facile enim est, ex funiculo in abdomen fetus continuare repletas arterias, cylindricas ubique, & absque nodo continuas.

(1) DCLXXXV.

(2) Parum mutatur in adulto, nisi quod a vesica recipiente se in pelvem, & ab umbilico refugiente, extensus gracilior fiat.

li, & natura favens vasa omnia sponte claudit. Homini vero, uti plus rationis Deus dedit, ita eum magis arti reddidit obnoxium (3). Si enim vel resectus fuerit absque vinculo [4], vel nimis tenui [4*] fericeo filo funiculum contractus fuerit, & arteriae umbilici quasi dissectae, fetus certo ex haemorrhagia perit. Prudentior obstetrix utitur vinculo satis lato, ne secet, satis tenui, ut stringat, quantum necesse est; deinde ad aliquot digitos (4**) supra hoc vinculum secundum injicit, ut tutamen aliquod superfit, si casu prius vinculum viam sanguini dederit; tunc resecat funicul, vulnerique inponit chartam cum melle & oleo rosaceo,

(3) Haec nunc difficilis quaestio est.

Quare bruta animalia omnia fetibus recens editis umbilicum praemordent, & nullus unquam cavulus ex haemorrhagia perit, nisi CARPI experimenta velis, qui vidit, equinos & asininos pullos praedicto umbilico perisse p. CCLXI. Quare vero homo, nisi caute ligatus fuerit umbilicus, cito sanguinem omnem amittit: cum tamen homini longior, & magis intortus umbilicus, (vinctulo cetie rectior HOBOKEN, de secund. vitul. p. 93. f. 23.) potius periculum haemorrhagiae minueret videantur. Varii responderunt varia. Luxum hominis & sanguinem tenuiorem accusat Tawry p. 139. Alii ad moriunt & lentam masticationem confugunt. conf. CHIRAC. *bist. acad. scient. 1716. bist. 1.* qua bruta funiculum abrumpan. Sed etiam Tapuyae funiculum mordicus auferunt LERY p. 256. & tamen ligant. Alii magnitudinem vasorum, quae multo quam brutis animalibus ampliora esse dicunt. FANTONUS autem pridem ligaturam umbilici non necessariam esse, ex coniectura proposuit. Cl. Schulzius vero, nolum Gordium ense resolvit, negat nempe fetum humanum sanguinem suum amittere, etiam si nulla ligatura injecta fuerit. Ita reperio, a funiculo non ligato exiguum haemor-

rhagiam successisse apud la Motte *obser. 441. 442. 443.* & Trevvii similem observationem adlegat *Schulz an delig. p. 21. 23.* tum adiunt ELLERI *Comm. Nor. 1733. p. 379.* & Trevvii *Comm. Nor. 1734. p. 219. 1735. bebd. 51.* & in E. N. C. vol. 11. *obs. 50.* contentientia experimenta. Sed contrario modo non ligato funiculo corpus infans ex sanguine fuit *Comm. Nor. 1735. bebd. 32.* Ex rupto aut non bene ligato funiculo perfecta inanitio & mors Seleß. *Francos. I. p. 327.* & aliquot exempla exstant apud Hilden. *cont. 1. obs. 52. Maur. p. 465. obs. 256. post. 143.* E. N. C. Dec. 2. *ann. 7. obs. 193. Vol. 2. obs. 50. Burgemann. in Com. Nor. 1734. bebd. 34.* ex Berolinensibus, Breil. 1724. p. 421. *Quelmalz Comm. litt. 1737. p. 196.* & sexto demum septimove die post calidum fœtum Cramerus funiculi ex umbilico pueri haemorrhagiam vidit l. c. Ex umbilico ter ligato magna haemorrhagia *Maur. obs. post. 44.* Ex vinculo per exsiccationem laxato, die septimo haemorrhagia fœusta ID. p. 464. Post aliquot dies sanguis ex umbilico infans laeso E. N. C. vol. 1. *obs. 169.*

(4) Perfekte eadem cautela est *Justinus Sigmundin p. 114.*

(4*) *Mauriceau p. 465.*

(4**) *Croeser diff. cit. p. 21. I. von Hoorne p. 61.* Tribus vero nodis ligare jubet *Dionis. des accouch. p. 371.*

faceo, ita putrescit umbilicus & decidit, & manet superstes per totam vitam cicatrix. Ergo ligatura injecta est uracho, quae opponit urinae ex vesica exiturae resistantiam majorem, quam est sphincteris resistantia. Fluet adeo per superatum sphincterem, & per urethram urina, neque nunc urachum permeabit, neque porro pristinam viam requirit unquam, nisi potentissima aliqua & morbosa causa accesserit.

§. DCXCIV.

1. *Pater*) Embryonem dat, & prima vitae flamina, corpusculi fabricam vere jam factam & determinatam, vermem (1) nempe in omni anima.

(1) DCLI. Germen etiam a mare advenire *Drelinecourtius* contendit ubique.

(2) Objectionem contra systema vermiculorum huc referavi. Nempe, si animal totum & perfectum a patre venit, quomodo matris, quae non nisi hospitium praebet nidumque, similitudinem aut omnem aut aliquam fetus recipit, uti ex clauda matre elaudum puerum habet VENETTE p. 107. & membranas inter pedum digitos quasi anatinas STAHL. p. 497. Et, quod majus est, inter animalia hybrida, cur mulus matris equae potius, quam patris asini similis est? Cur porro eadem semella inter multiparas, vel in eodem initu filios alios sui similes, alios patris, ut de catella in E. N. C. Dec. II. ann. 10. obs. 180. lego, aut eadem mulier modo sui, modo parentis similes filios edat diversis partibus.

De primo experimento omnino constat, & mihi videntur inter homines me observare, similitudines matrum frequentiores esse. Ovis ab hircio inita, ducior lana edit secum, & capra ab arietate facta molliorem *Athenaeus* apud *Galenum de semine* L. II. c. I. In mulu & lycica, & pullis, quorum mater gallina est, phasianus pater, utriusque parentis natura ad-

paret *Harvei* p. 142. phasiani nempe forma, sed gallinae color *Faber* p. 772. Animal ex glire & caro natum, utriusque particeps naturae *Lockius* *visit de l'entend.* L. III. c. 6. Ex alba femina & aethiopse, uti notum est, mulatri nascuntur, quibus non color solus, sed proportionem corporis ex utroque parente miscentur. Ex aethiope & ancilla Europea puer albus pene nigro, si fides E. N. C. Dec. II. ann. 5. obs. 190. Sed neque tertium dubium est. Mulus enim multo plura de equa habet, de asino aures sere caudamque *Bourguet* L. IV. p. 16. *Floyer abridgm.* II. p. 912. & addit *Helmontius*, ita mutari equae genitalia organa ab asini initu, ut etiam altera vice pariens, a patre equo, edat pullum aliquid habentem asinum *alpbab. natur.* p. 40. in ore & coxis *Strahl.* p. 496. Lycica ex matre lupa nata, patre cane, lupa est *Faber* apud *Hernandez* p. 491. Animal illud compositum ex tauro & equa, *Joumar* dictum, vidit in Asia *Scherardus* apud *Blair bot. ess.* p. 310. & in Arvernia ex equo & vacca excitat *Venetius* p. 324. & in Pedenontio vulgare esse *Bourguet* testis est, duorumque generum, *Rif* ex asina & tauro, *Baf* ex equa & tauro, utriusque autem

autem verum asinum esse aut equum modicis quibusdam notis tauri insignem, fronte tuberosa, capite brevi *Lettre* IV. p. 161. Minus ex asina, matri similior est *Columella* L. IV. c. 37. tum in univerfum hybrides matrum similiores *Parisi* in *anat.* *Catopardi*. Denique si fides potest adhiberi, *P. Zuccellus* in *rebat. congenera* feminas a similibus compressas veros homines edere refert p. 148.

Haec omnia eo validiora videntur, quod in arboribus ramus insititius a radice alieni generis alimentum quidem accipiat, speciem tamen suam conserveat, neque unquam in naturam transeat arboris, in quam inseritur. Ergo ab omni tempore haec experimenta adhibita sunt, ut mistio seminum demonstraretur, a *Galeno de semine* L. II. & nuper a *Voglio*, a *Mazino insitit.* p. 218. ab anonymo *Ess. on secund.* p. 12. & ab aliis.

Ad hanc gravissimam objectionem aegre respondit *Leewwenboeckius*. Experimenta equidem opposuit experimentis, plurima nempe animalia patrem sequi colore pilorum *Columella* L. VI. c. 37. plumarum &c. ut in griseis cuculiculis, (qui ex quacunque matre griseos educant pullos) *Anat. & contempl.* p. 54. 55. in genere gallinaceo & columbino *Ill. de Superville Phil. trans.* n. 456. Phasiani erant, quos gallina pariebat ex phasiano *Faber* l. c. p. 772. Ex parte latissimas habente scapulas puer simili modo insignis *Vennette* p. 308. Deinde passim historias legi morborum valde singularium, qui a parente in filios, totamque gentem descenderent. Ita vitium hominis, qui quatuor pollices habebat, in pueros descendit *Monconis Iter.* l. p. 13. & ex patre omnes filii contortis pedibus, ex alio nati omnes filii vesiculis pulmonis & hepatis extincti sunt *Marcell. Donat.* L. IV.

c. 18. Ex caeco quinque caeci nati *Lanzoni obs.* 125. & E. N. C. *Dec.* III. ann. 4. *obs.* 67. (sed ex auditu.) Ex gibboso meri gibbosis *Mauriceau* p. 44. Confer fufam raphodiam apud *Schurigium in spermatoz.* c. 9. & olim de caecitate, & verrucis, naevique a patre vel avo in nepotem descenditibus *Aristotalem hist. anim.* L. VII. c. 6. Nota aspera, & sub pluvium tempus audita, in tota gente Bentivoglia hereditaria fuit, & per mares adeo propagata *Carpus* p. CCLXXII. alioque naevos in tota gente hereditarios legimus in E. N. C. *vol.* 1. *obs.* 189. Ita suam familiam integris ongulis vidit *Bradley philos. account.* p. 91. Porro in ipso hybride animale *Kunrab* ex asino & vacca genito, plura ex asino esse, cornua nempe abesse, & fissam ungulam habere, auctor est *Scherv travels* p. 239. quod non videtur convenire cum iis, quae de *Joumaris* dicta sunt.

Deinde omnino observandum est, non alia fere animalia diversorum generum commissa vitales edere fetus hybrides, nisi proxima, & de eadem classe, quae *varietatum* inter plantas pene similia, paucis, & non profunde in fabricam descenditibus notis differunt. Ita equus ab asino vix magis differt, quam Europaeus a Nigrita, aut Paragonicus gigas a pygmaeo *Troglodyta*, lupus a canine non magis, quam ab anglico pugnace molosso catella melitaea &c. Non ignoro exemplum *sumarorum* excipi, sed fateor, aegeritiae apud me fidem invenire, donec anatomen huiusmodi animalis habeamus, ex qua constet quatuor, an unus ventriculus in eo reperitur? an vesicula felle aliqua? an nulla? &c. Sed animalium similis generis partus manifeste a causis etiam accidentibus aliquas, neque fere minores, quam

per

animalium genere, qui deinde pro varietate specierum in alias, & alias animalium formas (2) mutatur. Dat etiam primum alimentum, nempe proflatarum succum: haec omnia ad ovum usque maternum advehit.

Mater) Recipit a patre vitalia stamina, retinet, & nutrit, domicilium ergo praestat fœtui, liquorem amnii, in quo natat, & nutrimentum per chorion ad amnion fluens. Si mater vivipara fuerit, ovum ponit & incubat intra uterum, & fovet, in homine quidem novem (3) mensibus,

per venerem cum alio genere, differentias trahunt, in coloribus fere, aut in quarundam partium majori torositate, aut stragositate positas, non in numero, siuve, aut fabrica interiori ossium, viscerum, musculorum. In coloribus res notissima est, etiam ex *Jacobi Stratumgemate* & ex equisomum experimentis. Alibi pavones nascuntur a putribus albis, inter quos parvulus ambulans E. N. C. *Dec. II. ann. 10. obs. 4.* Lacerti pullos variis pictis coloribus genuerunt, cum consuevissemus esse in lecto prepositis & diversis coloribus aulæ strato *Borbesfort bist. des Isles antill. p. 145.* Ex terrore alter gemellorum aethiops E. N. C. *Vol. 1. obs. 77. conf. Bourguet Lettre III. p. 94. &c.* Manifestum ergo est, levi quadam commotione, qualis ab imaginatione fieri potest, a matre in filios easdem mutationes descendere posse, quae a venere aliena sequi observantur: recte adeo hoc phaenomenon a motu hoc vel illo validiori interpretari *Valinierum l. c. c. 21. n. 13.* & alimento forte ad unam partem, analogam matris, facilius, ad alteram heterogeneam aegrius adplicato, ut *Leuvenboeck anat. & contempl. II. p. 73.*

- (1) Ordine vero quodam haec tractatio instituenda est. Fœtus utique semper vivit, recte hoc *Strabius*, crevit enim. Verum in primordiis suis ita tener est, ut vitalis edi, aut supervivere conatibus ad abortum necessarius nequeat: ne-

que possit calcitrando aliquem sui sensum in matre excitare, hae vero causae sunt, quare eo tempore nondum vitalis haberi soleat. Multo tamen citius, quam vulgo creditur, movet arius. Die trigesimo secundo *Venette p. 154.* Sexta septimana *Bianchi de gener. p. 126.* Mas die trigesimo, femina quadragesimo secundo *Hipp. de nat. pueri.* Mas die quadrag. sine, femina nonagesimo *Arist. bist. anim. L. VII. c. 3. Riolan. p. 401.* Menstruo secundo *Mauricini p. 52.* Septimana 14. *Schuric. Embryol. p. 449.* Menstruo quarto *Harvei p. 190.* Eo ergo tempore fœtus manifeste vivunt. Citius pariter, quam credimus, vivus fœtus abortu editur: Trimestris *L. Lemnius, la Motte obs. 203. 204. Valentin. Pandect. cas. 23.* Quadrimestris, etiam vocalis *L. Bourgeois l. II. p. 72.* & alius apud *Reis*: & puer dupla mole scarabaei non major la *Motte obs. 172.* Inter quartum & quintum mentem *Id. obs. 170.*

Verum id quaeritur, an arte nonum mentem scius ita perfectus edatur, ut supervivere queat, & more humano ali & educari. In hoc termino laboratur. Tempus certe maturitatis in omni plantarum & animalium genere definitum est, & sequitur fere animalium longaevitatem, ita tamen, ut varietatem aliquam, sed non maximam, admittat. Quare quinque menses quidem fœtus vitales, dicitur *Valisio & Spiegelio c. 20.* & *Everardo l. c. & in opus. scint.*

scient. Vol. 13. p. 450. 451. aegre admitto. Vide ex Montuo, Cardano, Avicenna, Schenitum compilantem p. 578. & ex Vescio, Schurigium. Sexmestres autem quos negat vivere Aristoteles *biff.* VII. c. 4. incipiunt vitales esse, ut tamen rariora exempla sint, & non male parum iis tribuat P. Zacchias L. X. c. 13. Diemerbroeckius historiam habet p. 129. & alium fetum pumilionem, debilem, qui tamen adoleverit *Evevardus* p. 116. aliumque nondum ad sexum mensem gestatum nempe 173. dierum proprio libello defendit *Mullerus*. Pro fetu vitali 175. & 183. dierum Lipsiensis (*Amman* p. 147.) & pro alio 177. dierum responderunt Rostochiensis apud P. Amman. in *medic. crit.* p. 9. *Moller* p. 84. Vide collectionem partuum praecocium apud *Schurig.* Embryol. S. VI. c. 7. *Schenck* l. c. Septimo vero mense homines non rarissime vitaliter pariuntur *Hippocrates* *apud extraxit*, *Aristoteles de gener.* IV. c. 6. *Faber* apud *Herr.* p. 477. *F. Sylvius*, de quibdam familiis, in quibus ait, omnes septimestres nasci, la *Motte* *obsf.* 68. 69. 77. 78. *Breslau.* 1727. p. 727. debiliores tamen, *Aristoteles* jam teste L. VII. c. 4. & meatu aurium nariumque minus perfectio *Aristoteles* ib. & *de gener. anim.* L. IV. c. 6. oreque valde hiant, plerumque denique cito pereunt *Hipp. Zacchias* L. X. c. 37. Sed octavo mense veteres quidem partus non credebant vitales esse, ut *Hippocr.* l. c. & *apud extraxit*, & de aetate, etiam excuset, & detorqueat senis verba *Drelincourtius de fetu olli-* *mestri vivaci*; tum, in *Graecia Aristoteles*, & *Parro* apud *Gellium* L. III. c. 16. Recentiores omnes cum *Diocle*, & *Avicenna*, & ipso *Aristotele de gener.* L. IV. c. 4. *biff.* VII. c. 4. (ubi in Aegypto vitales edi satetur) consentiunt,

& vitales esse octimestres defendunt *Cardanus*, *Drelincourt* toto tr. p. 194. & c. *Dolacus*, *Mauriceau* p. 205. multis exemplis, & *obsf.* 225. la *Motte* *obsf.* 70. 71. 72. 73. 189. E. N. C. Vol. IV. *obsf.* 50. *Berger* p. 427. etiam tergeminos *Mauric.* *obsf.* 146. & magis vitales esse septimestribus *Eobn.* *de offi. med.* p. 630. *Manningham* l. c. *Mauriceau* p. 205. ut tamen merito credamus, omnes, nono mense praecocios, minus in universum vitales esse *Venetto* p. 75. Terminus autem naturalis novem perfectis mensibus quidem continetur *Hoboken de sec. bum.* p. 87. *Dionis des accouch.* p. 197. *Venetto* p. 75. *Diemerbroeck* p. 292. ut sint mulieres, quae partum ad diem praedicant *Schellhammer de part. gener.* nu. 17. Paucis vero ante, vel post hunc terminum, septimanis natura ludit. Ita *Aristoteles* tempus pariendi inter septimum & undecim mensem includit *biff. anim.* L. VII. c. 4. Saepius vero aliquanto post novem menses parere ait c. 3. Sed & brutorum tempus aliqua libertate evagatur *Mauriceau* p. 202. Romani novimestres & decimestres unice pro legitimis habuerunt *Gellius* l. c. *Ulpianus* post mensem decimum nates habet pro illegitimis. *Justinianus* de 182. natos inter legitimos admittit. Senatus *Parisinus* filiolam 304. die pro legitima admisit, pro illegitima alteram 312. die editam *Venetto* p. 77. & responsum contra fetum 309. dierum adducit P. *Amman* p. 176. Hujusmodi fetus post nonum menses editos grandiores nasci *Manningham* expertus est p. 51. & la *Motte* *obsf.* 298. & clausa fontanella annuum receperunt Lipsiensis *Amman.* p. 234. Undecimestres perfectos autem, duodecimestres, aut feriores, rarissimos ego puto, neque urquam admittendos, nisi manifestissima ratio

bus, in elephante duobus annis. In avibus autem incubatio uno & viginti (4) diebus absolvitur.

Faciatur) Primum hoc flamen, quod pater in generando suppediat, non ideo omnia viscera habet, verum ea sensim admirabili arte subnascuntur. [Ita in codice] Cum MELIHISEDCH THEVENOT anno 1661. Parisiis quavis septimana conventum virorum doctorum in aedibus suis instituisse, quos humanissime invitabat, ut ex eorum disputatione erudiretur, etiam SVVAMMERDAMIUS rogatus adfuit. Sermo erat de generatione animalium, & singuli propriam proponebant sententiam de vicerum appositione. NOSTER civis, ad inquirendum aptissimus, sed tardus

ratio adit retardationis in aliqua chronica matris aegritudine. Quales suis probabiles historias de decemestri perfecto habet *Mauriceau obs.* 120. & denuo 198. & la *Motte obs.* 74. 75. de duodecimestri *Burgav* apud *Buchner-m* in *misce.* 1727. p. 171. & in *Comm. Nor.* 1741. *beb.* 40. de sedecimestri *Harvius*. Ita matris peculiaris morbus aliquid ad *Petrescianorum* partuum tarditatem conferre potuit, omnes enim unius matris sunt. Nobiscum *Manningham* post undecimum mensem natos vix admittit p. 51. & ne decemestribus quidem multum tribuit *Hobokenus* l. c. & quam facile salantur seminae, notum est, cum menses aliquando ante conceptum emaneant, alids post conceptum pergant fluere *Siegmundin* p. 192. Undecimestrem equidem *Peirescius* dixit apud *Deusm. Muscip.* p. 40. & talem se ipsum facit *P. Aponensis* dictus *Conciliator* apud *Marc. Donatum* p. 373. *Hedrianus* apud *Gallium* pro undecimestri rescripsit l. c. cui etiam *Varro* faveo ib. & *Giesenses* apud *Valentinum Pandell.* p. 146. & *Parisinus Senatus* in principis *Condei* causa. Annuos la *Motte* proposuit *obs.* 76. & admittunt *Ingolstadtenses Valentin. novell. cap.* 3. Porro tredicimestrem tuitus est apud *Plinium Mosurius*, & pa-

trem suum eo mense natum esse *Cardanus* auctor est. Quatuordecim mensem fetum refert *Peirescius* & *Alex. Benedictus*. Alium, sedecim mensem *Bartolinus* habet *Cent. III. lib.* 51. & *Harvius de partu* p. 260. & ex tumore *Spigelius* l. c. Octodecim mensem partum, dentatum refert *Bignoli* p. 145. ex *Pantoto*, & alium apud *Peirescium* lego l. c. alium *Sennertus*, sed de auditu, *prax.* L. IV. P. II. p. 168. & octodecimestres, atque vigintimestres *Monspelienfes* pro legitimis admittunt *Moebio* teste p. 370. Novemdecim mensem dentatum *Marc. Donatus* p. 374. Vigesimo mense natum *Sennertus* habet, viginti duorum mensem *Bianchi* p. 144. *Opusc. scientif.* XIII. p. 443. Viginti trium, ex *Peirescii* observatione *Deusm. fet. Muscipont.* p. 40. & collectionem partuum ferocinorum vide apud *Schirrig Embryol.* S. IV. c. 2. Sed his omnibus, quantum video, fides integra nequit adhiberi.

- (4) Etiam in fornacibus Aegyptii hic terminus servatur *Muller* r. *palaeol.* p. 580. *Thevenot.* L. II. c. XI. *Lucas* *It. ult.* p. 280. Sed & araneoli intra eandem 21. dies excluduntur ex ovulo p. 5. In Antillis tamen insulis pullum exclusio aliquot diebus velocius procedit du *Tortre* *lib. des Iles ant.* II. p. 266.

Tom. IV. Pars II.

I i

dus loqui, ultimus fatus est „ non ratiociniis, sed experiendo rem esse aggrediendam, atque se in proximo conventu aliqua propositurum, quae huc facerent. Ergo adtulit bombycem (5), iussit quaerere futuri papilionis alas. Frustra conabantur omnes, cum ille, fumina, qua valebat, manus dexteritate, explicavit latentes alas, futuri papilionis proboscidem, ut appareret, jam dudum in longum diem naturam partes formasse, postea extricandas. Sed idem in homine obtinere embryo docet, cui nulla videntur crura (6) esse, manus nullae, cum tamen habeat utraque, & incubando demum extricet (7). Hoc nunc dat pater, sed unde

- (5) In eruca latet formatus papilio *Svammerdam. Bibl. nat. p. 579. T. XXXVII. & potest demum cutem extrahi l. c. tum in chrysalide: & chrysalis est fasciatus atque larvatus papilio IDEM. bist. insect. p. 7. Reaumur Mem. pour servir a l'hist. Tom. I. p. 353. Mem. IX. Maltigh. de bomb. p. 26. Idem etiam in muscis aliisque insectis verum est Svammerdam bist. gener. anim. p. 33. Mutationem vero chrysalidis in papilionem Svammerdamius exhibet bist. gen. inf. T. XIII. C. F. bibl. nat. p. 389. & coram Thvenotio se praestitisse testatur bist. gen. inf. p. 21. 22. In Ephemero haec mutatio etiam magis subitanea est REAUMUR T. VI.*
- (6) In porco, qui videbatur apes, pedes contracti latebant VALISNERI C. 17. c. 6.
- (7) Gravissima haec questio est, physica & anatomica. Quomodo struatur corpus hominum & animalium? An ab anima, aut plastica aliqua potentia? An per epigenesin, particulis alimenti secundum aliquas mechanicas leges se conjungentibus in praescriptam suae speciei fabricam? An omnia viscera, & muscoli, & solidae reliquae partes pridem in primis initis invisibilis embryonis humani adfuerint, atque successive demum adpareant, ubi ab influente humore paulatim dilatata, molente nata fuerint visibiles? An demum semen, ex omni parte

maris aut feminae, aut utriusque destuens, iconem quasi harum partium modulo expressam induat, atque adeo similitudinem parentum internam in fabrica, tum externam in facie exprimat, ut auctor sentit libri *αἰσὶ ἰσπὶ ροσὶ* & *αἰσὶ ροσὶ* δ. & alii, quos citat *Aristoteles de gener. anim. L. I. c. 17.* & ipse fere *Stagirita L. IV. c. 1.* & *Sphaerus apud Laertium L. VII. c. 1.* & passim inter recentiores aliqui *Archangelus p. 136. Collins p. 539. 540.* & Itali, quos *Bourguet*, refutat, & ipse pene *Bourguet*, ubi similitudinem parentum explicat per semen paternum, quod sit *extrañum spirituosum* totius corporis paterni *L. 4. p. 154.* Sed evolutionum theoria fere ubique obviat a *Svammerdamio prodr. p. 22. bist. gener. inf. p. 42. 43.* & *Maltighio* proposita *postib. p. 82.* Eandem *Malebranchius, Peyerus in mercyl. p. 51. Brendel in obs. anat. Berger p. 462. Valisneri della gener. C. XIII. n. 7. c. 14. 15. Bourguet. Lettr. IV. sur la generat.* & alii defendunt, itque plerique in ovo quidem germen, sive machinulam humanam perfectam docent includi *Svammerdam prodr. p. 21. bist. gener. inf. p. 46. Berger p. 463.* nempe cicatriculam *Maltigh. postib. p. 81. Harvey p. 174.* Neque pauci eorum in ovario Evae omnia hominum corpora formata & complicata creata esse ajunt, quae sensum ab alimentario humore distendant.

ascendantur, donec in animalium formam molemque incrementum *Svammnerdam* l. c. *Valineri* c. 16. &c. *Poyer* l. c.

Alii panunt diversi, una quidem creata esse corpora animalia, sub initio mundi, sensum vero demum evolvi, quando in proprium & faventem locum incidunt, in quo alii possint, neque in ovario primae matris, sed ubique in orbe terrarum dispersa latere *Perrault mecan. des anim.* p. 481. &c. in *Anc. Mem. de l'Acad.* l. p. 279. donec longa dies laborque mutabilis aevi explicet complicata organa. Eadem sententia est *H. Fabri de plant. prop.* 98. *de gener. bom. Prop.* 76. &c. &c. *Sturmii in Phys. eccl. T. II. &c. Lantilii E. N. C. Doc. III. ann. 2. obs.* 117. *scbol.*

Alii denique unice in vermiculo hominem praexistere volunt, inter quos *Præceptor* est, qui omnes in eo conveniunt, ut fabricam totius corporis in embryone primigenio delineatam stant, quam deum calor, & resorbtus humor, expandat. Addunt, eas ipsas partes, quae in quibusdam animalibus regenerari videntur, ferre paratas adfuisse, atque unice dilatatas fuisse, ut de lacertarum cauda *Perrault de la gener.* p. 511. cancrorumque chelis *Bourguet L.* 3. p. 126. Pro hac sententia maxime adduci solent plantarum delineationes in semine, v. g. fabae, aut radice, ut in Tulipa, Colchico, bulbo narcissi, tritici tubulo du *Hamel* p. 167. tum dentes secundo subnaturi *Anc. mem. de l'Acad.* l. p. 8. &c. velut in thesauro ad futuros usus repositi; deinde insectorum illae metamorphoses, per quas manifestum est, animal integrum sub alienissima forma, & diutissime quidem *Reaumur* 11. p. 30. latere posse, donec suo tempore, accedente velociori cordis motu dilatatisque va-

sculis, occulti & invisibiles animalis latens fabrica in apicem prodeat. In ovo testudinis animal delineatum ostendit *Doverney Anciens Mém. l. p. 345.* Cultis evolutionem *Hook microgr.* p. 187.

Verum, etsi cum hac theoria educatus fuerim, cogor tamen cae desererere, neque enim video cum phaenomenis posse conciliari. Non quidem argumenta *Hartshakeri* placent, sumta ab inimaginabili parvitate primorum in Eva stamnitum, satis gnarus & falsum eum calculum posuisse, cum male eandem in singulis generationibus rationem ovi prioris ad stamen posuerit contentum, quae hominis adulti est ad ovulum, &c. denique imaginationem proportionibus desigendi ineptissimam esse. Neque moveor ratione a nupero egregio scriptore protulata *van der Natur* n. 580. „non alia praeter densissima corpora esse, quae in magna ratione dilatentur, &c. dilatata adtenuari atque debilitari, cum in animalibus perfectum nempe, summe dilatatum, stamen primordiali illo pene infinite durius sit. Ad hanc enim objectionem responderetur ex theoria *BOERHAAVIANA* incrementi *CDLXXVI.* not. 1. Neque moveor mollitie flaminum, apud *TAUVRYUM* opposita, quae non possint immutabilia poni in tanta mollitie p. 6. ipsa enim parvitas ad perpetuitatem facere potest.

Verum ecce rationes meas. In plantis, sed perinde in animalibus manifestum est, fibras (sed animalis solida nulla sunt praeter fibras) ex liquido generari. In arboribus succus humectus ab in cellulosa sanguinem, haec exsiccata in *fila*. Pulpa pomorum, farina triticorum &c. merus effusus & coactus succus est. In animalibus manifestum est, per morbos, infinitis locis ex glutinoso liquido

liquido cellulofam perfectam generari, in adhaefionibus viuecerum, & fibras validiffimas in offium articulationibus fecundis five analogis. Porro non cerebrum folum *Maitreian* p. 168. fed dentes ex flaido perfecto mucoso nati notum eft, abique fibris primigeniis, cum tamen inter partes corporis humani duriffimae fint. Denique cellulofa fabrica, quae corporis partem maiorem conftituit CCCL. manifefto ex folo liquore compingitur CDXXVI. 3. Deinde certum eft, partes nonnullas, quae fuerunt in fetu, perire & destrui, ut in paffione afperae arteriae truae *Reaumur* I. p. 613. & novae fuccedere abiectis prioribus; ita ventriculus & Inteftina in ehyfalide novis fubnatis Inteftinis a ventriculo reparamur ib. p. 170. caudaeque & branchiae pereunt ranis noftreis fub follicitum *Harvei* p. 118. *Bradley Philof. accouit* p. 105. (furinamentibus fubnafcuntur SEBA 1. T. 78. E. N. C. Cent. IV. obf. 171. &c.) pulmones vero prodeunt SEBA T. CX. f. 4. 5. argumento, non talem, quales fumus, hominem, neque eafdem, quae nobis, in primordiis partes fuiffe, & maximi momenti mutationes in animalibus fuper illa primordialia flamina accidere. Huiusmodi objectiones contra PEYERUM etiam BRUNNERUS propofuit. Sed etiam regenerationes chelarum, caudarumque laceratorum plus in reffeffu habent. Illae quidem rudem molem, fed tamen fatente CLPERRAULT p. 508. THEVENOT *anc. mem.* II. p. 6. cartilagineas habent teftas cuae. Hae organicae, mulculis, valis, nervis inftrudae, certiffime tamen fimillimae reparantur, accurate obfervante Cl. REAUMUR *Mem. de l' Acad.* 1712. p. 297. lente quidem & poft folidum menfem & ultra p. 306. fed ubicunque flegeris,

& in qualibet articulatione p. 301. faciliffime tamen in quarta articulatione p. 300. 302. ubi maximum fractious periculum eft; ubique veto nihilo neque minor, neque major, quam prius fuerat, ex carne lentum educta, & organicam induente figuram chela redit f. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ita & pedes cancrorum p. 306. & fola forcipis altera medietas ib. & cornu, & brachia, quibus cibum fibi cancer nimitrat p. 307. pariter & perfecte reparamur.

Porro ipfae nobiliffimae partes corporis non tales, quales nobis funt, in primis flaminibus effe, manifeflum reddit cor fetus, quod ab initio curvus fimplex canalis eft MALP. *de ov. incub.* f. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 25. Is hora vigefima octava varicosus apparet LANCISIUS *de corde* p. 40. contorquetur in unum f. 26. fed fpiralem ductum, porroque in quatuor bullas hora quinquagefima, ut MAITREIAN p. 51. tunc in duas veficulas MALP. *de ov. incub.* f. 29. 30. *de form. fet.* f. 15. 26. 17. LANCIS p. 42. denique die quinto veficula dextra ad finiftram accedere incipit, & utraque ad bafin cordis MAITREIAN p. 125. die vero feptimo conjungitur utraque LANCISIUS p. 43. & nafcitur cor biventre MALP. *de form.* f. 20. cui veficulae feftio, in ovo incubato, fibrae rubrae adnafcuntur HARVEI p. 61. BACK *allog.* p. 45. MALPIGHIUS autem poft triduum carnem cordis vidit *de incub.* p. 7. Haecceque mutatio etiam maioris momenti videtur, cum per omnium fcriptorum confentientes figuras & defcriptiones, in his pulli primordiis, fanguis, per continuum canalem a dextra aure & cordis dextro thalamo in finiftrum cor veniat, nullo haftenus pulmonum veftigio, quos tardius oportet fubnafci; vid. MALPIGH. *de form. fet.*

fet. de incub. p. 6. MAITREI. p. 122. Porro adeo non nostri similis est embryo, ut viscera omnia extra corpus gerat nuda sequentis, nullis nunc costis, nullo cranio, neque abdominis musculis velata MALPIGH. *de ov. incub. l. 36. 38. de form. fet. l. 17. 18.* Ita in tertio HARVEI stadio se habent p. 282. die sexto p. 62. deinde primo cor HARVEI p. 283. ante diem decimum LANGLEY p. 147. post diem septimum HARV. ex. 21. MALPIGH. *de ins. p. 8.* LANCISIUS p. 44. tunc occur HARVEI l. c. & cerebrum ID. ex. 21. (cui caro die sexto supertenditur MALPIGH. *de form. fet. p. 8.*) in corpus recipitur, ut 14. die adhuc intestina de puli corpore propendeant Harvei p. 67. Sabra-der p. 179. sensum deia in ventrem retrahantur LANCIS p. 44. Harvei p. 234. MALPIGH. *de incub. l. 52. 8cc.* (qui tamen etiam decimo die ventriculum & intestina in ventrem recepta vidit *de form. p. 10.*) non in pullo solum, qui a partu vitellum cum abdomine circumferret Harvei p. 69. sed in vitulo DESVIG l. c. in dama Harv. p. 234. ex. 69. & ipso homine; unde recentia ex vitio aliqua fabrica pristina, non rari fetus sunt, in quibus viscera nuda adparent deficientibus abdominis involutris, ut ipse vidi, & HORST. post Donatum L. VII. c. 3. *Panarolus Pentec. II. obs. 1.* Eisholz in *progr. Zod. Gall. III.* p. 28. *Hildanus obs. 65.* Cent. VI A. HAFN. I. n. 110. & in E. N. C. Dec. II. ann. 6. 7. *observ. 232.* Dec. II. ann. IX. *obs. 98.* Vol. I. *obs. 236.* Covper T. 61. *Stalpart van der VViel Cent. II. obs. 33.* Brasil. 1721. M. Jul. 1724. M. Apr. Mekren *obs. c. 6. Comm. Nor. 1737. bebd. 10. 41. 42.* T. 1. l. 1. E. N. C. Vol. VI. *obs. 10.* Bubbner 1739. p. 418 III. Teichmeyer *med. for. p. 87.* Giorn. de Letter. & Ital.

Fol. XXXVI. Non ignoro Cl. *Mastretan* negare hanc cordis nuditatem p. 110. 116. 117. 185. ad diem ulque decimum octavum, quo in pectus recipiuntur p. 253. suffecerit autem, etiam ipso satiente, intestina extra abdomen esse.

Ultimo omne fere effugium auferunt experimenta in plantis & animalibus facta. Arborum quidem quaecunque particula plantata totam cum infinitis floribus, fructibus, foliisque arborem repraesentat, & tamen in eo rano nihil fuit, praeter fistulas, & cellulolam fabricam, qua fistulae faveantur, idemque ramus, qui nunc floret, si inverso loco plantatus fuisset, pari facilitate, abisset in radices, a foliis floribusque diversissimas. Haec notissima sunt. Sed id novum est, polypum aquaticum, ignobile animal, aut sponte deponere brachia juvenescientia, quod viderat anonymus *Anglus in Phil. trans. n. 288. abridg. Vol. V. P. II. p. 288. seqq.* aut discissum & discissorum particulas, & denum animalis medietates secundum longitudinem separatas REAUMUR p. 55. restitueret perfectum animal, quorum singulum post paucas, 7. 8ve horas, aut certe viginti quatuor REAUMUR p. 55. venabatur, & sumet cibum; deinde discissas particulas sibi adplicatas iterum solidescere in integrum animal, etiam inverso modo coaptatas. D. TREMBLEY inventor est miri phaenomeni, quod casu potius quam de industria reperit Reaumur p. L. III. & in *Phil. trans. n. 456.* & apud BAKER *of microsc.* Deinde JUSSEU ib. in alia specie polypi & Reaumur in *Prasf. ad VI. tomum bist. inf.* & in tribus polyporum speciebus ID. p. 57. & in aliis animalibus p. 54. tum LYONNET ap. Reaumur p. 56. MORTIMER in *add. ad Phil. Tr. Vol. 43.* eadem viderunt. Eadem

dem nunc constat proprietatem esse magnae illius classis stellarum & urticarum, neque paucorum inter animalia aquatica *Reaumur* l. c. p. 63. ex piscatorum & accuratiori D. GUETTARD & GERARD de *Villars* observatione p. 60. 61. 63. & JUSSIEU BAKER p. 99. & eam in vermibus aquaticis a P. MAJOLENI repertis *Reaumur* p. 99. & BONNETO teste ib. p. 96. & *Reaumur* ipso p. 98. & terrestribus demum lumbricis ID. p. 64. atque scolopendris p. 99. & quibusdam hirudinibus p. 98. dominari. In his omnibus, quod crux fuit, id nunc in caput, os, ventriculum, totumque corpus insecti fingitur, uti ramus arboris plantam totam reparat. In scolopendris vero organica pariter fabrica, & aculeus renascitur, quo praedam confodiunt *Reaumur* p. 99. & in lumbricis caput in parte posteriori generatur, partemque generationis, capiti in hoc animale proximae p. 64. Difficillimum nunc mihi videtur dictu, quod tamen necesse est dici ab evolutionis fautoribus, quomodo in systemate primordiale & constantium fabricarum, pater polypus fuerit series connexa diversorum animalium, quae omnia conjuncta quasi articulata, in unum animal confluant, una moveantur, uno ventriculo alantur, una voluntate gubernentur, & eadem tamen animalia aut sponte aut per vulnus, secedant separata in suae spontis animalia, absque excussis involucriis, abique deposita parte, qua primordiali polypo cohaerent, & uno verbo quomodo, quae mane taleolae spiniae, ventriculi, capituli fuerunt, ea a meridie in vera capita & integros ventriculos abeant. Admiratio vero major est, si etiam secundum longitudinem dissectos polypos conspiciat, atque in animalis integri

fabricam redire observet apud MORTIMERUM p. 9. REAUMUR, Denuo augeatur miraculum in REAUMURI experimentis, in verbis terrestribus capitis, quorum pars posterior non ventriculum solum & caput, sed partes genitales reprodixit, ut supra dictum est. Nulla hic spes explicationis, nisi concedas fibras polypi infinite constantes, quocumque modo dissectas, iterum se adtrahere, inque animal configrari posse, cujus nulla in his fibris similitudo fuerat. Taeniae humanae huc pertinere videntur.

Quare mihi quidem videtur haecenus probabile, animalium partes successive, ex fluido, secundum certas leges generari, ut *Aristoteles* docuit de gener. anim. L. II. c. 4. *Harvei* de gener. p. 122. *Hartman* E. N. C. Dec. III. ann. p. 10. & nuper auctor scripti von der natur n. 885. & Cl. Noortwyck, & Cl. Ludovig in propriis thesibus. Leges autem illas minime definimus: a fermentatione tamen omni longissime credimus abesse, quae & nimis subita, & nimis in tanta tenebre violenta, nihilque organice paritura sit VA-LISNERI c. 15.

Ergo, si quidem vermiculum pro primordio hominis admittere videtur, vasa forte aliqua suis percurfa liquidis in vermiculo fuerunt, quae sensum complicata, subnascente ex densato effluo liquido spatiorum cellulorum cellulosa tela, in cor, arterias, viscera, musculos contrahuntur. Venae & arteriae sunt fundamenta corporis HARVEI p. 64.

Plasticarum idearum etiam non pauci, neque exigui patroni sunt. In animalibus quidem animam corpus suum sibi struere GALENUS diversissime docuit de form. fetu, & Themistius, & I. C. Scalliger, & Bobnius de offic. med. p. 622. & nuper pro re certissi-

ma

unde habet? Ex teste certe suo, nullibi enim praeter testem, viamque a teste in urethram, animal adparet.

2. *Mare*) Extinctio (7^a) vividi genitalis humoris. Singularia experimen-

ita tota *Stahl*i Secta docuit. Modificationem etiam partium regenerationem quodam omnino modo animae tribuebat *PERRAULT de la gener.* p. 512. Verum, cum alii viderent vegetabilia multis, & valde essentialibus notis cum animalibus convenire, non animas, in plantis vix credibiles, sed entia peculiaria fabricandis corporibus organicis praefecerunt. Ita *Harvii* (si recte intelligo) p. 43. *Cudworthius*, & *Grevio in sacra cosmol.* & *Rai synops. quadrup.* p. 34. Haec etiam sententia placuit *COLLENSIO* p. 620. *VVeffero E. N. C. Dec. I. ann. 3. obs. 129.* *Draio L. I. c. 24. Vesutio*, & *Nigrisolio*, qui hanc animam lucem *seminalem ideatam* vocat p. 337. 338. quae in ovo sexum delineat. Apie denique *Redus* insecta gallarum ab anima arborum vegetabilium stui credidit *de gli insetti* p. 88.

Adducunt fere priores, *Stahl*iani maxime, naevos ab imaginatione materna *STAHL*. p. 492. similitudinem parentum, errores, monstrum manifesta, ut credunt, argumenta & stui fetus, & ab ente finito stui, & in struendo mutari posse. Verum ante me *VALISNERIUS* ornate demonstravit, nimis artificiosam esse fabricam animalium, quam quae possit ab anima imperfecta, saepe stulta, semper ignata & incia stui c. 15. n. 9. atque *NIGRISOLIO* reponi potest, quando praedelineata stamina dicit esse, & animam tantum secundum divinam delineationem struere p. 342. id omne quod contra evolutiones dictum est. Sed etiam *Lockiana* demonstratio huius theoriae repugnat, ex qua constat omnes ideas, adeoque omnem peritiam nobis per sensus

advenire, nullam adeo animae pulli gallinacei sui corporis struendi, nullam animae fetus humani fabricandi corporis humani facultatem esse posse. Non ignoto *Lagor* & *Lagor* voces, quae intellectum absque perceptione rei intellectae, voluntatem absque notitia ponunt eius, quod volumus. Deinde plurimum contra animae vim struictricem faciunt exempla plantarum, quarum singulae partes singulam arborem reparant, adeoque in una arbore infinitas animas poni necesse foret, quod validum argumentum, acutissime, ut solet, urgit *Ill. VVeribosius* noster *causal. de febrib.* p. 78. De naevis vide not. 16. & interim accipe, nihilo rationes in plantis naevos esse, & monstra, & bicipitia stamina, & petala ex staminibus, ex nectaris multiplicata, ubi manifestissimae degeneraciones, similes illis, quae nectris ferubus accidunt, absque suspitione, nisi fallor, aberrantis animae, per sola hortulanorum mangonia procurantur.

Modulotum denique theoria inexplicabilis est. Nam modulorum icnes recipit cetera, sed congruens & aequalis modulo; quid autem ad corpus vtile guttula feminis? & quanam liquidi confusi inorganici cum perfectissima fabrica corporis similitudo? Tum recte *Aristoteles* „etiam a mancis inuegros genetari *bist. anim.* L. VII. c. 6.

(7^a) Inde sterilitas a gonorrhoea *DCLII*. neque tamen perpetua, nam etiam a lue cum reliqua valetudine sana animalia reparantur. Huc forte pertinent frigiditates hominum optimi habitus, passim observatae *E. N. C. Dec. III. ann. IV. obs. 31.*

rimenta in hanc rem capta sunt. Testium ablatio hoc demonstrat. Cru-
delitas hominum ingeniosa est: docuit spadones facere, quibus soli tes-
tes contunduntur, ut discernere desinant. Penem habent, & prostratas,
& unice defunt animalcula, sed steriles sunt (7**).

Femina) Quando vel ova bona defunt, vel ovaria scirrho vitiantur,
vulgatissimo (8) malo, nihil enim frequentius est in steriliu[m] femina-
rum cadaveribus, quam scirrhom in ovario duritiem, aut hydatides
reperire. Possunt etiam ovaria (9) ablata esse, quod fit in porcabus;
his enim exsectis ovariis nullus unquam partus sequitur, licet venerem
passae fuerunt. Porro inter causas obstructionis est tubarum (10) Fallo-
pianarum obstructio. Iterum uterus potest nimis siccus esse, aut nimis
fervido perfundi sanguine, aut potest mala in fundo uteri dispositio ad-
esse (11), quae intercedit, ne placenta ibi adfigi, aut uterus expandi
possit, frequens etiam malum, centies visum HARVEIO. Praeclare HIP-
POCRATES (12) „ mulierem non concipere, vel quia uteri rheumatif-
mo laborat, *μικτρισμῳ* aut mucoso fluxu, qui per purgantia medicamen-
ta fortissime sanari potest. Eundem eventum post diuturnum fluorem
album saepe vidi, & sanitatem diaeta exsiccante, myrrha, rheo, aut
tamarindis restitui, uti egregie CHARLETONUS monet. Ita enim sicca-
tae cotyledones melius comprehendunt, quam prius, in nimis lubrico
utero. Si a scirrho uteri malum fuerit, laxantia adjuvant, & balneo-
rum usus.

Utrisque) In Gallia illustris casus (13) contigit. Princeps (I. G.
nobilis) erat, qui diu cum optima uxore in sterili conjugio vixerat.
Ultimo ex iudicio supremæ curiæ conjugium solutum est. Eodem con-
silio capto maritus in viduum thorum aliam uxorem ducit: & vidua nu-
pfit

[7**] DCLL. Verum in viris multae aliae
causae huc pertinent, omnia nem-
pe vitia, quae feminis boni vali-
dam ejectionem ex urethra impedi-
unt: ut scirrhi prostratae, ca-
runculae sive cicatrices circa ve-
rumontanum DCLIV. defectus ali-
quis in erectione &c.

(8) Ut ex Morgagni citavi, & ipse re-
perio, nihil steatomatibus, & hy-
datibus ovarii frequentius esse.

(9) DCLXVIII.

(10) DCLXVIII. *Ruyseb. obs. 83.*

(11) Qualis frequentissime post abortus
superest, novorum causa abor-
tuum. Sed & scirrhi in utero ste-
rilium vulgo reperiuntur *Roussel*
de partu caes. c. 3. Hildanus Cen-

tur. I. obs. 65. 66. HIPPOCRATES
lib. 2. Et sola obesitas sterilita-
tem facit apud HIPPOCRATEM,
PANAROLUM, SCHURIG. *Syl-*
leptot. p. 173. & GEHEMA, &
alios. Sterilitas plerumque est a fe-
minarum vitio MANNINGHAM
p. 47. *Auctor tr. de l'impuissance*
Paris. 1611. ll. p. 46.

(12) *πρὶν γυναικὶ α.* de menses pi-
tuitosis.

(13) Exempla passim reperio, sed, fa-
teor, fere ad defectum veri amo-
ris refero. Habet *Aristoteles* L. VII.
c. 6, la Motte L. III. c. 4. *Mann-*
ingham p. 48. E. N. C. Cent. X.
obs. 67.

plis alteri: & ille filios, haec prolem pariter ex secundo conjugio tulit. Adparet foecunditatem etiam a mutua quadam relatione pendere posse, abique ullo absoluto vitio, aut viri, aut feminae. In brutis animalibus observatio frequentior est, & saepe accidit, ut generosissimi caballi equas minime inpraegnent, quae ab aliis admiffariis facile concipiunt.

3. *Masculino*) Ita ineptissimus homo PARACELsus (14) asfirmavit, puerum nasci posse, eumque a peccato originali liberum, tenero quidem corpore, sed excelsa mente, omnium scientiarum peritum, & arcanorum, atque ali posse quintessentia panis. Somnia mera sunt, neque enim ullum adeo abjectum animal est, quod a solo mare generari queat, aut planta ulla.

4. *Femina*) Confirmant quidem publicis iudicium (15) testimoniis, id fieri posse & accidisse, ut feminae vel absente marito, vel eo mortuo conceperint, absque adulterio, ex luxuriosis insomniis & vivida imaginatione. Verum tunc credam, quando unicum exemplum in rerum natura mihi demonstrabitur feminae, quae absque mare, ex ovo fetum genuerit. Video mulieres fuisse, satis astutas, ut persuaderent credulis, a Marte se inpraegnatas fuisse: alias, quae cum vetero ex foco promimente consuevisent, atque peperissent, ut de Theleo narrat PLUTARCHUS. Verum in rerum natura nihil simile contingit (15*). De potentia

[14] Conf. Marc. Don. p. 466. *Franci satyr.* p. 154. ex semine nempe virili, in phiala, calore fimi equini coagulata, posse educari homuncionem.

[15] Praeceptor tangit responsum Senatus Gratianopolitani, quo parius, ex absente patre per imaginationem conceptus, legitimus pronuntiatus est. Sed historia tota suspecta est *Bartbol. bist. Cent. VI.* p. 298. & falsa *At. Hafn. Vol. V. obs. 84.* p. 202. *Gai Patin in epist.* Vide huiusmodi fabellas apud *Seburiq. spermatol.* p. 223.

[15*] Hic paucissima dicenda sunt de aequivoca generatione, quam omnis antiquitas admixit. Omnia animalia, inquit *Aristoteles*, generantur aut sponte, aut ex ovo, aut ex parentibus *bist. anim. L. V. c. 1.* Recentiores, & strenue imprimis *Redus*, & *Valisnerius*, incepterunt se huic opinioni opponere, quam etiam LEEUVVEN-
Tom. IV. Pars II.

HOECKIUS refutat *esper. & cont. ep. 75.* & imprimis demonstravit *Redus*, omnes vermes ex parentibus generari *Esper.* p. 9. &c. neque unquam carnes bene clausas verminare, experimento in Anglia a Societate Regia facto jam an. 1663. *Monconis itin. V. II. P. II.* p. 47. tum a *Redo degli insetti* p. 16. 17. 20. *Lancifio de pa. ind. nox. L. I. P. I. c. 16.* *Valisnerio in dialogis* p. 166. *Leeuwenboeckio* &c. nasci vero a mulsis, quae magno conatu carnes putrescentes circumvolitant, & ova eo contentur depotere *Redi. ib. p. 15.* & ne in caseo quidem vermes absque mulsis nasci *Idem* p. 64. Nunc error ille exolevit. Frustra *Bonannus* numerosas objectiones procul, & *Triumphettus*, & *Hon. Fabri* p. 186. & inter recentiores aliqui, ut *Bresl. 1722. M. Nov.* & experimenta proferunt aliqua, alii quidem de vermicibus in clau-

tia vero creatoris hic nullus sermo est. Imo adparet, conjunctionem marium cum similibus feminis adeo necessariam [15*] esse, ut ex parentibus non ejusdem generis monstra nascantur unice, destituta genitali potentia [16]. Quando gallus phasianus vulgarem gallinam comprimit, hybris

sis locis nascentibus, a *Redo* refutati *de gli anim. viv.* p. 40. 41. alii (ut in E. N. G. *Deef.* Ill. ann. 9. 10. obs. 11.) ova producantur ex papillione virgine, ab ipsa nativitate sua custodita, postea, nemo fere superest, qui crederet, soli calori, aut putredini, tantum sapientiae esse, ut pulcherrimam fabricam, quae etiam in minimis infectis elucet, possint ordinare: eum praeterea, solis exceptis Polypis & congeneribus, omnium animalium ova nunc nota sint, & etiam polypi non sponte, sed ex parente, aut trunco certe generentur, aut ex ovo *Reaumur* l. c. p. 76.

[15*] Nempe in nostro, & adfinitus generibus animalium. Pisces deum ova ponunt, poſt brevissimam, sed aliquam sexuum conjunctionem *Duvernoy* *anciens mem.* II. p. 112. Nam in genere limacum immobilium, omnino notissimum est, utrumque sexum inesse singulo animali *Borell.* b. fl. 84. Cent. II. *Leeuwenboeck phil. trans.* n. 336. *Svammerdam* de respir. p. 114. *hist. de l'Acad.* 1708. p. 58. *Redi de gli anim. viv.* p. 22. T. 9. f. 1. *Lifter de hum.* p. 229. *Brady Phil. account* T. 21. f. 3. Sed & terrestres lumbrici androgyni sunt *Reaumur* l. c. Aliquando vero & pisces du HAMEL p. 354. & cancri androgyni reperiuntur. Porro classes dantur animalium, in quibus aliquae feminae, mares plures; plurima individua absque sexu sunt. Huc apes pertinent, ex *Svammerdamii* observationibus, & fuci *Reaumur* T. 6. & formicae *Lindvall.* de formic. gregariae fere animalia. Deinde in immo-

bilibus, testaceis animalibus, ova vera concipi in omnibus individuis absque ullo sexus discrimine, certum est. Denique in stellis, echinis, urticis, penia marina, balano, taenia, polygo, nullae unquam gentiles partes alicuius sexus hactenus innotuerunt *Bourquet* p. 78. *Mortimer* p. 6. 7. atque soli polypi prae pagani speciem ab omni commercio remoti *Trambly* ib. Sed & pediculi, tenerum, & molestum genus animalculorum, parium: absque venere viva animalia, experimentis exquiritis capitis *Bonneto* teste apud *Reaumur* Tom. cit. p. 530. 550. &c. & *Baxino* & *Trambly* ibid. p. 538. & *Reaumur* ipsis: quibus *Leeuwenboeck* & *Cisson* praecaverant. Augeret miraculum, quod idem pediculorum genus *Lyonneto* auctore p. 553. etiam coeat, ut ipse muscas, mares pediculorum, nimis frequentes video in hybernaculis. Adparet ex istis, non adeo, quam putabatur, uniformem in generando naturae methodum esse.

[16] *Aristoteles gener. arin.* L. II. c. 7. magna sapientia CREATORIS, qua cautum est, ne repetitis disparibus coniugiis, novae in infinitum species nascerentur *Valisneri* c. 20. n. 17. *Pluche hist. du Ciel* II. p. 262. 263. In caropardo, hybride ut creditur animale, nulla vasa spermatica & organa generationis valde imperfecta *Parryni*. Ita multi, omni stellatio generationis instructi. *Peyer exor.* p. 156. & mulae, ovaris & ovibus praeditae, viz unquam pariunt, ut inter monstra soleat referri. Exempla tamen habet de mula *Aristo-*

hybris nascitur, puleherrima in mensis, sed inepta speciei propagandae (17).

5. *Menstruus*) Haec tota theoria ex Asia (18) ad nos adlata est. Ibi homines in otio vivunt, molles prae calore & sedentarii. Feminae plerumque largissimi menses patiuntur. De hoc sanguine aliquando non-nihil in vagina manet, & intra sex vel decem horas in foetidissimam putrilaginem abit. Sed etiam columbae sanguis, vertici hominis apoplectici inpositus, post paucas horas immane foetet. Hinc illa mensium detestatio, & omnium gentium consensu in servidis Asiae, Africae, Americae, regionibus balnea feminis imperantur. In nostra etiam patria similia vidi in feminis immundis, aestivo tempore menses passis. Si nunc vir huiusmodi feminam iniverit, in cuius vagina putridus sanguis stagnat, & ad servidum aerem venereus aestus accesserit, incidet utique in pessimos morbos partium genitalium, etsi diversi fuerint a vera lue celtica. Haec infamiae causa fuit menstruo sanguini: & eadem ratio est, quare MOSES, saluberrimo, neque alia dedit unquam, praecepto edixerit, ne vir menstrua patientem feminam conprimeret; si contra legem faceret, ut id capitale esset; diesque certos & a partu, & a fine menstrui fluxus defini-vit, post quos, balneis primo ablutae, feminae liceret virum admitte-re. Sacerdotes Judaeorum, qui dudum in literis haerent supersticiosi, hanc vetustam observationem ita auxerunt, ut etiam auram mensium venenatam esse dicerent, & exodente vi adeo pollere, ut radix Baaras, quae circa Hierichuntum proveniat, neque ulla herculea vi evelli possit, huic uni arti cedat, si femina menstrua patiens circumulum circa radicem ambulando descripserit. Ita porro receptum est, maculis saedari specu-la; si menstruata mulier inspexerit, & deleri, etiam retro vitrum, vi-vum argentum. Quanto sapientius HIPPOCRATES (18): Sanguis sanae feminae profluit ad heminam, talis, qualem ex mactata victima deflue-re videmus, recens nempe & purissimus, nisi enim victimae sanissimae

K K 2

essent,

Aristoteles bist. anim. L. 6. c. 22.
sed rarissima L. 11. sub finem,
& *Carpus* p. 270. & *Opusc. scient.*
13. p. 149. & in Africa frequens
esse *Columella* refert L. 6. c. 37.
Neque credo mulas illas Syriacas,
quas *Aristoteles* dicit ordinario pa-
rere *bist. anim. L. 1. c. 6. L. 6.*
c. 24. aut indigenas deserti Tar-
tari du *Haide deser. de la Cbi-*
me V. IV. veras, nostratibus si-
miles mulas esse. Faetur *Aristo-*
teles, Syriacas illas non ex equi

& asini missione nasci *bist. anim.*
L. 6. c. 36. Mulus autem paulo
frequentius generat *Aristoteles bist.*
anim. L. 11. sub fin.

[17] Inter aviculas etiam, quae ex ea-
dem passerum specie sunt, ex
disparibus conjugis inseculi pro-
deunt fetus, ut ex Canariensi ca-
noro passere, & nostrate cardu-
ta &c. *Villughby ornithol. p. 10.*
& de phasianis ex gallina natis
Faber apud HERN. p. 772.

[18] DCLXVII. not. 13.

essent, non poterat litari. Tum demum putrescit effusus cruor, quando inter plicas sinus pudoris stagnat. Non aliter, ac ipsi mares, in regionibus servidissimis Colechidis, Asiae, Africae & Americae praeputium rescacare coguntur, nisi gravissimis circa eas partes morbis maluerint laborare. Non ideo venenum in praeputio gerunt, si aliquando morbifica corruptio ibi nata est.

Miscela) Vulgo recepta opinio est, semen unius sexus seorsim infecundum esse, conjunctum utriusque sexus (19) semen & mistum, in rudimentum fetus abire. Haec sententia, ridicula certe, licet a CARTESIO [20] & THEODORO CRAANEN proposita sit, videtur niti in experimentis: cum mulier in venerea tentigine, luxuriosum omnino succum emittat, perinde uti vir semen effundit. Verum, post LEEUVENHOECKII & MALPIGHII conjunctas observationes, evictum esse videtur, patrem prolem dare, matrem excipere, neque muliebri semen ad generationem aliquid sui corporis missione conferre; sed eam legem esse, ut absque materno utero, nullum semen frugiferum possit fieri. Nam anatomici observarunt, ea vasa, ex quibus humor libidinosus feminarius in congressu erumpit, omnia omnino exitui vaginae respondere [21], & nihil ad cavitatem uteri dimittere, atque muliebrem lascivum humorem perinde, ut virile semen, extra corpus effundi.

Fermen.

[19] DCLXXI. sententiam istam ornate proposuit *Empedocles*, partim in masculo semine, partim in muliebri, fetus partes existere, sed discerptas, & divisas, eas deinde uniri in fetum *Galenus de semine* c. 2. ut pars gibba cavae, & vicissim respondeat *Aristoteles de generat. animal.* L. 4. c. 1. L. 2. c. 8. L. 1. c. 18. quam sententiam perfectae renovavit Anonymus Anglicus auctor libelli *essay on fecundation* p. 24. 25. Et *Hippocrates* *apud* *zorus* n. 7. &c. pene similia docuit, ut tunc crederet filias generari, quando semen muliebri praevaleret, masculos autem fetus a vivente maris semine. Id repetit *Aristoteles*, ut tamen sexum inprimis ab eo semine praevalente pendere ajat, quod de genitalibus decidit *de gener.* L. 4. c. 1. nuperque *Cl. Hofmannus Physiol. reform.* p. 341. *Voglius* ea-

dem renovavit li. p. 200. & *Anglus* ille semen maris per poros ovi subire, hoc dissolvere, partes similes seminis maris ad similes seminis feminei partes accedere, sic viscera nati *on fecundation* p. 28. sexumque a praedominio animalculi, vel seminis muliebri pendere p. 45.

[20] *De formato fetu.* Sed iste *Galenus* fere secutus, *de semine* L. 1. historiam narravit, quomodo fecundum aliquas, & satis simplices motus regulas, ex semine effervescente, animal generari queat. Et nihilo sapientior *Mazimius*, formationem fetus explicat, a particulis seminis utriusque sexus secundum leges specifici ponderis se ordinantibus *Inst. med. medic.* p. 212.

[21] HARVEI p. 95. &c. addit, feminas perinde concipere, etiam si nullum humorem exceverint.

Fermentatione) Cl. DREINCOURTIUS, quo nemo partes genitales mulierum curiosius descripsit, docuit in eximio libello, quem de *conceptu* edidit, masculum semen scatere sale volatili oleoso [22], qui inertem seminis feminini massam vivificet, & ad frugem perducatur. Sed semen masculum a natura volatili tota indole abhorret, cum vix alius inter humanos liquor lentior sit, & semen retinetur perfecte secundum in hominibus caste viventibus per menses & annos, neque virtus exhalat.

7. *Actio*) Non alia videtur, nisi seminis vitalis masculi cum semine ovi adunatio. Hinc adparet, optimum esse *conceptus* (23) vocabulum, & eleganter dici in textu hebraico, posteros ex lumbis Adami prodiisse, Evam vero, cum ipsam ADAMUS cognovisset, concepisse & peperisse.

8. *Certus*) In brutis animalibus multiparis, utero praeditis bicorni; quorum cornua uterina ex ipso fine suo tubam educunt, in his inquam brutis, conceptio in ovario perficitur. De causa vero conceptionis duplex opinio est: HARVEI prima, qui, cum semen in uteris brutorum animalium, post venerem apertorum nullum (24) reperiret, docuit, vim masculini seminis secundantem resorberi in sanguinem, & circulatione obita deponi ad ovarium, ut ovum, jam amorum ex ovario, non possit secundari unquam. Altera sententia est eorum, qui statuunt, uterum feminae, quae concepit, claudi, & semen masculum retinere, ejus seminis partem nobiliorem, per anfractus tubarum, ad ovarium venire, atque ibi, in ovario, conceptum fieri. Si vero ovum jam de ovario solum secesserit, video posse etiam in tubis, & in cavea uteri concipi, neque, quid obstat, reperio. EGO certe credo, nullum certum locum esse conceptui, atque semen masculum etiam alibi, sed in primis in Fallopii tuba, ovo occurrere, & id ovum inpraegnare. Nam in ovario, in tuba Fallopiana, & ad initia hujus tubae, ubi ex utero prodit, & in vagina denique fetus repertus est.

9. *Formam*) Historia naturalis multa confirmat, quae huc pertinent, & perinde incredibilia & fabulosa videntur, & LUCIANI historiae, & aequae tamen certo contingunt, ac id, quod est evidentissimum. Objectiones, si mater nihil ad rudimenta fetus confert, qui potest mutare fetum? Verum est omnino, non habere sub arbitrio potestatem mutandi fetus.

(22) De *Conceptu* per. 31. expulsa ex vi fermentante, radicae &c. Sed germen tamen a mare admittit de *sem. mul.* n. 18. Ita vim plasticam in parte seminis spiriuosa residere ait COLLINS p. 629.

& spiritum seminis masculini generatorem vocat CRAANEN p. 799.

(23) Conf. DCLXXXIII. not. 18.

(24) l. c. not. 6.

fetus. Nihil hic voluntas potest, si posset aliquid, quot matres puellas, quas gerunt utero, in filios mutarent! Sed neque imaginatio, etiam validissima, hic vires habet, vidi enim feminas, quae per continuos menses aiebant, se parituras esse fetum deformem (24'), oberrare enim suo animo figuram turpissimam fetus, quem essent edituræ, neque unquam ex memoria decedere: & tamen post tot querelas, vidi perperisse sanos & pulchros pueros. Verum tunc aliquid in fetu mutando imaginatio potest, quando subito, absque ratiocinio, cum horrore aliquo oritur, quocunque demum mense hoc malum acciderit. Hic horror comes individuus est peregrini, recens adlati. Nam a vi, febrem fastura, primum accedente, horror nascitur. A spectaculo misero viso horremus, & in univ ersum id nobis accidit, quoties humores nostri vel in copia, vel in motu, insolito modo se habent. Ab hac nunc horrida imaginatione, fetus idem patitur, quod contingit fieri in eo corpore, a quo horror in matre excitatur. Vidi IPEE experimenta meis oculis. Sapientissima, & primaria femina fuit, cui in nasi apicem, cum sub moro ambularet, fructus hujus arboris illapsus erat: continuo, dum illabitur miserrima bacca, pictum est in apice nasi embryonis morum, perfecte expressum, magnitudine, colore, subrotundis acinis, scabritie, minimisque pilis; & recruduit ea nota, quoties ea arbor similia matura mora ferebat. Hic nihil factum est, quam levis ad tactus nasi materni, & tanta tamen in fetu secuta mutatio. Si objiceret, idem forte signum fuisse in naso fetus apparituum, etiam si mater minime sub moro ambulasset, nihil videberis probabile dixisse, aut dignum Philosopho. Novi, quid Anglus [26]

scripserit

(24') Cum a malacia maculatus puer exspectaretur, sanus produit *Panovius Pentec. ll. obs. 50.*

(25) Et a novo chylo sanguini admixto &c.

(26) Haec naevorum historia mihi difficillima videtur. BLONDELLUS equidem, contra torum genus humanum, tuetur, nullos omnino naevos dari, neque in fetus corpore quidquam vitari ex matris quacunque adfectione: & satis mi fallor, demonstrat, neminem explicasse hactenus, quomodo vis ista a matre in fetum operetur. Struëtrix illa anima STAHLII non explicat modum agendi, neque potentiam maternae animae, diversae a struëtrice sensus anima, Spiritus, & nervorum commu-

nio, a *Wouffensio* & in E. N. G. Dec. ll. ann. 8. *obs. 121.* & a *Bradley phil. acc. of the works of natur p. 268.* proposita, debilissimo nituntur fundamento, nervorum nempe, quos nemo vidit, ab utero ad placentam commotione. Deinde facile visu est, sanguinem ex utero materno in placentam per minuta fere vasa resorberi, neque ulla impetu ad fetum venire, qui possit partes solidas, & perfectas ossa, destruere, ut in *HELMONTIANIS* historiis.

Interim obrulmur historiis innumerabilibus visiorum omnis generis, quae fetum adfecerint ex matris culpa, in muliere quidem frequentius, sed nonnunquam in brutis

brutis animalibus. Ex viso camelo equa peperit pullum ungula fissa, genu calloso, ut in camelo solet DIEMERBROECK p. 171. Feli naevus ex terrore mairis BRESL. 1713. p. 672. & in *fat. Siles.* n. 1. *obs.* 10. Porcellus cum elephanti proboscide Schurig *syll.* p. 618. In hinnulo dentium caninorum imago, quum gravidam matrem canes adluserint *Comm. Lit.* 1735. b. 10. Capella urfinis pedibus, cum mater ursum saluamem vidisset BRESL. 1719. p. 325. An neganda omnia? durum videtur. Ego, si iudicium licet interponere, non alicuiquam naevos vidi, praeter maculas omnis generis, & cutaneas quasdam excrecentias, quas imaginario in mora, mures, passeres, flammias, transformaverat: poterat autem quaecunque alia causa produxisse, quae vel cutem alicubi erexisset, vel adhaerit in valdidissimis calcitrantibus. Huc pertinet cietous *Phil. Trans. obs.* IV. P. 2. p. 124. caput felis sp. I. nu. 10. *Alb. Siler.* vaccinium rubrum HAGENDORN. malum punicum P. Servius apud Schook p. 10. uva ID. ib. cerasum Schook p. 65. bacca nigra p. 16. fragum p. 52. rubique bacca in seipso p. 5. morum Praeceptoris & Hartfoekeri suite det. conj. p. 141. Schook de sign. *fat.* p. 64. ex aliis & p. 14. Schurig *syll.* p. 544. Sennert de consensu Chym. oilreum SCHOOK petalunculus Sebrauer *obs.* 9. *Delef.* IV. mus VVeinsich Schook p. 14. Plot. nat. *bist.* of Staffordshire p. 269. maris caput Schook p. 15. ficus Stalpari *Cent.* II. *obs.* 36. tumor carnosus ad anum fetus E. N. C. Dec. II. ann. 8. *obs.* 187. inmaures carnae BRESL. 16. *vers.* p. 590. caput virulinum filiae adhaerens, ut tamen resecari potuerit Valisneri: Maculae ab incendio viso HORST post Don. p. 671. Leigh. nat. *bist.* of Lancashire L. II.

p. 4. & a circumcissione spectata Schurig *syll.* p. 554. color ruber E. N. C. Dec. 1. ann. 2. *obs.* 83. & niger E. N. C. Vol. 4. *obs.* 58. & maculae a visis lapillis Boyle de color. p. 164. aliaeque Schurig, *embryol.* p. 210. stigmata in dorso Salmuth *Cent.* II. *obs.* 15. & barba cana Schook p. 56. & quot non alia. Sed etiam dirissima illa vitia, quae fere naevis tribui solent, defectus ariuum, apertum abdomen, Haeschletter, BRESL. 1721. M. Jul. E. N. C. Dec. II. ann. 9. *obs.* 98. Gokel. tumor medullae spinalis E. N. C. Dec. I. ann. 4. *obs.* 12. & c. Dec. II. ann. 8. *obs.* 187. spina bifida TULP. *obs.* L. III. c. 10. & hydrocephalos HILD. *obs.* 3. *Cent.* V. MARC. DONATUS L. II. c. 9. & amissum labium alterum BUCHNER *miss.* 1719. p. 592. BRESL. 1726. p. 233. & labia leporina SENNERT de consensu Chym. P. SERVIUS apud SCHOOK p. 9. E. N. C. Vol. VI. *obs.* 10. BOHN. de offic. med. p. 660. MARINI *opraz.* p. 235. VVALTHER de cur. *par.* p. 22. & resectum palatum E. N. C. *Cent.* IV. *obs.* 134. & cerebri galcaeque defectus E. N. C. Dec. 1. ann. 9. 10. *obs.* 23. ann. IV. V. *obs.* 27. L. BOURGEOIS II. p. 71. HARDER *exerc.* 43. aut ossis occipitis, ut KERKRING *obs.* 64. ea omnia longe frequentius & cernus, & ipse vidi, & alii, absque ulla suspitione originis imaginariae ortae, caeque omnes vitiosae fabricae pendunt a primordialibus fabrica fetui, non vitata, sed retenta. Fetui enim abdomen apertum est aot. 3. & cerebrum nudum ib. & os enormiter fissum, atque labium superius, inferiusque nullum. Durum autem videtur, si millima mala frequenter quidem ex vitio aliquo mechanico, in fetu ipso & solo radicato, alias ab imaginatione materna oriri. Et, si nullus fetui abdomen apertum, aut

scriptor ediderit, sarcastico stylo in hanc vim formatricem inuestus. Nihil inde sequitur, quod phaenomeni causam non intelligamus. Vellem respondere rogatus, cur a conflictu globorum eburneorum quiescat, qui motus fuerat, alter autem motu a priori sublato propellatur. Alia femina ducebat fila, aut aliud quid agebat muliebris negotii, cum subito res-
spira-

aut labii superioris pars deficiens reperitur absque imaginationis vitio, cur in uno infrequensissimo casu hanc advocaremus? Ita sere veteres docebant, ex parentibus mures plerumque quidem nasci, aliquando tamen ex nubibus aut putri limo. Porro certum est, monstra plurima bicorpora nasci, absque ulla imaginationis culpa NIGRISOLI p. 5. DUVERNOI *aff. Petrop.* V. p. 255. in homine, quadrupedibus, avibus; nihil enim frequentius pullis, quibus pedes duo superflui inter veros pedes erant, trans denique, quarum imaginatio non magni haecenus facta est. Ut rarissimum sit, etiam ex conjectura hos casus ad imaginationem referri, quod fieri video de gemellis connotis a PAULINO & ZOD. GALL. 1683. p. 249. Adparet adeo, multo maiora vitia in fetibus oriri absque tetrore, aut animae maternae vitio, nihil adeo esse, quare pro exilibus illis morbulis invocemus incomprehensibilem aliquam harmoniam fetus cum matre. Iterum certum est viso vitio cari pueri matres in memoria sua sollicite quaerere, donec aliquem animi adiectum inveniant, in quo conquelescant inventa mali ratione. Sed video etiam homines, qui plurimum circa partus hominum versari fuerunt, parum his naevus tribuere MANNINGHAM p. 51. MAURICEAU p. 66. tum Cl. DUVERNOI l.c. MARCOT *Mem. de l'Acad.* 1716. sub fin. Valde adeo accedo ad BLONDELLI opinionem, non tamen reculaturus vera; & certa experimenta, ubi

& ante partum de imaginatione constitit, & naevus ejusmodi fuerit, ut non sit ex classe morborum, qui naturaliter & absque vitio imaginationis fetui accidit. Nam haecenus plurima reperio ex aliorum relatione, v. HILDANIANAS historias p. 900. & aethiopem illum SVVAMMERMADIANUM *prodr.* p. 30. reliquarum historiarum plerasque: aliquas autem manifesto falsas esse patet, ut historiam illam MALEBRANCHIANAM (vide MARCOTUM in *Acad. reg. scient.* l. c.) & conceptum illum humani fetus in collo, & imaginatione maris subnati E. N. C. *Dec.* II. *ann.* 10. *obs.* 56. & leonem illum Lipsiensem, verum puerum, lepoto labio, quem *Linckius* refusavit; *conf. Brasil.* 1723. *Maj.* E. N. C. *vol.* 1. *obs.* 74. alterumque leonem a *Mysticellio* recensitum *De novis letteris* p. 173. & sapienter explicatum, naturali laborantem exemplum, sed verissimum puerum; aliudque falso monstrum creditum E. N. C. *Dec.* II. 5. *obs.* 70. & simas demum illas, qualem *Salmuth Cent.* II. *obs.* 16. & *Bayle* recenset *diff.* 3. & *Harimanus* in propria *diff.* Haec enim monstra verissimi unice paulum compressa facie homines sunt. Fetus male pro monstris habitos vide apud E. N. C. *Dec.* I. *ann.* 9. 10. *observ.* 161. & Cl. civem meum *Mastrum de obstetr. error.* p. 30. qualis forte ille abbas fuit, qui cum partu editus deformissimus videretur, parum absuit, quin pro monstro deportaretur *Loke* L. III. c. 24.

spiciens adstantem videt mendicum, stantem ante fenestram, labio turpem leporino, & ipso palato fisso. Concutitur horrore misera, & post felicissime editos pueros pulcherrimos, infantem enititur, cui labium, & palatum ita recenter fissum esset, ut etiam stillaret sanguis (27). Alium novi hominem, cuius matri mendicus, ut extorqueret stipem, ostendebat manum sibi instructam digitis: retulit certe ab hoc casu manum se digitam [28]. Ergo adparet, matrem posse addere, demere, mutare aliquid in fetu. Non id fit, quod scit mater, quod vult mater, neque id quod non vult. An nunc docet haec experimento confirmata matris potentia, matrem fetum fingere, uti figulus de massa argillae vasa sua format [28*]? Res ipsa certa est, neque potest negari, nisi sensibus fides negetur. Non tamen videtur inde sequi, mulierem aliquid ad formandum fetum facere. Vis enim incognita est, quae a voluntate nequit produci, aut prohiberi, etiam si vehementer mater conetur. Delapsa est in cellam femina gravida, infantem peperit, cui ingente vulnere vertex contractus (29) fuerat, eodem modo uti maternum verticem calus violave-

(27) Valde certe incredibile, & quod fidem praesentis medici requirat.

(28) Sed unde mendicus feditus? an creat imaginatio ossa, tendines, menseos, cartilagineos? Similis historia est pueri decem in manu & in pede digitis instructi, quem naevo visoque supplicio tribuit

(28*) Ut secta Stabliana: vide *Buchner miscell.* 1729. p. 516.

(29) Dudum HIPPOCRATES fetum mutilari posse a plaga intra uterum accepta *apud 7000* n. 9. Caput fetus ex naevo fractum MEKERN p. 348. Cranium comminutum BUCHNER *miscell.* 1728. p. 1026. & destructum ex lapsu cum terrore viso MAURICEAU p. 116. Ab alapa gravidæ inflicta fractum seu cranium HORSTIUS *obs.* 2. Ex terrore matris fetus abscisus cranio & cerebro, solo osse accipitis superstitie L. Bourgeois L. II. p. 71. Ex terrore vulnus C. Gamma p. 77. in inguine fetus HILD. Cent. V. *obs.* VI. & pene similis casus E. N. C. *Decis.* III. ann. 2. *obs.* 117. sed ex

relatione. Ex terrore foramen quasi sclopeto infictum circa annum E. N. C. *Dec.* I. ann. IV. *obs.* 1. HELMONTIUS de *injectionibus materialibus* n. 9. qui addit, ex haemorrhagia fetum interivisse, & alterum exemplum addit. Cutis dorsi lacerata E. N. C. *Dec.* I. ann. 9. 10. *obs.* 23. Ex terrore brachii fracti cicatrix in fetu reperiata SCHOOK p. 68. Vulnus in fetu ex visa crucifixione E. N. C. *Dec.* II. ann. 6. *obs.* 150. Ex viso mutilo fetu quatuor digitis mutilatus E. N. C. *Dec.* II. ann. 6. *obs.* 30. Manus ferus ex naevo mutila E. N. C. *Vol.* 5. *obs.* 48. Manus dextra divisa: & separatius pollex SCHOOK p. 62. Brachium manu truncatum DEUSING de *fetu missis* p. 23. Horst l. c. ex aliis, A. Hahn. ann. II. n. 1. E. N. C. *Vol.* 6. *obs.* 66. Plot *Staffordshire* p. 270. *Superaville Phil. tr.* n. 456. & Cyprian *Phil. trans.* n. 221. & integra collectio apud Seburis. *Syllabus* p. 609. Fetus ex naevo mutilus A. Hahn. II. n. 82.

Javerat . Neque fabellae sunt . Bruxellis res mira accidit , cum proceres Fulgici , EGMONDAE Comes , & HORNAE , jussu Ducis Albani capite plecterentur . Gravida inter spectatores mulier fuit , quae non absque terrore celebrem bellica virtute Egmondanum comitem perire vidit : ea infantem peperit , absque capite (30) , collo adhuc cruento , quae mira historia a magistratu publice confirmata ad HELMONTIUM venit , Bru-xellensem hominem , & cujus pater inter spectatores supplicii adfuerat . Pariliis gravida fuit , quae vidit homini malefico ossa rota (31) frangi , & pepe-

n.8a. digitique mutilat E.N.C. De-
cis. II. ann. 6. obs. 30. Infans apus quasi
in eandem terminatus ex novo
E. N. C. Dec. II. ann. 9. obs. 10.
Haec majora videmus . Sed ni-
mis frequens est ossa crani ma-
le ordinata , absque ullo vicio ma-
tris galeam imperfectam & pene
confractam efficere , ut coram vi-
deo : neque absurde ad hydroce-
phalum vetulis *Mareotus* . Deinde
mutilos canes passim vifos lego
E. N. C. Dec. II. ann. 3. obs. 164.
Aldrov. p. 128. *Bresl.* 1723. *M.*
Aug. & *scles Licetus de monstr.* l.
p. 17. & caprum *Val.* & pueros
brachiis destitutos E. N. C. De-
cis. III. ann. 5.6. obs. 12. *Bresl.* 1722.
M. Mart. Columbus p. 264. *Duver-*
noi act. Petr. V. p. 260. *Licetus*
p. 59. *Superville Phil. trans.* n.456.
conf. *Sennert. Prae.* L. IV. p. 301.
saepae pedibus artificiosos *Vorm.*
mus. p. 187. *Faber* apud *Hernan-*
dex p. 487. *Staliger de subtilit.*
exerc. 334. *Bresl.* 1725. *m. Maj.* 1726.
m. Oß. Aldrovand de monstr. p. 482.
vel alterutro brachio mancos *Bu-*
chner misc. 1727. p. 72. aut pe-
dibus *Hofman de usu part.* p. 339.
femoribulve *AB. Hafs.* IV. obs. 88.
Bartbol. bist. 44. Cent. II. *Colum-*
bus l. c. *Bresl.* 1720. *M. Febr.*
absque vicio , etiam supposito ,
imaginationis . Ita fotes , aliqua
parte mutilata , petalis carentes ,
aut frigidus feminibus callos vul-
garissimum est videre . Plura for-
te benigna miaculorum mater

imaginatio addit .

- [30] HELMONTIUS l. c. & addit ,
caput non inventum esse , collum
vero cruentum prodidisse ; & vi-
de not. 29. Sed nota est HEL-
MONTII fides , & haec unice
historia eam , quam haberet , de-
leret . Amputari etiam capitis hi-
storia exstat apud *Horsium* , post
Donatum p. 748. & in *AB. Hafs.*
Vol. II. n. 1. & aliud apud *Bolinum*
p. 359. & F. M. ab *Helmont* &
Digbyum apud *Craanen* p. 751.
[31] Historiam HARTSOECKERUS ha-
bet fute *des conj.* p. 140. & *Muy*
praef. ad l. *de fibra musc.* & ZOD.
GALL. l. p. 62. Ita tunc decus-
satus brachialis sancti similem *Hart-*
soekerus l. c. adducit , & angelo
volanti similem *Bresl.* 1723. *M.*
Nov. & *Plutoni* , Proserpnam am-
plexo *Blanc.* Ex vifio praefigatore
crura contorta ACT. HAFN. 1675.
obs. 59. confracta , & pes d. stori-
tus HILDANUS Cent. III. obs. 56.
Brachii ossa mobilia MEKERN
p. 147. & E. N. C. Dec. I. ann. 8.
obs. 55. (id autem , credo , vi-
tium ad rota fractos relatum est) .
Distortae pedis articulationes HIL-
DANUS Cent. III. obs. 56. & cru-
ra E. N. C. Dec. I. ann. 2. obs. 61.
Spina dorsi quasi luxata HILD. l. c.
Verum haec omnia ad aliuscu-
pi musculi praevalens robur perti-
nent , & laxiora ligamenta , &
nimis frequentia sunt , absque ulla
de naevo conjectura .

& peperit eadem. setum, cui ossa simillimo modo fracta fuerant. Ergo subest hic aliquid, quod cum naturae legibus nobis notis minime convenit, neque tamen negari potest, nisi ab eo, qui has leges omnes perfecte cognoverit.

10. *Fecundatio*) Staminis masculini ingressus in ovum femininum (32).

11. *Tres membranae*) Philosophi fuerunt, qui docerent, spumantem bullam libidinosam (33) utriusque aquulae seminalis ejectionem, densatam, cuticulam contrahere, nempe tres membranas, & faecem deponere, quae fiat in placentam. Verum DÄRLINCOURTIUS docuit [34], ovum jam in ovario amnion & chorion, & corpus luteum habere, sive placenta rudimentum, atque adeo haec omnia a matre esse.

12. *Placenta*) Cupula ovi in ovario nata (35), pars elementaris ovarii, in ovario aequae, ac membranae jam structa.

Funis) Quid sit, Ego quidem ignoro. Intra ovum nullum rudimentum funiculi reperitur: nihil etiam in LEEUVENHOECKIANO animalculo; & nihil hic docent fidelissimae icones MALPIGHII. Ovum quidem novimus ad matrem pertinere, embryonem a patre esse pene scimus. Verum id obscurum superest, num funiculus (36) embryoni adnexus de ejusdem abdomine prodierit? quod de arteriis umbilicalibus, & uracho dici potest, de vena dici non potest, qui enim possit vena extrinsecus advenisse & se inseruisse in corpus? Si dixeris, funiculum a placenta esse; respondendum est, unde ergo arteriae advenerint. Undique insuperabiles difficultates rem obsident.

Verum omnino novi, leges latas esse rebus creatis, ut nunquam femina imitantur radices, nisi in propriam & faventem sibi terram. Lichenes, & aliae plantae radicanter in muros: aliae plantae radicales in aquam demittunt, nunquam ulla dimissurae, nisi aquam nactae fuerint. Aliae in durissimos lapides descendunt radiculis. Aliae non nisi in alias arbores. Quis explicaverit, quare viscum non inveniatur in rerum natura, nisi in aliena arbore, neque unquam maturum visci semen radículas emitat, nisi in fissuram madidi corticis: si vero id fecerit, in varam, solidam, excreseat arborem, suis floribus, fructibus & foliis onustam. Hae naturae leges sunt, quas non concipimus, sed videmus. In thesauro RUYSCHII, quem Russiae Imperatrix coemtum possidet, integra anthropogenia habetur, sive historia naturalis hominis, a primo con-

L I 2

ceptus

[32] DCLXXIII. not. 11.

[33] HIPPOCRATES mechanicam generationem pellicularum fetus ferre hoc modo proposuit *αγα ταν* *δισο ποιος* n. 3. *Cassius* membranas ex parte feminis uterum

contingente docuit generari, & allantoidem ex lotio *Borricibus* *A. Hesn. Vol. V. obs. 45.*

[34] DCLXIX. not. 16.

[35] DCLXIX. not. 12.

[36] DCLXXVII. not. 1.

ceptus momento, ad noni mensis finem. Vidi haec omnia, & per multos dies continuos oculis perlustravi, reperi funiculum umbilicalem tanto majorem (37) esse, quanto propior origini suae fetus est, & vicissim. Et in fetu formica minima nihilo majori, vidi, homuncionem sedere in acuto apice coni, quem funiculus umbilicalis efficit. Ergo videtur stamen masculinum per placentam se insinuare, hinc in funiculum umbilicalem venire, ibi adnecti, tunc funiculum una cum fetu ad ovum adhaerere. I. G. (puto melius), ex fetu prodire partem funis, & a placenta aliam partem, nempe venam, ad fetum pergere, tunc connasci utramque portionem funis. Oportet autem hic dicere, quae HELMONTIUS „Seminavi semen pini in testa, radícula exiit, & pertudit testam, ut descenderet, deinde sursum fregit, ut in caulem nasceretur. Haec non possumus explicare, experiri possumus.

13. Or) Fetus alitur per os (& totam suam cutim (38), adeo teneram in fetu, ut nemo negare possit, & exhalare per arterias cutis liquorem, & resorberi per venas. 1732. Ita etiam plantae per totam superficiem suam aluntur, nam planta, quae interdiu languit, mane turgent resorbis per noctem liquoribus.) Capit adeo cibum potumque, atque in ventriculo subigit, ope salivae, succi ventriculi, intestinorum, pancreatis. Chylus inde paratus per vasa lactea infunditur in massam sanguinis venosam. Id vidi in Leidensi puero, cui abdomen fissum erat ex matris imaginatione, & per vulnus intestina conspici poterant, atque vasa lactea, chylo non minus, quam in adulto, plena. Haec via vere nutritur. Per placentam autem remittit (39) ad matrem sanguinem, qui in corpore infanti nullam pulmonis actionem patitur, in venas matris, quae vicissim fetui reddit sanguinem in pulmone suo elaboratum. Haec sententia facile cum Hippocratis (40) doctrina conciliatur, qui & ipse dixit fetum duplici modo alii.

Vario) Si animalcula LEEUVENHOECKII nasciturorum hominum embryones sunt, tunc utique nutriuntur primo in patris teste, epididymide, ductu deferente, vesiculis seminalibus & urethra, proprio succo seminis masculi. Deinde in materno utero primis temporibus aluntur proflatarum (41) succo, qui videtur tamdiu fetum alere, quamdiu propria quadra visitat, & necdum epulatur de paralitica mensa, quam mater suppeditat. Quando porro ovum quidem secundatum est, sed in ovario haestenus haeret, tunc unice nutritur succo priori, & proprio ovi. Quando vero, solum de petiolo, retinetur in utero, & nondum undique

[17] DCLXXVII. not. 3.

[18] DCLXXXII. nisi impediverint fordes mucosae, quae cutem obli-

[19] DCLXXIX. not. 27.

[40] DCLXXVIII. not. 8.

[41] DCLIII. p. 201.

que uteri superficiei applicatum est, tamdiu fetus nutritur liquido per membranas chorion & amnion epoto [42], qui in utero generatur & fertui infunditur.

Viscera) Admiranda vis haec omnia dirigit. Quando EPICURUS apud LUCRETIVM docet, omnia ex eadem materia ~~mutari~~ nata esse, ex una communi proprietate materiae, s. gravitate, quae fecit, ut volantes in indefinito inani spatio atomi se comprehendant, tunc velim explicent illi cauti philosophi, quomodo fiat, ut idem animal successive varias induat formas, perfecte ad id alimentum aptatas, quo debet vivere. Toties vidi in semine animalium varii generis anguillas plicatiles, veros serpentulos. In ranarum genere certum est, nihil matri a patre dari posse, praeter anguillulam, quae tubercula paulatim exigit, unde artus emergent, ut in JACOBÆI de ranis observationibus adparet. Perge tunc reliqua contemplari animalia, reperiēs nullum omnino esse, quod in primordiis vermīs non fuerit. Quis crederet papilionem, quatuor alis, sex pedibus, oculis innumerabilibus praeditum animal, vermem aliquando fuisse? Omne pulicem & muscarum genus aliquando vermīs fuit: SYVAMMERDAMIUS in confessu virorum eruditorum, qui in THEVENOTI aedibus conveniebant, incomparabili arte bombycem ex chrysalide exemit, & nascituros olim artus alasque caesarea arte expedit. Sed & homo aliquando vermīs fuerit, uti Prophetæ loquuntur, quando superbiam humanam contunderē voluit, Vermis sum, non homo. Sed ex verme, depositis exuviis, novum animal fit, & ex chrysalide prodit vegetus, & volitans papilio. Nisi hae mutationes sensuum testimonio demonstrarentur, homines certe insanum vocarent, qui hujusmodi paradoxa doceret. Vidi, & bona fide narro, cur enim fallerem discipulos? hominem, cui neque brachia erant, neque pedes [43], & tamen a mare generā-

nera.

[42] DCLXXV. not. 12.

[43] In fetibus grano hordei non majoribus nulli adhuc artus adparent RUYSCH. *Adv. Dec.* II. n. 10. qui idem in fetibus api, & penne nuci avellanacaequalibus, nulla adhuc rudimenta artuum describit aut pingit *Tbes.* VI. T. 2. s. Trigesimo die fetus formari incipit informis hactenus RIOL. p. 381. Antequadragesimum diem fetus formatae mole est, sed femora nondum discreta habet ARISTOTELES. *hist. anim.* L. VIII. c. 3. oculus vero praegrandes. In cuniculo die undecimo nulli

adhuc artus *Cosmop.* p. 50. Die vigesimo artus nondum conspicui *Varol.* p. 102. *Beister* p. 8. in fetu hordei grano non minori, neque quina septimana, in fetu apis mole, in quo caput apparebat la MOTTE II. c. 24. In abortu unius mensis nihil adhuc distinctum GALEN. *de form. fet.* Pueri ante trigesimum, puellae ante quadragesimum diem nihil distincti habent HIPPOCRATES *apud* *Aspersionem* quosdam nu. 12. Etiam plus quam tercio mense, cum fetus articulo digiti minimi aequalis esset, nulla adhuc crura L. BOURGEOIS L. I. p. 27. Sed

neratus, a femina conceptus, per abortum vero eiectionis fuerat, formica majuscula nihilo major. In alio abortu, qui paulo diutius vixerat, vidi caput, cum exigua cauda, & coccyge terminatum hominem, cui tubercula (44) in ea sede prodibant, unde manus & pedes essent nascituri. MALPIGHIVS demonstravit, omnem pullum gallinaceum, in ipsis primordiis, totum cerebro, cerebello & spinali medulla, atque oculis constare (45). Cernite figuras MALPIGHIANAS, videbitis primordia pulli carinam

Sed sequentes observationes demonstrant, artuum proventum saepe praecociorem esse, aliquando tamen tardius apparere.

- [44] In embryone ape non majore aliqua *Ruyssb Thes.* VI. n. 46. T. 2. f. 4. Die tertio cum dimidio non-nihil simile brachiorum pingit *Mauriceau* ad p. 85. Duodecimo die aliqua tubercula artuum *Bianchi* p. 57. 425. f. 7. & decimo quinto *Kerkring c. 3. In fetu* formica non majori rudimenta artuum *Berger* p. 468. 469. *Stab.* p. 505. & in informibus embryonibus *Backii* p. 42. Informes artus & membra in fetu aequali femini cucurbitae *Ruyssb. Thes.* IV. n. 40. & in altero apia mole *Malp. galls.* p. 86. & *Comm. Nor.* 1759. T. 3. f. 4. In ovo juglande non majori E. N. C. *Desc.* II. ann. I. *obs.* 119. Die decimo sexto *Bianchi* T. I. f. 8. Die 21. verrucae pro artubus *Dodart.* I. c. Quarta septimana rudimenta artuum *Phil. Trans.* n. 236. In menstruo fetu manus jam perfecta *Riolan.* p. 411. In ea aetate artus incipiunt apparere *Stabl.* p. 505. In fetu phaeolei aequali brachiorum initia *Bisli de l'Acad.* 1714. *obs.* 3. Sed, ut adpareat certam legem nullam esse, etiam in embryone digiti articulo aequali artus obscuri *Ruyssb. Thes.* VI. T. 3. f. 2. Sub hinc primi mentis, cum fetus digito transverso aequalis esset, rudimenta artuum *Vater mol. praegn.* n. 6. Trigesimo secundo die fetus

fere perfecte formatus *Bianchi* T. I. f. 12. Die trigesimo quinto fetus ungue non major artus jam formatos habet *Mauriceau obs.* 246. Die quadragesimo artus demum pullulantes *Riolan.* p. 412. *Parol* p. 103. *Bestier* p. 8. & secundo mense demum rudimenta artuum in homine *Ewerard* p. 91. Sexta septimana fetus uncialis, & artus jam adparent *Vater de mol. praegn.* n. 6. & formati sunt E. N. C. *Mol.* III. *obs.* 145. Brachia autem semper prima formantur & majora cruribus sunt *Bestier* L. c. *Ruyssb Thes.* VI. n. 48. etiam in canis *Id.* ib. In gytrino brachia & pedes prodeunt, quando caudam sub solstitium amittit *Harveip.* 118. *Conf. Ruyssb Thes.* VI. n. 48. In pullo vero post 24. horas absolutas alias vidit *Malpighi de form. fet.* f. 8. & in fetu uncia paulo longiori perfectos artus *RUYSCH. Thes.* X. T. 3. f. 3.

- [45] Caput adparet in pullo hora duodecima *Lancis* p. 40. In *Malpighianis* autem etiam sexta de *inob.* p. 2. In primordiis pulli caput apparet, in eo caput corpore major *Harvei* p. 56. In fetu ovillo die septimo corpus informe, sed cerebrum & oculi adparebant *Latruvendoock anat. & cont.* II. p. 165. In embryone hordei grano non crassiore caput & oculorum rudimenta *Ruyssb Thes.* VI. n. 46. T. 2. f. 4. In altero femine cucurbitae minori caput aequale corpori *Ruyssb. Thes.* IV. n. 40.

carinam (46) esse, sive vermem, tunc caput nasci, & vesiculas, sive tubercula adstructa carinae. Ex eo deinde fetu enascitur cavum rostrum, & cor (47), & reliqua ex ordine viscera; & primum omnes tres ventres aperti sunt, ipsumque cor ad spinam dorsii firmatum nudum absque costis haeret: in ipsum cor in his primis initiis est canalus in arcum flexus, qui in quatuor sinus intumescit, nempe aures, & ventriculos, qui in longa serie ordinantur distincti. Haec deinde fistula quotidie magis intorquetur, donec duae cavitates cordis, & duae aures, in unum cor conserveant. Tunc costae accedunt (48), & thorax clauditur & pulmo (49), atque jecur [50] adparere incipiunt, quae hactenus nulla apparue-

nu. 40. In fetu milii grani mole magnum, oculis necdum distinctis *Santorin* *lhor.* n. 5. Etiam in trimestri fetu caput majus thorace & ventre *Faber* ap. *Hernandez* p. 651. In alio septem lineas longo, caput uni tertiae parti corporis aequale *Dodart*. Pulli Gallinae oculi cerebri & reliquo capiti aequales, majores corpore &c. *Harvei* p. 56. Caput & oculi pullo maxima *Arist.* *hist. anim.* L. VII. c. 4. de gener. II. c. 6. In apis mole oculi conspicui *Mauriceau* *obs.* 108. & in pullo hora quinquagesima *Maitrejean* p. 14. 77. minus tamen, quam oviparis, magni sunt HARVEI p. 212. Tres vero illae bullae supra ex *Platano* citatae p. 238. non ignoratae *Carpo*, *Parco*, *Archangelo*, *Riolano* p. 384. *Malpighio* etiam distigae p. 86. & *L. Bourgeois* p. 26. & *Drelincourt* *atv. dogm.* 5. & in dama HARVEIO visae p. 56. p. 212. fusius a *Malpighio* declarantur in utroque opere. Tres ab initio sunt, etiam in homine *Malpigh.* *postb.* p. 86. cerebri nempe duo lobi & cerebellum *Drelincourt*. vel oculi potius eo tempore maximi, & cerebrum *Malpigh.* *de form. fet.* p. 4. Die vero quinto in pullo quatuor vidit bullas HARVEI p. 57. quinque autem *Malpighius*, duas cerebri, duas oculorum, cerebelli unam *de format. fet.*

- [46] Conf. DCLL. Adparet hora sexta *Lencis* p. 41. & in catella die tertio *Brendel* *de embr. praesens.* p. 38. denique etiam ante incubationem, si fides *Malpighio* *de incub.* p. 9. Recte olim *Columbus* spinam primam generari, id se in embryone vidisse p. 247. Adhuc 21. die embryo similis vermis *Dodart.* *bist. de l'Acad.* 1701. p. 26. 27.
- [47] Hora vigesima octava in pullo *Lencis* p. 40. ante 30. *Malpighius* *de incub.* p. 4. Die vigesimo primo in fetu humano cor apparuit *Dodart.* l. c.
- [48] Tertia septimana crater costarum adparet *KERKING.* *antrop.* t. 4.
- [49] Die sexto apparent in pullo HARVEI p. 61. & quarto absoluto *Maitrejean* p. 115. 121. Die quadragesimo in homine *Varol.*
- [50] In cuniculo die decimo quarto *Graef* p. 312. In fetu humano quadraginta dierum *Varol.* l. c. In pullo demum die sexto *Malpigh.* p. 9. *Maitrejean* p. 141. magno, post cor, intervallo HARVEI p. 63. Etiam genitalia ante hepar distincta sunt HARVEI p. 243. quae in homine die vigesimo apparent *Pinacius* p. 137. Male adeo jecur ante cor generari, & in ovo incubato se expertum esse *Santhorius* in *sem. l. Avic.* p. 756. Seduxerat optimum virum *Galeni* auctoritas, qui hepat ante cor, die

ruerant. Apparet adeo, haec viscera in primordiali fetu quidem non adesse, materiam tamen adesse, ex qua generentur [51]. Hoc ipsum cor unicum quasi ventriculum habet, quamdiu pullus non respirat, nam communicationes cavae venae cum pulmonali, & arteriae pulmonalis cum aorta faciunt, ut cor quasi univentre sit, uti est in amphibiiis, & etiam bombyci unicum cor est, sed in particulas divisum, quod contra MALPIGHII SVVAMMERDAMIUS demonstravit [52]. Et tamen inutilis & superfluum in pullo pulmo increbit, & vasis suis omnibus ornatur [53]. Haftenus enim homo, qui vermiculus fuerat, amphibion animal est, quod in mediis aquis, absque pulmonis usu vivere potest. Donec ultimo in animal respirans abeat, cui duo corda sunt, & nulla vita est, si ab aere per septem vel octo horae tritura arceatur. In utero vero nondum respirat, apparet ex VESALII [54] experimentis, Sumatur ex mortua praegnanante vacca totum ovum, reponatur in mensa, adparet vitulum intus miris modis moveri, & niti, ut prodeat (uti etiam pulli pipiunt, ovumque rodunt, ut exeant). Quam primum chorion & amnion discidisti, continuo fetus respirat, & tunc quietem agit. Qui in utero vagiunt infantes, plerumque moriuntur: nisi enim continuo in aerem excludantur, facile fieri poterit, ut aliqua pars membranarum ori applicetur, fetumque suffocet.

15. *Et cur non*) A mundo condito nunquam, nam evolvi observationes, in clauso utero, intra caveam amnii faeces [55] repertae sunt, cum tamen in recto intestino abunde sit meconii. Ratio est, quod absque aeris ope, sphincter ani nequit superari.

Mortem) Quando fetus in lucem editur, purissima prodit aqua, in partu nempe naturali, neque infans, in validis, quos edit, nixibus, alvum deponit, nisi aer appulsus uterum subeat, infantem seriat, & respiret idem, tunc enim continuo, in tantis angustiis, alvum deponit. Ex hoc effluente stercore indicatur [46] 1. ruptas esse membranas, aquas

die trigesimo secundo, hoc ante cerebrum generari dixerat de fetu, & Aristotelem de gener. li. c. 6. aique Chrysippum, qui cor primo loco generari dixerant, refutat de form. fet.

[51] Conf. not. 1. Non bene adeo HIPPOCRATES, partes omnes simul formari *πρὸς τὴν αἵματι* a.

[52] CCLXI. not. 3^a.

[53] Hoe imprimis argumentum ad demonstrandum praevisos fines elegans est. Alae & proboscis in

eruca reperiuntur, inserviturae papilion, eruae inuiles. In homine pulmo, cerebrum, fecui inutilia, necessaria adulto; contra foramen ovale, ductus arteriosus, venosus, utilia fetus perirent cum aetate. Sic branchiae ranarum decidunt, quando desinunt pisces esse &c.

[54] Confer DCLXXXII.

[55] Contraria experimenta protulit ad DCLXXXIII.

[56] Ib.

aquas effluxisse, infantem jam respirasse. 2. Eum in apertura uteri haerere, ita ut per eam aperturam faeces exire possint. Tunc fetus in summo periculo versatur, & inter viginti fetus, quibus alvus ante partum solvitur, vix unus vitalis est. Si enim aer, qui semel in thoracem irrupit, suppressus fuerit vel per exiguum tempus, neque infans inspirare poterit, continuo ipsi pereundum est. Non ideo certum est perierisse (57) fetum, saepe enim, cum huic uni signo fiderent chirurgi, miserum fetum spirantem & viventem hamis & uncis dilaniatum extraxerunt (58), quale exemplum habet MAURICEAU [59], in l. *observations sur la grossesse*, quem longe praefero alteri operi *la pratique des accouchemens*. (1732) Optabile certe foret, ut vel bonas obsterices haberemus, vel omnino nullas. Quando famam aliquam habent, semper festinant, & rumpunt aquas, ut cito fetum extrahant: cum contrarium bonae obstericis officium sit, aquas quantum fieri potest, diutissime servare clausas (60). Sique invitae contigerit, ut meconium effluat, manu fetui liberum aerem procuret, ne suffocetur: diducto digitis uteri ostio.

16.

[57] Ex prioribus, sed ruptas membranas esse, & sem undique compresso in his viarum angustis, etiam fuisse faeces *Dionis des accouch.* p. 234. la MOTTE *obs.* 223. Duodecim horis ante partum editum meconium MAURICEAU p. 324. Caeterum signa mortui fetus omnino difficilia sunt. Plerique pulsus in fonte scincipitis, & in funiculo deficientem adducunt *DIONIS des accouch.* p. 298. 320. *Ruyssb.* apud *Ernal.* p. 90. &c. Verum hoc signum debilitatem summam perinde ac mortem demonstrat, movente J. van Horne, & saepe fallit la MOTTE L. II. c. 5. *Idem obs.* 228. funiculo non pulsanti frigus ejusdem funiculi addit pro certi summo signo. Sed J. van Horne *Osteopodische Vvebutter* p. 25.) epidermidis teccsum; alii, quos refutat SAVIARD *obs.* 97. putridum liquorem ex ore fetus exeuntem pro certo leti indicio habent. Verum hic humor putredinem subponit, quod idem de

secedente cuticula de fetore verum est D. Sala tangebai fetum frigida, & mortuum aiebat, quando se non retraheret BARTHOL. *bist.* 78. *Cent.* V. P. BARBET. Fetum minime tenium. Verum haec signa etiam pejora sunt.

[58] Nimis frequentes sunt dirissimae historiae. Vivo fetui resectum brachium habet la MOTTE *obs.* 265. & totum laniatum *obs.* 185. 287. insensum unco MAURICAËI ob has sumptas operationes, & SAVIARD. *obs.* 84. Unicum casum admittit la MOTTE, in quo caput aperiri debeat, fetusque violari, capitis nempe crassi, & in transitu per os ueri inapacti & haerentis vitium L. III. c. 20. 21. In eo casu ipse coactus unco usus est *obs.* 456. forsice vero *obs.* 221. aliique violentis remediis.

[59] *Obs.* DCLXXXIV. vivi fetus unco laniasi, & occisi, cum pro mortuo haberetur.

(60) DCLXXXV. not. 22.

Superfoetatio] Non credo hanc fieri posse, nisi eo tempore, quo ovum in uterum receptum, adeo parvum est, ut nondum undique accreverit 6.] uteri cavæ superficie. Quæ alio tempore contingunt superfoetationes, nomen non merentur, neque enim sunt duæ inprægnationes, quarum secunda aliquo tempore post primam facta est. Quando enim ovum totum uterum replet, tunc non video, quomodo semen ingredi possit uterum, nisi HARVEIUM sequaris, statuentem seminis vim secun-

[6.] Superfoetationem in homine admittit HIPPOCRATES, quando os uteri non clauditur *tripsi traxurus* n. 2. pro raro vero casu ARISTOTELES *bist. anim.* L. VII. c. 4. *de gener.* L. IV. c. 5. & in tempore *de gener. anim.* l. c. *de bist.* l. c. Deinde PLINIUS exemplum habet L. VII. c. 2. & magna ferries est historiæ, quæ adducuntur. Veram ergo superfoetationem primo necesse est distinguere. Eam dicimus, quando, post secundam venerem, aliquot elapsis diebus, altera secunda venus succedit, & post ovum in uterum jam receptum, alterum ovum in utero ferius devolvitur. Hujusmodi superfoetatio omnino fieri potest, etsi raram esse Cl. GOELIKIO non negavimus, non solum a die sexo ad trigessimum, MANNINGHAM p. 41. MAURICEAU p. 107. GOELICKE & c. quod prius secundum semen primo se admisceat, ferius uterus plenus sit, & clausus. Nam etiam satis maturo fetu eoque mortuo, & in utero haerente, concipi potest. Experimento non in vacuis solum facta sunt, quæ, præter marcidos, quos gerebant utero fetus, vivos alios conceperunt ROYSCH. *Atu.* II. n. 10. *de mulier. ut.* p. 14. Sed in homine similia exempla lego. Ita PROSOCER meus TEICHMEYERUS „fetus loco parius retento, post factida elapsa lochia, vidit feminam, post aliquod tempus concepisse, peperisse fetum vivum, post quem de-

mum prior ille & marcidus incisione facta excessit, in *epistola propria*. Ita HARVEIUS in femina, post graviditatem veram aliquot mensibus elapsis ossa prioris fetus edidit *de partu* p. 264. & Albucasis, & Marcellus Donatus L. IV. c. 22. & Sebent. ex Gabelchavero, & Bonnetus *sepulch.* III. S. 37. app. p. 29 & Martb. Cornax, & Bartholinus *bist.* 14. L. IV. & de *insol. part.* viit c. 28. Leov. embocæmus penitus similem observationem adducit *superv. & cons.* p. 406. Manifestum est adeo, fetum, etiam magnum, qui offesus sit, in utero haerentem novam conceptionem non impedire. Sic etiam Rouffetus vidit pefatium in uterum inlertum conceptum non impedivisse *Seft.* VI. c. 8. (nisi forte non satis certum est, pefos in utero fuisse). Non ideo repugno Cl. & humanissimo D. Gravel. superfoetationem facilius fieri, si uterus forte duplex fuerit. Verum superfoetatio vera, mihi per exempla paulum difficilis videtur cognitu. Ea quidem egregia nota est, si fetus alter parenti, alter adultero similis fuerit, quale exemplum *Hercules* præstuit, & *Iphiclus*, & aliud *Aristoteles* habet *bist. anim.* L. VII. c. 4. & Plinius L. VII. c. 2. & Gordonus: sed hoc rarum est. Superest, ut ex tempore æstimate superfoetatio, quando nempe „post vivum, pefectum puerum, aliquot septimanis, & mensibus elap-

secundantem non per cavum uteri tubum, sed per massam sanguineam in ovarium venire; ea vero hypothefi admissa, non video, quare non perpetuo contingant superfoetationes, nisi forte, liberali certe adsumptione, uterum post fetum conceptum nullis venis bibulis praeditum esse ajas, aut nullum semen genitale resorbere. Si vero tertio mense post editum fetum, alius partus sequatur, ut aliquando contigit, & ipse vidi, is macer erit, miser, & semimarcidus (62). Nempe ge-

M m 2

melli

elapsis, alter vivus, & sanus puer partu editur. Tribus septimanis a priori partus *Roussel* S. VI. & aliquot septimanis *Salmuth. Centur.* III. *obs.* 33. Quatuor septimanis *Francus* p. 227. Vingt novem diebus a priori, vivus uterque *Venette* p. 71. Post debilem octimestrem sanus fetus novimestris editus *Zaccbias* L. 10. c. 66. Quadraginta diebus a sana puella filius sanus c. B. *app.* ROUSSET p. 222. Ex PAULO 1. c. video citari quintum fetum quadragesimo die post quadrimestris editum, *ostensum* HADRIANO AUGUSTO. Sex septimanis post priorem filius BLANCARDO obfervante apud FRANCUM *satur.* p. 227. Sex septimanis ab altero fetus, vivus uterque C. B. post ROUSSET p. 222. *Aristoteles* partum alium septimo, alium nono mense vidit successisse *hist. anim.* L. VII. c. 4. Tribus mensibus secundus a priori partus *Nicolaus, VValdschmid, progr. de valet. med.* Partus octodecim septimanis post priorem partum *Comm. Nor.* 1712. n. 27. Septembre, & Decembre *Harveius* p. 261. Quarto, & octavo mense *Kerkring. obs.* 2. Ex *Pareda* citari lego, alium fetum quarto, alium nono mense editum fuisse. Septembre & Aprile eandem feminam perperit *T. Barbohus Cent.* IV. *sp.* 56. *Valinerius* recenset tres partus, qui incidere in 13. mensis diem Junii, 24. ejusdem 10. vero Junii c. 27. n. 14. sed iste

propinquos nimis terminos habet *Conf.* alia exempla *Ereil.* 1721. *M. Aug.* & collectionem apud *Francum Schurigum* S. III. c. 2. & *VValdschmidum* in *app.* ad E. N. C. *Vol.* II. tum apud Cl. *Gravell.* Hi omnino partus, quoties uterque sanus & perfectus est, demonstrant superfoetationem. Qui vero paucis diebus distant, quales citat *Francus* l. c. & E. N. C. *Cent.* X. *obs.* 16. aut horis, ut *Sartiardi* trigecimi *obs.* 82. illosunt ad simplices gemellos, peculiari- bus placentis praeditos referri, neque necesse est diverso tempore conceptos fuisse.

- (62) Nempe hae historiae vulgo, sed praeter meritum, ad superfoetationes trahuntur, in quibus cum maturo fetu alter immaturus & minor editur. Fetus alter maturus, abortivus alter E. N. C. *Vol.* 4. *obs.* 58. Gemelli non aequae perfecti *Trevv. Comm. Lit.* 1718. *obs.* 13. Alter gemellorum perexiguus *Zod. Gall. ann.* I. *M. Jan.* Cum maturo fetu alter minimus E. N. C. *Dec.* II. *ann.* V. *obs.* 243. & manus aequalis marcidus, durusque *Journal. des Savans* 1699. Cum fetu maturo alter induratus digitalis *Stalpart. Cent.* I. n. 74. *Schurig. embryo. log.* p. 260. *sylleps.* p. 298. & paulo ante maturum fetus digitalis puellus C. B. l. c. p. 216. Post embryonem postridie perfectus fetus editus *Hist. de l'Acad.* 1729. *obs.* 3. Fetuum duorum alter minor & tenerior E. N. C. *Vol.* 4. *obs.* 9.

melli fuerunt, sed alter viguit eximie, & excluditur maturus, alter in utero squaluit, uti placenta exsiccantur, quae per aliquot menses in utero retinentur.

17. *Uni placenta*] Hoc perpetuo in historia naturali germinum hoc modo reperitur, & confirmatur per RUYSCHIANAM fetuum collectionem. Quando nempe gemelli concipiuntur, tunc primo graviditatis mense semper duas orbiculares (63) placentas habent: eae vero sensim semiorbiculares fiunt, donec fere in unam coeant, non tamen unquam unicam, sed duas coaptatas, & si tres [63*] fetus fuerint, tres erunt [64] pla-

obs. 108. Cum perfecto fetu alter quadrimestri vel quinquentestri non major *Dodonaeus, Maurician* p. 108. *obs. post.* 123. Gemellorum alter sibi non major ZOD. GALL. II. p. 131. Porro sex horis a sano puero abortivus cum Eydatidibus RUYSCH. in *obs.* Biduo post sanam filiam fetus mortuus integro ovo LENTIL. *miscell.* Nonno die a partu fetus parvi digiti longitudine editus E. N. C. Vol. 2. *obs.* 124. & VVELSCH. septimo vero E. N. C. Dec. II. ann. 7. *obs.* 166. Tres pueri eadem septimana editi BIERLING. BARTHOLIN. *hisp.* 62. Cent. III. Post partum legitimum alter minimus emaciatus BRESL. 1723. p. 553. Fetus seculunce non longior post matrum fetum natus *Russb.* *Thes.* VI. n. 120. & de nuo post matrum fetum sex elapsis horis embryo nuci aequalis *obs.* 14. Huc etiam pertinent fetus inaequali perfectione reperi in leporibus HARDER. *apiar obs.* 9. & pro frequenti observatione relati apud LEIGH. *Lancets* L. II. p. 5. [quae causa veteris famae est, a PAULINO renovata, lepores plurimum su perficere] & in cuniculo COS MCP. p. 54 58 & in porca E. N. C. Dec. II. ann. VII. *obs.* 31. Canis septem catellis perfectos & totidem imperfectos edidit *Lauthier.* in coll. *Spone* Mustipontana p. 43. Verum in his casibus om-

nino nihil demonstratur, nisi duos fetus non aequae felicitate a nutrimento simili adolevisse, uti minime rarum est cum vivo fetu alterum gemellum mortuum ut a ro geri not. 64. Vide facientem. *Maurician* p. 108. & confectionem *Bergerum* ad observationem *Russbicanam*.

[63] Ex amici procul dubio relatione in RUYSCHIANIS enim non reperio.

[63*] Homo naturaliter animatus uniparum est, Gemelli tamen non rari sunt. Tergemini etiam in paria, & adfinitate mea novi editos. Habent etiam T. *Bartbolinus hisp.* 83. Cent. IV. de *insol.* partus viis c. 18. Rhodius Cent. III. *obs.* 56. *Maurician obs.* 146. *Lanzonus obs.* 18. *Dionis des accouch.* p. 135. *Brendel.* in *obs.* *Bresl* 1721. *M. Febr.* 1723 p. 554. 651. *Comm.* Nov. 1731. h. 6. *Schubwig. embryol.* p. 602. Quadruplini rari sunt. Exempla tamen reperio apud *Solimm.* & *Borellum* Cent. II. *obs.* 44. Rhodium I. c. *Maurician* p. 107. qui adhibe vitales fuisse, E. N. C. Dec. II. ann. 4. *obs.* 69. ann. 2. *obs.* 9. ann. 3. *obs.* 201. Dec. III. ann. 5. 6. *obs.* 158 157 I. M. *Hofmann.* E. N. C. Cent. X. *app. obs.* 30. *Schubwig. Berol. Miscell.* Cont. II. B. *estl.* 1722. *M. Jun* 1723 *M. Sept.* & p. 297 A. *Suecia.* 1725. p. 82. Collectionem habet *Marc Donatus* p. 548. & *Schubwig. sylleps.* p. 203. & in

(64) placentae, quae cum tempore eodem modo in unam massam co. crescunt. Non ideo verum est, quod vulgo recipitur, gemellis unam pla-

de in Aegypto trigeminos & quadriginos frequentes esse *Aristoteles* auditor est *hist. ann. L. VII. c. 4.* Quinquageminiab *Aristoteles* pro re in Aegypto non rara exhibiti sunt l. c. Habet etiam *Herophilus* apud *Paulum L. 3. c. 76.* & *A. Gellius L. X. & Serapio* ex relatione. *Albucasis* exemplum recenset *L. V. c. 36.* tum pro certa re sibi quae observata *Carporum in Mundum p. CCXXI.* Exemplum etiam *Bartholinus* refert de *insol. part. c. 18.* *Lanzoni* pro re sibi bene nota proposuit *obs. 132.* *E. N. C. Dec. ann. 9. obs. 50.* & denuo *obs. 8.* *Nigrifolus* & *VVelfeb.* similia repetunt *p. 35.* tum exemplum profert *Schvalbe E. N. C. Dec. III. ann. 2. obs. 175.* sed ex alio & ex aliud in *Comm. Nor. 1731. spec. 6.* pariter ex relatione, ut & ib. n. 19. tum *Brasil. 1721. M. Febr. 1723. p. 554.* Certum denique fidenti facit *Mauriceau obs. 329.* Hic numerus videtur ultimus terminus esse humanae fecunditatis. Sexgemini dicit *Brasil. Apr. 1723.* & septemgemi a *Carpo* confidenter propositi l. c. tum a *Brest. 1718. M. Jan. & VVelfebio*, & a *Biancho de generat. p. 249.* octimelli denique *Borelli. c. Brasil. 1723. p. 652.* & *sarrago Schenckiana p. 589.* ex considerata paucitate corporum luteorum, uteri roanditate, & constantia in numero fetuum, quos bruta edunt, mihi suspecti sunt.

Causa vero gemellorum procul dubio est, quoties plus uno luteum corpus una marurum est, & rari sunt, quia plerumque haec maturatus unico horum corporum contingit. Hinc in multiparis multa corpora lutea, ut in porcis, canibus, ovibus apud *Valisurium*, & *Graafium DCLXIX. not. 12.*

13. 14. Non ergo necesse est recurre ad plures uteri sinus, ut *Hippocrates* *apud quos asperum* n. 44. neque ad semen bis effusum in uno coitu, ut *Schurig. l. c. p. 195.* A duobus ovibus unum refertur recte *Hartshorn suite. dis. coniect. p. 129.*

(64) Praeceptoris sententia omnino vera est; demonstrant frequentia exempla gemellorum, quorum alter in utero materno perit, alter vitali partu editus est not. 61. His enim necesse est, placentas proprias fuisse, separatas, & si eae quam maxime coaluerint, levem fuisse coalitum, neque valia communia fuisse utrique; manifestum enim est, mortui sanguinem ad vitalem fetum adlarum cito vitae finem fuisse facturum misero. Ita fetum aliquae unum abegunt, alterum pepererunt *Aristoteles hist. ann. L. VII. c. 4.* Post sanam suam biduo fetus mortuus, separatis secundis *Lentil. in miscell. Post mortuum fetum vivus Comm. Nor. 1732. lib. 21.* Gemellorum unum dudum ante partum sodalis vitalis exstinctum *Rouffetus* habet *hysterosomosc. S. VI. p. 149.* & per quatuor menses *E. N. C. Dec. I. ann. 9. 10. observ. 162.* & similia exempla sunt apud *L. Bourgeois L. I. p. 150.* *Dionis l. c. p. 234.* *Chapman c. 27. Zod. Gall. ann. I. p. 173.* *Mauriceau obs. 518.* & *Drake*, & *Manningham p. 27.* & *Schurig. sylleps. p. 206.* in agro vero in *Hist. de P. Acad. 1703.* Trigeminorum denique duo lucem aspexerunt, tertius in tuba conpuit, & in ea post quindecim annos repertus est, *Hist. de P. Acad. 1722. obs. 3.* atque simile exemplum habet *Ill. Superville Pb. trans. n. 456.* Porro placentas geminorum, quae

simpli-

M m ;

placentam (65) esse, duos funiculos. Sed duae verae placentae sunt: Singula vero placenta suum funiculum habet, neque unquam aliter visum

simplices videntur, duplices omnino esse, neque vasculis communicare *Ruyf. auctor est Thes. IX. 21. 21. & Graaf. p. 293. & Mauriceau p. 225. 226. & Lavry p. 109. etiam experimento factum, quam in unum funiculum injectam per alterum non exire, tum Cel. Heister. not. 36. & demonstrant historiae, in quibus, cum una placenta esset, gemellorum tamen alter solus perit E. N. C. Dec. III. ann. 7. 8. obs. 45. Mauriceau obs. 328. Huc etiam refero trigeminos cum duabus placentis la Motte obs. 297. & tribus pene integre se junctis Saviard. obs. 82. Ita saepe separatas placentas Riva pinxit in icon. anat. & in E. N. C. Dec. I. ann. I. obs. 39. & futura Collins p. 630. & propria linea dividi ubique plures fetus sunt VVbarthomus docet p. 238. & conjunctas sed vere duas refert Stalpart. Cent. I. obs. 75. Deventer. ic. 5. p. 50. contiguas vero Edimb. Soc. IV. p. 180. MAURICEAU L. II. n. 3. f. 3. Denique duplices gemellorum placentas lego apud MASAM p. 43. b. in E. N. C. Dec. I. ann. 4. obs. 59. Dec. II. ann. 5. obs. 233. apud BLANCHARD. anat. praef. n. 80. SIEGMUNDIN. p. 320. MAURICEAU obs. 166. la MOTTE obs. 106. VIARDEL. CHAPMAN I. c. & case 18. BRESL. 1717. M. Jul. Comm. NOR. 1732. bodd 21. Cl. SCHAARSCHMID. Berl. nachr. 1. n. 17. & utrumque casum, hic & not. 65. propolium, obtinere, exemplis demonstrat Cl. BEHRENS E. N. C. Cent. IV. obs. 159. & ROUHAULT. obs. p. 6. & RUYSCH. adv. II. n. 10. Tergeminos denique distinctas placentas vidit MAURICEAU obs. 146. &*

RIVA, & in E. N. C. Dec. III. ann. 7. 8. obs. 45. ut non bene. MAURICEAU a separatis placentis ad superfetationem conclusit p. 225. 226.

(65) Plerique veterum pro unica gemellorum placenta militant, ut HIPPOCRATES de superfetac. n. 7. Ea ratione se habere vidit COLINS II. p. 630. SENNERT. I. c. p. 296. DRELINCOURT. de umbilic. n. 17. E. N. C. Vol. I. obs. 77. MAURICEAU obs. 143. 179. 259. 646. la MOTTE obs. 83. cc. Comm. Nor. 1732. bodd. 37. inque cane BUCHNER misc. 1731. p. 1013. etiam in trigeminis BESLER. DRELINCOURT. I. c. BARTHO LINUS anat. p. 30. BRESL. 1721. M. Febr. la Motte obs. 298. Brendel. E. N. C. Cent. III. obs. 65. Picausen. de mor. & plac. Saviard. I. c. & quadrigeminis Schenckzer Misc. Berol. Cent. II. Ipse Ruyf. sibi fatetur, duas aliquando gemellis placentas esse adv. II. n. 10. & Roubaulti eadem observatio est I. c. idemque demonstrant observationes a Cl. Eberens collectae I. c. & Schurigii compilatio, hancque fabricam frequentem esse I. von Hoorn. no vvehmutter p. 60. & perinde frequentem ut prior E. N. C. Cent. 3. ann. 7. 8. obs. 45. frequentiore demum esse adfirmat Siegmundus p. 220. Chapman case 18. Drelincourt. I. c. Ita etiam in brutis, chorion & allantois duabus ovibus communis dicta est Cl. Langley p. 164. & in vaccinis chorion, & cotyledones Cheteldon. p. 281. Hinc, cum rarius duae placentas reperirentur, factum est, ut priores, & Needham negarent unquam duas reperiri c. 3. Neque dissimulari debet, aliquando vasa utriusque placentae per

sum est, licet veteres, minus in min utiis curiosi ita crediderint fieri. Et nunquam in eodem ovo [66] duo fetus visi sunt. MAURICIAEI observationes hic audiendae sunt, ditissimae, quia PARISIIIS [67] stipendiis regis feminis licet parere, ut non alibi chirurgi partus negotium accuratius teneant.

Calyci) Ova gallinacea saepe habent duos vitellos; si vero duo (68) vitelli

per pollicem intricata fuisse, etiam *Russobio* fatente *adv. II. n. 10* funiculos denique conjunctos in unum BREDEL. E. N. C. *Cent. III. obs. 65.* & unicum funiculum BRESL. 1722. *M. Obs.* atque I. PER. NUVOLETTI apud V.O. GLI II. p. 69. 70. & trilocularem unum funiculum pro trigeminis BRESL. 1724. p. 633. atque hoc ipsum argumentum contra ova ingeri a Cl. VOGLI. Qui enim inquit, distincta in ovis totidem gemina ponuntur, cum placentae geminorum, & trigeminorum minime distinctae sint? II. p. 68. Verum adeo rara sunt exempla verae conjunctionis & unius funiculi, ut ad monstra referri queant, & conserventiam adeo familiarem partibus corporis humani absque medio se conjungentibus, ut omnino pro solita fabrica hominum recipere possimus, distinctam cuique ferui placentam esse, sed rarius separatam frequentius contiguam.

- (66) Exempla amnii unius utrique ferui communis adeo rara sunt, ut pro nullis haberi possint. Sollicite monent, qui unam placentam pro duobus fetus viderunt, amnia tamen separata fuisse *Harveii ex 58. Mauriceau* p. 220. *Deventer* p. 50. *Siegmundin* p. 220. I. von *Hoorne*. *Chopman. case 18. Roubault* p. 6. *Handley essays* p. 62. *Noortwyck* p. 177. *Manningham* p. 6. in trigeminis *Brandeburgus* I. c. E. N. C. *Cent. IV. obs. 165.* & *Riedlinus*, & in vacca *Cheselden* p. 281. Aquae unus inier gemellos biduo ante partum

eruperunt *Mauriceau obs. 481.* Et rarissimum esse nonet uni caecum geminis amnii I. *Siegmundin* p. 57. 105. Exemplum tamen habet geminorum in eadem amnio *Meryus* I. c. & huc videtur referri debere ovum *Backii*, in quo duo rudēs embryones reperit *allog.* p. 41. & forte trigeminorum duo apud *Superville Phil. trans.* n. 456. p. 303. Biloculare amnion describitur E. N. C. *vol. 4. obs. 104.* *Halei* vero non unam, ut credit, sed duas fuisse amnios, earumque alteram hinc viro inposuisse pro allantoide, satis probabile reddit Cl. *Noortwyck*. Rarum vero esse, ut gemelli in eadem amnio habitent, non mirum est. Ponit enim vel duos vermiculos in unum irrepsisse ovum, vel ovum biloculare fuisse, quod consicit DIONIS *des accouch.* p. 138. vel demum vita superflua duo ova contracta in unum abiisse.

- (67) In nosodochio *F hotel diei* feminae quindecim ante partum diebus admittuntur & ibi parere permittuntur. Ibi optima schola obstetricum, quas per tres menses opere defungi permittitur DIONIS p. 413. tum Chirurgorum obstetriciorum p. 446.

- (28) Ova gemellis vitellis non rara sunt ARISTOTELES *bist. anim. L. VI. c. 3.* & habet exempla *Fabricius* & *Harveius*, tum duobus vitellis, tum connatis p. 73. Porro lego in E. N. C. *Decr. I. ann. 2. obs. 241.* apud *Schurig. sylleps.* p. 189. &c. Tres demum vitellis vidit *Malpighius de ov. in. p. 2.* Mani- festum

vitelli fuerint, duo etiam colliquamenti (69) sacculi aderunt, & duo pulli, cum duabus utique placentis. Et, si unicus vitellus adfuerit, etiam pullus unicus est.

18. *Naufaeo* &c.] A mutata circulatione sanguinis. Nam eadem phaenomena

fectum est duo vera ova ex vitellario fecisse in hoc casu, & circumfusa esse albumine, & demum communi cortice obducta fuisse, ob loci angustiam &c. uti ova praegnantia *Valisnerius* explicavit.

[69] Ex ovis gemino vitello nascuntur duo pulli HARVEI p. 41. MALPIGH. *de ov. incub.* p. 2. BREND. *de embryone praenat.* p. 27. habent enim dupliitem numerum chylazarum, & sacculorum colliquamenti HARVEI l. c. FABER tamen ex gallina ova vitellis geminis frequenter pariente, geminos pullos edi vidit p. 771.

[70] *Gemelli saepe concreti*] Monstra concreta in pullis ovium valde frequentia sunt, ut apud VALISNERIUM & ALDROVANDUM videre est. Haec ergo monstra geminis vitellis tribuit ARISTOTELES *de gener.* l. IV. c. 4. & FABRICIUS *de form. fet.* c. 8. & HARVEIUS *exerc.* 24. p. 74. si unum albumen fuerit, & posset huc referri historia THRUSTONI, ubi femina, quae bis pepererat gemellos, tertio partu connatas filias edidit PHIL. TRANS. n. 65. Vile longum gemellum ovum monstrum fetum bicipite, semiduplice BRESLAVV. 1726. p. 716. 717. Sed recte HALEUS, non videri in medio humore lubrico duos fetus connatos posse; & acute pariter 1. C. SCALIGER, ova geminis vitellis monstra dare, quando vitelli confusi sunt, geminos, quando distincti *de subtil. exerc.* 288. Gemelli in eadem placenta contortis funiculis suffocati, minime vero connati fuerunt, in

exemplo MERYANO. In eodem pericardio duo corda vide apud N. MASSAM *Isag.* c. 28. & in *Memoir.* de DENIS p. 131. &c. Si vero utique evenerit, superficiales aliquas cohaeciones inde ducerem. Ita factum credo, ut gemelli aliquando frontem frontem compresserint E. N. C. *Cent.* II. *obs.* 172. Hinc frontibus connatos puellios habet PAREUS l. 23. C. GEMMA p. 91. LICETUS, CARDANUS *de subtilit.* l. 12. aut dorsis, PAREUS, aut verticibus, COMM. NOR. 1734. *ibid.* 41. Alii haec monstra cohaecionibus ovis tribuunt, ut VALISNERIUS c. 17. n. 5. MARCOT. l. c. Et omnino ova quatuor in unum stipata, cum rudimento fetus MALPIGHIIUS vidit *poss.* p. 88. T. XII. & duo ova convexa BLAS. *obs.* n. 4. L. V. & quinque in termina E. N. C. *Dec.* II. *ann.* 9. *obs.* 274. Alii vermiculos connatos advocant, ut CI. THUMMIG. *versuch* n. 5. SUPERVILLE l. c. Clar. BURGGRAV *verm. erzeugen.* p. 30. aut conjunctos homunciones, ut PERRAULT *mecan. des anim.* p. 491. & olim DEMOCRITUS duabus feminis portionibus, cito se subsequentes & coarctis, monstra tribuit, apud ARISTOTELEM *de gener.* l. IV. c. 4. Verum demonstravi, ni fallor, nimis profundas esse hujus coarctis radices, & in ipsis radicari primordiis animalis, neque casui tribui posse *de monstr.* *Diff.* I. & II. & video ILL. VVOLFIUM consentientem, persusum ex abundantibus nonnunquam animalium & plantarum partibus *Vfarkungen de natur.* n. 448.

nomen aliquando virginibus (71) accidunt, unice ob suppressos menses. Post tres enim septimanas ovum jam uteri magnitudinem adtigit, atque adeo sanguis primorum mensium impeditur, ne effluat. Verum eo tempore fetus vix pendet duas uncias, ergo eo tempore mulieres plus habent sanguinis in utero, quam pro fetus necessitate. Hinc abortus fere tertio (72) mense fit, quando tertia vice menses erant rediuri, & eo majus abortus periculum est, quo plus sanguinis femina per menses effundere consueverit. Hinc nausea, anhelitus &c. ab hoc sanguine redeunte in sanguinem maternum. Adde, uterum extensum, & ex piriformi figura in sphaeram mutatum, & adscendentem, atque perfecto incremento, quod sursum fit, etiam deorsum auctum, varices facere, haemorrhoides, siccam alvum, urinam aegre fluentem. Necesse enim est, vasa majora & viscera vicina conprimi. Inde mulieres, quibus ossa planiora sunt, & venae nudaе, maxime varicibus adfiguntur & inflationibus labiorum vulvae, & tumoribus crurum, femorum. Communis causa est in compressis venis. & sanguinis impedito circuitu: variant autem symptomata, prouti major aut minor femina est, quae huic compressioni exponitur, & felices sunt feminae, quibus pelvis amplissima est. Porro scybala in matre durissima adgeruntur in colo, ut saepe per totam vitam infarctus supersit.

Mammarum) Succus nutritius & sanguis ob contractum uterum sursum repercutitur.

Vari-

(71) Non eadem omnino causa est. Nausea carniū, veneris avertio PECHLIN. *obs.* 45. L. I. horrores, vomitus, continuo & primo die MAURICEAU p. 129. DIONIS p. 147 sub initia saeviores NENTER *phys.* p. 340. a conceptu succedere solent, ante primam mensium periodum. Sed a mensibus quidem suppressis, & regurgitatione ex utero semiputrida sanguine, picas ridiculas, & tensionem lumborum explicat, quomodo distentis ligamentis adscribit MAURICEAU p. 135. & *Dimis* p. 152. Ab utero vero mechanice vasculisque & ventriculū victos comprimente oritur stupor pedum, inopientia ambulandi. unius inptinis cruris, & oe-

demata, & femorum tumores DIONIS p. 159. 160. & varices MAURICEAU p. 144. *obs.* 159 venae tumentes in femore, signum nonnunquam, uteri scilicet *Panarolis* Pentec. *obs.* 46. & ecchymosies Salmuth. *Cent.* I. *obs.* 50. & urinae aut molesta stimulatō, aut suppressio, DCLXXX V. & alvus sicca, hinc haemorrhoides DIONIS p. 62. MAURICEAU p. 147. & dolentissimae inflationes colicae, & anhelatio, a compresso diaphragmate MAURICEAU p. 147. & vomitus sub finem graviditatis molesti MAURICEAU p. 130. conf. la MOTTE *obs.* 47.

(72) DCLXXXVIII. not. 9.

[73]

Varices] Venae ipsis saepe pollice majores fiunt, & rumpuntur [73], eventus lethali, nisi provideatur feminae, facile tamen comprimi possunt. Sed etiam urinae stillicidium a compressa vesica molestum est.

Lapsus] Quia centrum gravitatis loco motum est, & in anteriora recessit. Hi lapsus periculum pro fetu habent.

19. *Fœtus*] Pulcherrimum VESALII [74] experimentum est, quod constanter verum esse repertum est nuperioribus periculis. Aperitur canis femina, sub ultima gestationis tempora, brevi ante partum, quiescunt haftenus catuli. Quamprimum vero mater penitus mortua est, omnes continuo incipiunt moveri, etsi nihil inter se habeant commune: causa vero est in commercio cum matre sublato. Ita in sue, si amnion unius fetus secueris, quiescet ille, dum reliqui pergunt moveri, donec eorum etiam discindas membranas.

29. *Hora*] Experimentum Parisiis factum est, & ratio est, quod operatuli haftenus ovalis foraminis duplicem circulationem sustinere possit: vivit adeo, non tamen cum eadem facilitate (75).

(73) *Exempla venarum in gravidis sponte ruptarum excitavi ad DCLXVII. not. 12.*

(73*) *Pica in textu*) Desiderium ciborum absurdorum, intensissimum. Piperis libram gravida devorat *Buchner misc. 1727. p. 554. Pica linteorum ZOD. GALL. l. p. 107. stercoreis E. N. C. Dec. II. ann. V. obs. 20. BORELLI. Cent. III. obs. 2. calcis SALMUTH. Cent. II.*

obs. 62. corii ID. n. 63. PANAROL. Pentec. III. obs. 38. Conf. varias historias E. N. C. Dec. II. ann. 9. obs. 201. ann. 8. obs. 284. BRESL. 1719. M. Maj. & amplissimam compilationem apud SCHÜRIGIUM in chylologia.

(74) DCLXXXII.

(75) DCLXXXVIII. not. 8. DCXCI. not. 10.

F I N I S.

Se ne permette la Ristampa.

Morozzo per la Gran Cancelleria.

005641067
005641068

